




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A

1825 A

A. XXIX. Dod


6737


26. K. (3) 18741

MS. T.
Janus 8/07

I⁴

73 2.^o





18741

PRAXIS MEDICA
REMBERTI
DODONÆI ME-
CHLINIENSIS.

*Ex Libris Dionisij de Pona in hujus
libro*



AMSTERDAMI,
Impensis Henrici Laurentij.
ANNO 1616.

Fabricando F'it Faber



Lectori benevolo.



N tibi, Candide Lector, Praxin Medicam D. Remberti Dodonæi Viri Excellentissimi, & in artis operibus per multos annos, inque varijs regionibus exercitatissimi; facili quidem, sed dilucido tamen, stilo scriptam, & quæ Medico practico necessaria sunt, *ὡς ἐν συνοψεί* continentem. In ordine Pauli Æginetæ filum secutus illius libros hoc scripto non solùm explicare, sed & ad usum, curandique modum hoc tempore usitatum, accommodare, conatus est. Maluissimus quidem editionem hanc procurasse illos, quibus autor hoc mandasse perhibetur: sed quum id hactenus non fecerint, nec dein id facturos sperari possit, Typographo id petenti exemplar nostrum libenter concessimus. Plurima quidem hujus generis scripta reperiuntur; sed non pauca sunt, de quibus vetus illud verè dici possit; *ὀλίγον κρείσσον, ὅσα πολλά.* at bonam operam Provinciæ Medicæ navasse putandi sint, qui aurum de terra selectum, lectoribus proponunt. quum enim artem longam, vitamque brevem esse certissimum sit, quæ dementia fuerit, in inutilia, &

quæ ad ægros curandos nihil faciunt, bonas horas malè, & inutiliter locare?

Statuerat Dodonæus noster isti scripto tractatum peculiarem de arthritide subungere; sed quod ab alijs in Causis istius Affectus dissentiret, ut accuratius id facere posset, distulit; nec morte præventus, quod pollicitus fuerat, præstare potuit.

Porro quæ margini adscripta vides partim ex autoris illa quæ dictarat fusius explicantis ore excerpta; partim à nobis interjecta scias. quæ si non tanti ut in publicum darentur, fuisset judices, pro non adjectis habeas. Vale, & opellam hanc nostram, propter circumsilientium occupationem agmina, non minus accuratam, æqui bonique consule.

Philiatrīs.

Q*ui cupit egregiā Medicinæ addiscere Praxin.
Hunc legat ac relegat nocte dieq; librum:
Est brevis & clarus, coryphæis equiparandus
Auctor; ubique suum non leve pondus habet.
Hujus & auditor Phæbi clarissimus artem
Explicat, augmentat: Dignus uterque legi.*

M. Herculani Blonck Med.

Libri primi capita.

- F**ebres. cap. 1. pag. 1.
Putridæ. cap. 2. pag. 6.
Tertiana intermittens. cap. 3. pag. 11.
Tertiana spuria. cap. 4. pag. 17.
Quartana. cap. 5. pag. 20.
Erroneæ. cap. 6. pag. 29.
Quotidiana. cap. 7. pag. 31.
Epiala. cap. 8. pag. 34.
Continuæ. cap. 9. pag. 36.
Synochi. cap. 10. pag. 39.
Ardens exquisita. cap. 11. pag. 44.
Ardens non exquisita. cap. 12. pag. 48.
Feb. ex erysipel. affectu. cap. 13. pag. 50.
Hæctica. cap. 14. pag. 53.
Marasmus. cap. 15. pag. 57.
Semitertiana. cap. 16. pag. 61.
Morbi publicè grassantes. cap. 17. pag. 67.
Pestis. cap. 18. pag. 72.
Febris puncturalis. cap. 19. pag. 84.
Variolæ & morbilli. cap. 20. pag. 87.
Febres cum animi deliquio ingruentes. cap. 21.
pag. 90.
Dolor. cap. 22. pag. 96.
Vigiliæ. cap. 23. pag. 99.
Syntexis. cap. 24. pag. 102.
Cataphora. cap. 25. pag. 105.
Capitis dolores in feb. cap. 26. pag. 106.
Sudores. cap. 27. pag. 108.
Tussis. cap. 28. pag. 110.

Starnutamentum. cap. 29. pag. 111.
Sitis. cap. 30. pag. 112.
Nausea cap. 31. pag. 114.
Vomitus. cap. 32. pag. 117.
Singultus. cap. 33. pag. 118.
Sanguinis fluor in feb. cap. 34. pag. 121.
Vlcus circa os sacrum. cap. 35. pag. 123.
Epicarpia. cap. 36. pag. eadem.

Libri secundi capita.

Alopecia, defluvium capillorum &c. externa
capitis vitia. cap. 1. pag. 125.
Cephalalgia. cap. 2. pag. 132.
Hemicrania. cap. eod. pag. 159.
Phrenitis. cap. 3. pag. 166.
Erysipelas cerebri. cap. 4. pag. 172.
Erysipelas faciei. cap. 5. pag. 174.
Erysipelas crurum aut aliarum partium. cap. 6.
pag. 176.
Mania. cap. 7. pag. eadem.
Carus cap. 8. pag. 179.
Lethargus cap. 9. pag. 186.
Catochus. cap. 10. pag. 191.
Memoria læsa. cap. 11. pag. 194.
Melancholia. cap. 12. pag. 198.
Epilepsia. cap. 13. pag. 210.
Vertigo. cap. 14. pag. 217.
Apoplexia. cap. 15. pag. 220.
Paralysis. cap. 16. pag. 227.
Stupor. cap. 17. pag. 236.
Convulsio. cap. 18. pag. 238.

Tre-

Tremor. cap. 19. pag. 245.
Palpitatio. cap. 20. pag. 249.
Ophthalmia. cap. 21. pag. 251.
Angina. cap. 22. pag. 268.
Destillatio. cap. 23. pag. 283.
Raucedo. cap. eod. pag. 288.
Tussis. cap. 24. pag. 290.
Respirationis difficultas. cap. 25. pag. 297.
Sanguinis sputum. cap. 26. pag. 309.
Hæmorrhagia. cap. 27. pag. 330.
Pleuritis. cap. 28. pag. 335.
Peripneumonia. cap. 29. pag. 349.
Empyema. cap. 30. pag. 361.
Phthisis. cap. 31. pag. 364.
Palpitatio cordis. cap. 32. pag. 375.
Syncope & lipothymia. cap. 33. pag. 385.
Cardialgia. cap. 34. pag. 391.
Inappetentia. cap. 35. pag. 394.
Appetentia depravata. cap. 36. pag. 400.
Bulimia. cap. 37. pag. 403.
Κίτλα. cap. 38. pag. 405.
Sitis. cap. 39. pag. 409.
Nausea & vomitus. cap. 40. pag. 413.
Imbecillitas ventriculi. cap. 41. pag. 419.
Cruditus. cap. 42. pag. 424.
Inflatio ventriculi. cap. 43. pag. 430.
Inflammatiō ventriculi. cap. 44. pag. 432.
Cholera. cap. 45. pag. 436.
Diarrhœa. cap. 46. pag. 438.
Lienteria. cap. 47. pag. 454.
Dysenteria. cap. 48. pag. 458.
Tinesmus. cap. 49. pag. 481.

Pura.

Starnutamentum. cap. 29. pag. 111.
Sitis. cap. 30. pag. 112.
Nausea cap. 31. pag. 114.
Vomitus. cap. 32. pag. 117.
Singultus. cap. 33. pag. 118.
Sanguinis fluor in feb. cap. 34. pag. 121.
Vlcus circa os sacrum. cap. 35. pag. 123.
Epicarpia. cap. 36. pag. eadem.

Libri secundi capita.

Alopecia, defluvium capillorum &c. externa
capitis vitia. cap. 1. pag. 125.
Cephalalgia. cap. 2. pag. 132.
Hemicrania. cap. eod. pag. 159.
Phrenitis. cap. 3. pag. 166.
Erysipelas cerebri. cap. 4. pag. 172.
Erysipelas faciei. cap. 5. pag. 174.
Erysipelas crurum aut aliarum partium. cap. 6.
pag. 176.
Mania. cap. 7. pag. eadem.
Carus cap. 8. pag. 179.
Lethargus cap. 9. pag. 186.
Catochus. cap. 10. pag. 191.
Memoria læsa. cap. 11. pag. 194.
Melancholia. cap. 12. pag. 198.
Epilepsia. cap. 13. pag. 210.
Vertigo. cap. 14. pag. 217.
Apoplexia. cap. 15. pag. 220.
Paralysis. cap. 16. pag. 227.
Stupor. cap. 17. pag. 236.
Convulsio. cap. 18. pag. 238.

Tre-

Tremor. cap. 19. pag. 245.
Palpitatio. cap. 20. pag. 249.
Ophthalmia. cap. 21. pag. 251.
Angina. cap. 22. pag. 268.
Destillatio. cap. 23. pag. 283.
Raucedo. cap. cod. pag. 288.
Tussis. cap. 24. pag. 290.
Respirationis difficultas. cap. 25. pag. 297.
Sanguinis sputum. cap. 26. pag. 309.
Hæmorrhagia. cap. 27. pag. 330.
Pleuritis. cap. 28. pag. 335.
Peripneumonia. cap. 29. pag. 349.
Empyema. cap. 30. pag. 361.
Phthisis. cap. 31. pag. 364.
Palpitatio cordis. cap. 32. pag. 375.
Syncope & lipothymia. cap. 33. pag. 385.
Cardialgia. cap. 34. pag. 391.
Inappetentia. cap. 35. pag. 394.
Appetentia depravata. cap. 36. pag. 400.
Bulimia. cap. 37. pag. 403.
~~Kila~~. cap. 38. pag. 405.
Sitis. cap. 39. pag. 409.
Nausea & vomitus. cap. 40. pag. 413.
Imbecillitas ventriculi. cap. 41. pag. 419.
Cruditus. cap. 42. pag. 424.
Inflatio ventriculi. cap. 43. pag. 430.
Inflammatiō ventriculi. cap. 44. pag. 432.
Cholera. cap. 45. pag. 436.
Diarrhœa. cap. 46. pag. 438.
Lienteria. cap. 47. pag. 454.
Dysenteria. cap. 48. pag. 458.
Tinesmus. cap. 49. pag. 481.

Pura.

Purulentus secessus. cap. 50. pag. 485.
Colicus dolor. cap. 51. pag. 486.
Ileus. cap. 52. pag. 494.
Vermes. cap. 53. pag. 503.
Hæmorrhoides. cap. 54. pag. 513.
Inflammatio jecoris. cap. 55. pag. 523.
Scirrhus jecinoris. cap. 56. pag. 531.
Obstructio jecinoris. cap. 57. pag. 535.
Inflatio hepatis. cap. 58. pag. 539.
Imbecillitas hepatis. cap. 59. pag. 540.
Icterus. cap. 60. pag. 550.
Lienis inflammatio. cap. 61. pag. 559.
Scirrhus & obstructio lienis. cap. 62. pag. 564.
Magni lienes, & Scorbutus. cap. 63. pag. 567.
Cachexia. cap. 64. pag. 572.
Hyposarca. cap. 65. pag. 575.
Ascites. cap. 66. pag. 580.
Tympanites. cap. 67. pag. 589.
Renum affectus, & calculus. cap. 68. pag. 593.
Stranguria & dysuria. cap. 69. pag. 605.
Ishuria. cap. 70. pag. 616.

PRAXIS

PRAXIS MEDICINÆ

REMBERTI DODONÆI.

De Febribus.

CAP. I.

Febbris est calor extraneus, seu præter naturam, corpus infestans, & cordi communicatus.

1. Febris à fervēdo dicta creditur. Πυρετός apud Græcos ab igne, quàm πυρ, ut & ipsam quandocūq; Febrem, præsertim ardētissimam, appellant. Hippocr. passim. Orientales itidem linguæ ab incendio deducta voce Febrem denominare solent. Deuteronom. 28. v. 22. Germani contrā, à præcedente Horrore, vel Rigore, das Kaltvree, der frörer; Belgæ olim, die Zage, quæ vox metum denotat, vocabant (ut Latini veteres Querquerā) nunc, die coortse, forte à cooren, quod nauseare significat. Tam frequens autem hic morbus est, ut quidam veterum neminem sine illa mori contenderint: & febris vocē pro quovis morbo posuerint, sic Horat. pro illo Hesiodi; Νῆστι δ' ἀνδρώποισι Φοιτῶσι; Nova Febrium terris incubuit cohors, reddidit. Romani itaque Febri inter ceteros cruciarios exitus erogando homini deputatæ, ut cum Tertulliano loquamur, templum & aram sub monte Palatino, statuerunt. Ælian. var. histor. l. 12. c. 11. eiqua sacrificabant. Clem. Alex. in protrept. 2. Actionesq; consuetas ledens. nam siquidem seipso calidior factus sit aliquis, neutrum tamen horum patiatur, talem sanè febri citare nondum dicimus. Gal. 8. meth. med. 3. Vbi fons caloris nativi. 2. de fractur. quem in præter naturalem converti oportet, ut febris sit.

A

4. Vitalibus potissimum,
 & Naturalib. qui num-
 dentur, controversi ta-
 mē solet. Animales Mer-
 curial. nihil detrimenti
 pati, adserit. Contra-
 rium Bertrut. credidisse
 videtur. cui & nos magis
 adsentimur. quamvis ob-
 temperiē & paucitatem
 non magnum forte mo-
 mentum ad febris gene-
 rationem afferant. Est
 autem Febrium essentia
 in caliditate præter na-
 turam, quæ pro materia
 varia est. 1. de Febrib.
 & 10. Meth.

5. ΕΦήμεροι, & Πο-
 λυήμεροι opponuntur.
 8. Meth. c. 8.

6. Officiosā, sedulitas,
 & opella forensis Ad-
 ducit febres &c. Horat.
 1. epistol.

7. Ad lactis generatio-
 nem consequuntur Ephe-
 meræ tertio, quarto, vel
 quinto die in puerperis.
 Amat. cent. 1. curat. 34.
 Referunt, inquit Car-
 dan, in flumine Arotam

Accenditur autē hic vel
 in Spiritibus, vel in Humo-
 ribus, vel in Solidis parti-
 bus. In Spiritibus calor ex-
 traneus febrem procreat
 Ephemerā, seu Diariam; in
 Humoribus, Putridam; in
 solidis corporis Partibus,
 Hecticam.

Simplicissimæ, ac mitissi-
 mæ, minimèque periculosa
 sunt, Ephemeræ. Diemistæ
 non excedunt, propter te-
 nuitatē Spiritus in quo con-
 sistunt, qui diu excedentem
 Calorem non retinet: Et
 quia idem blandus ac va-
 porosus, mites quoque, ac
 minimè vehemētes [sunt.]
 Causæ sunt; ex labore, vel
 alia motione corporis, las-
 titudines. Ebrietates, maxi-
 mē ex vini potu. Exustio,
 sive corporis supercalefa-
 ctio; veluti ex diutina sub
 sole mora. Refrigeratio ni-
 mia. Vigilia excedens. Ira-
 cundia, & quævis animi ve-
 hemens motio, ut subita-
 neus, gravisque metus.

Signa sunt, 1. Calor mi-
 tis, non mordax, non acris,
 absque

absque rigore invadens, & insula beatissime Zeilan
 citra evidentē alicujus par- esse piscium genus quod
 tis dolorem; & cum levi manu deprehensum fe-
 • sudore, sive madore roru- brē accendat. 10. l. Sub-
 lento, desinens. 2. Pulsus tilit. Amisso pisce statim
 ad magnitudinem, & cele- liberatur qui eum tene-
 ritatem quidem in ipsa Ac- bat. Febriū idcirco ap-
 cessione accedens, sed qui pellavimus eum. Ceterū
 mox cessante hac ad natu- piscosissimus hic est flu-
 ralē statum revertatur, ne- vius. verū pisces illi neu-
 que ullam inæqualitatē præ tiquā esculēti sunt. Sca-
 se ferat. 3. Urina qualis sa- lig. Exercit. 218. §. 6.
 norum, quæ si talis postri- 8. Quum Ephemera in
 die perstitit; pulsu quo Spiritibus, unde sudor,
 que ad naturalem constitu- aut saltem mador in il-
 tionem reverso, non aliam larū declinatione? Spi-
 febrem quàm Ephemeram ritus calefactus dum ex-
 fuisse sperandum est. nam, cernitur, succum in su-
 ut Galenus ait, ex solutionis perficie corporis repar-
 modo species Febris cer- tū, in sudores attenuat,
 tius cognoscitur. in Diarijs & secū ducit. Stephan.
 enim cessante Accessione Athan. comm. 8. in libr.
 omnia simul abolentur. do- ad Glaucon.
 lores, si qui fuerint, non am- 9. Urinæ in Bubonum
 plius manent. Ephemerâ pallidæ, pri-
 vationebilis ad Inflam-

Curatio omniū Diaria- mationē vergētis, quem-
 rum Februm per Balnea, admodum in Phreniti-
 autore Galeno fit, acceden- cis. Sæpè tamē in his ob-
 servavimus Urinas biliosas; quod fit in habitu biliosiore.
 unde & tunc Erysi pelatodes inflammatio est. Steph.
 Athen. comm. 18. &c.

te idonea victus ratione. Ægineta verò subinde etiā Frictiones adhibet, & quādoque corpus oleo perfundijubet; modo uno, modo alio, pro ratione efficientis Causæ. Verum, quum nunc Balneorum, Frictionum, ac Perfusionum usus cessarit, Victus rationi maximè insistendum est.

Ex labore igitur lassī ac defatigati, frequentius cibandi sunt, exhibendusque ipsis cibus facilis concoctionis; & vini usus mediocris permittendus. Parcius nutriendi qui ex Ebrietate in Diariam inciderunt Febrē¹⁰. Qui verò ab exustione, aut super calefactione, aut diuturna sub sole mora febricitarunt, Cibo humidiorē reficiendi sunt. Refrigerati verò, & quibus cutis adstricta est, siquidem humorum non adsit plenitudo, mediocriter alendi sunt, admissō etiā vini usu. Vehementer autem Refrigeratos, si humorum copia adsit, à vino abstinere expedit.

10. Ingeniosissimus seculi nostri medicus Cassius, quē nuper vidimus, febricitanti cuidam & magna siti affecto, quum post ebrietatē eum premi cœpisse cognosceret, aquam frigidam ingessit. quā ille epotā, quum vini vim miscendo refrigerasset, protinus febrē somno, & sudore discussit. quod auxiliū medicus oportunè prævidit, ex causa quæ ante præcesserat. Celsus in præfat.

pedit. Inter Diarias Febres,
 præter illas quæ ex supra-
 dictis causis factæ sunt, re-
 feruntur & à Galeno, & ab
 Ægineta quæ cum Buboni-
 bus superveniunt¹¹. Causæ
 autem harum Februm non
 sunt ipsi Bubones, sed ex
 alijs causis simul cum Bu-
 bonibus gignuntur. Appa-
 rentibus igitur Bubonibus
 vel in Inguinibus, vel sub
 alis, vel in collo, confide-
 randum est, An simul cum
 Febribus, vel mox initio ap-
 pareant, vel post Febres
 diuturnas succedant. Nam
 qui Febribus diuturnis suc-
 cedunt Abscessus sunt per
 quos Febres terminantur¹²,
 & boni sunt. Qui una cum
 Febri, vel initio superve-
 niunt, duplices sunt; vel
 enim citra manifestam ac-
 apparentem causam gignun-
 tur; Et tales¹³ maligni &
 pestilentes habentur; præ-
 fertim accedentibus & alijs
 malis signis: Aut ex mani-
 festis causis originem ha-
 bent; Et tales non maligni
 sunt; Et Febres quæ ipsos

^{11.} Ad tumorem exter-
 nū in Emunctorio, præ-
 fertim parvū, non sequi-
 tur nisi Ephemera. nam
 vapores putridi tū per-
 veniunt ad cor, non cum
 sua substantia, sed cū
 suā virtute & alteratio-
 ne solā. Bertruzius.

^{12.} Omnes Crises cum
 manifesta evacuatione
 sunt, vel cum Abscessu.
 Hippocr. 3. Progn. Ca-
 lidi humores ad excre-
 tionem commodi; crassi
 in Abscessus abeunt. Ib.
 Crassi autē sunt in mor-
 bis diuturnis. Gal. 2. de
 crisib. c. 11.

^{13.} Vide comment. 55.
 libri 4. Aphor.

A

comitatur inter Diarias reponuntur. Manifestæ causæ sunt, ut Ulcera crurum, vel brachiorum; dolores magni pedū, aut manuum, aut digitorum. item, & casus, ictus, vel aliqua similis manifesta causa.

Ex huiusmodi causis si supervenient Bubones & simul Febres, causis occurrendū est, quibus desinentibus Febres etiam cessant. Interea tamē æger tenuiori victu nutriendus est, & a vino arcendus, ut Galenus & Aegineta suadent.

De Febribus putridis.

CAP. 2.

¶. Alterius generis Februm quod in divisione opponitur Diarijs, commune quidem nomē non habetur; differentia tamen illarum duæ sunt, quæ non obscuris speciebus seu formis distinguuntur. nam quædam ipsarum ab humorum putredine succenduntur; quædam ipsas solidas animalis invadunt partes, quas Hæcticas vocant. Gal. 1. de diff. Febr. c. 7.

Febres, quæ ex corruptione Humorū proveniunt, Putridæ appellantur. propterea quod ex corruptione, & à natura sua permu-

tatis

tatis • Humoribus , origi-
nem habeant.

Duplices autē istæ sunt.
vel enim Symptomaticæ, si-
ve Accidentales [sunt,] ut
quæ ad Inflammationes, &
Erysipelata consequuntur:
Vel per se consistūt. de qui-
bus nunc agendum. Con-
tingit ramen quandoque ex
Sanguine fieri Febrem ci-
tra corruptionem, ut in Sy-
nocho. sed hujusmodi Fe-
bres non diu permanent ta-
les; sed citò in Putridas per-
mutantur, nisi tempestivè
remedium adhibeatur.

Putridarum autem Fe-
brium quædam Continuæ
sunt; quædam Intermit-
tentes, ut sunt Quotidianæ,
Tertianæ, Quartanæ, & Er-
raticæ.

Agnoscentur autem Pu-
tridæ septem modis. 1. Ex
Causis. si enim nulla præ-
cesserit Externa & manife-
sta causa, Putrida est Fe-
bris, à causa proveniens In-
trinseca, sive Antecedente.

2. Ex Urinis, quæ in istis
Febribus à naturali colore,

2. Putredo enim est es-
sentia totius corporis
putrescentis in corrup-
tionē ab externo calore,
commutatio. Gal. 11.
Meth. Hujus autem ini-
tium calorem internum
intendit, & igneum, hoc
est, febrilem facit. Est
verò, ut in Tumoribus,
sic & in Vasis, Humo-
rū duplex Putredo; ex
quarum mistione tertia
resultat ac provenit.

1^a. Quæ fit vincente Na-
tura, ac manente adhuc
Partium, ac Vasorum
Coëctrice facultate; quæ
non solum Putredo, sed
& Coëctio quædam est.

2^a. Quæ fit Natura vi-
cta, & Coëctrice usque-
adeo debili ut nullam in
bonū mutationē produ-
cat. 3^a. Quando ex his
mistis, quasi Semiputre-
do quædā existit. Gal. 1
de differ. Febr. c. 6.

3. Quando focus Putre-
dinis in Vasis quæ intra
Alas, & Inguina excut-
runt.

4. Quia pars humorum putrescentium sunt.

5. Concoctio enim, ut omnis alia naturæ actio, non nisi in tempore fieri potest.

6. Quia necessitas refrigerationis nondū magna est, ut in Augmento.

7. Ut fulgines circa præcipua hærentes viscera quanto ocius expellantur.

8. Propter putridos humores viscerum principalium, inprimis verò Cordis Vires quasi aggravantes.

9. Quæ propter revocationē naturæ, nocuementi sensum percipientis; & propter vellicationem membranarū aliarumq; sentientium partiū quæ in præcordijs existunt, ab humoribus acerbis, magis minusve motis, fieri consueverunt.

& substantia mutantur; & initio crudæ sunt. 3. Ex Pulsu, qui in Accessionis initio parvus est, & exiguā faciens *Ἀσολῶ*,⁶ velocem habet *συσολῶ*; ⁷ qui & hac de causâ, depressus dicitur: in Augmento verò Accessionis ad frequentiam & magnitudinem mutatur: Et utroque tempore Inæqualis⁸ est. 4. Ex Frigore, aut Horrore, aut Rigore in Initio Accessionis, quæ Febrē esse Putridā, & Intermittentē ostendunt. 5. Ex Caloris specie in Augmento, aut Statu Accessionis. si enim acris ac mordax tangenti sentitur calor ex putredine Febrē esse constat. 6. Ex Circuituum reditu. nam Ephemera non habet Accessiones plures quam unam. Putridæ autem plures habent Accessiones. 7. Ex diuturnitate Accessionis. Ephemera enim nō extēditur ultra viginti quatuor horas: Synochus non habet Accessiones, sed in multos dies prorogatur.

Putri-

Putridarum Febriū Curatio primò fit per Venæ sectionem. Optimum enim, inquit Gal.¹⁰ in omnibus Febribus quas putrescens humor procreat Sanguinē mox detrahare; modo Vi- res ferat, ac imbecillitas ac cruditas Ventriculi non ob- stent. 2. Per ea quæ Humo- res contemperant, con- coquunt, lentes incidunt, crassos attenuant ac ad ex- purgationem idoneos red- dunt; quæ talia esse debent ut Viscera etiā expurgent. 3. Per mollientia Enemata. quādo videlicet alvus dura est, & opportunū non fue- rit Purgans medicamētum exhibere; veluti in die Ac- cessionis; vel materia mor- bi adhuc existente cruda. 4. Per Medicamenta quæ vitiosos Humores conco- ctos & præparatos per al- vū subducunt. 5. Aliquan- do, sed tamen rarò per Vomitiones. Et tunc qui- dē quando natura suā spon- te ad has fertur, & conatur vitiosos humores expellere

Curatio gene-
ralis Putrida-
rum Febrium.

10. *Meth. med. l. 11. cap. 14. Natura namq̃ quæ corpora nostra gu- bernat, sublevata, & illo quod ipsam gravabat onere deposito, reliquū facilius vincet, & pro- priarum facultatū me- moria veluti revocata, quod concoqui aptū est, concoquet, quod verò expelli poterit, expellet. Ib. c. 15.*

11. *Vomitiones hominī monstrasse canis ride- tur. Plinius l. 29. c. 4. Vide eundē l. 11. c. 37. Damnavit has Æscle- piades. Id. l. 26. c. 3. & Cels. l. 1. c. 3. Si tamē natura suo spontē ad has fertur, quo vergit duce- re oportet. 1. Aphor. 25*

12. *Vieta, & Potua* san-
 ctissima Dea victui po-
 tuiq; prærant, ut Ar-
 nob. 3. contra gentes re-
 fert. Victum appello, in-
 quit Gal. non hunc tan-
 tum qui in cibis, & poti-
 bus est, sed & qui in
 omnibus alijs, ut otio,
 exercitijs, balneis, vene-
 re, somno, vigilijs, alijsq;
 omnibus quæ quomodo-
 cunque in hominum cor-
 poribus fiunt. Gal. 3.
 epid. sect. 3. comm. 9.
 Victus autem ratio Me-
 dicinæ quæ per se mag-
 na est, non minimi mo-
 menti pars existit. Me-
 thodi 11. c. 15.

13. Vix, nisi in univer-
 sali declinatione; quod
 etiam tum vel decocto
 hordei, vel aqua aliqua
 stillatitia ut cicchorij,
 acetosæ &c. diluere satius erit. Vinum quod in Thebaidæ
 [Ægypti,] & maxime circa Copton civitatē provenit tam
 tenue est, tamq; facile distribuitur, citoq; concoquitur, ut
 febricitantibus datum minimè illos lædat. Athenæus 1. di-
 pnosoph. in fine, Tale nostrum Rhenanum existit.

per vomitum, & non po-
 test. tunc aliquid exhiben-
 dum quod vomitionem ad-
 juvet, ut Syrupus acetosus
 simplex per se, vel cū aqua
 decoctionis ptisanæ. Con-
 tingit tamen quandoque ut
 Febres Quartanæ, Errati-
 cæ, diurnæ, & pertinaces
 per Vomitorium medica-
 mentum curentur. 6. Cu-
 rantur Febres per 12. Victus
 rationem, quæ & in om-
 nium morborum curatio-
 nibus plurimum habet mo-
 menti, & absque qua nul-
 lus morbus rectè curari
 potest. Ad Victus rationem
 pertinent & illa Potionum
 genera quæ ab Ægineta re-
 feruntur. Item Vinum te-
 nue & pauciferum, quod in

Febribus intermittentibus
 nullo præsentē Capitis do-
 lore, 13. admittitur. sed in
 Febre vehemēti, & quan-

do Ca-

do Capitis dolores adsunt 14. *Præmissis vacuatio-*
vinum concedi non debet. *nib. de quib. jã dictum.*
7. Providendum est Visce- *Requiritur autẽ ut ini-*
ribus per Fomenta, Olea, *tio Repellentia sint ; In*
Vnguenta, aut Emplastra 14. *declinatione, laxantia,*
Balneorũ verò, & Vnctio- *discutientiaq̃. sic tamen*
num totius corporis, quo- *ut quæ nobiliorib. ad-*
rum Ægineta mentionem *morentur partib. præci-*
facit, nunc nullus est usus: *puè hepatis, Ventriculo,*
sicuti neque Potionis aquæ *semper quid illorum ad-*
frigida, aut in frigida aqua *mixtum habeant quod*
natationis, *tonum & robur indere*
partib. istis possit. Vi-
de Gal. 11. Meth. c. 15.
&c.

De Tertianâ Febre In-

termittente.

CAP. 3.

Tertianæ Febres idcir-
co dicuntur quod ter-
tio die recurrant.

Duplices autem hæ sunt;
vel enim puræ sunt, sive ex-
quisitæ; vel impuræ sunt, si-
ve non exquisitæ; quæ &
nothæ & spuria dicuntur.
Pura est quæ sola Bile cum
Sanguine putrescente gigni-
tur. Incipit hujus Acces-
sio cum Rigore, hoc est,
cum Frigore, & voluntario
Motu depravato, ab acri &
bilioso humore musculos

1. Sanguis tamen, pro-
priè loquendo, alijs pu-
trescere non dicitur. quũ
enim putruit, in alios
humores, bilem nempe,
& melancoliam verti-
tur. quum putrescere in-
cipit putridus dici vix
potest, quod causa pu-
tredinis remota possit
ad suam naturam redi-
re. Gal. comm. 17. aph.
libr. 2. Vide Oddu de
Oddis in 1. fen. Avic. c.
de humorib.

2. Initio paroxysmorum magis quam alio illius tempore; quod tum propè centrum hæreant qui febrem producant humores; post illud vero ad paripheriam magis ferantur.

3. Quâ flavabilis augeri solet. Vide 3. Aphor. 21

4. 3. Aph. 29. quia flavabilis in illis maximè redundat. quam ob causam fortè & leones tertiano circuitu laborant. Cardan. de variet. l. 7. c. 27.

5. Cause procatartice quæ corpus biliosum faciunt sunt labores, ustiones sub sole, vigiliæ, cura, tristitiæ, excandescencia, alimentorum inopia, biliosorum alimentorum copiosior usus. Gal. 1. comm. in 6. Epid. 29. Aph.

6. Virium nempe debilitas, ventriculi cruditas, ætas &c.

& nervosas partes pungentes, & irritate. succedit mox acris, & mordax tangenti calor. sitis deinde magna. Vomitus: subinde biliosi ac meraci. sudores verò etiam copiosi circa Statum & in Declinatione Paroxysmi. Desinit hæc Febris ad integritatem, seu ἀπυρεξία; & Accessionis tempus non ultra duodecim horas extenditur. Urinæ rubent & intensioris coloris sunt quàm in sanitate. Vigent autem huiusmodi Febres maximè æstate. Promptissimè verò his corripiuntur adolescentes; & qui calido ac sicco sunt temperamento; ac in Exercitijs corporis versantur.

Incipienda curatio est à Sanguinis missione è dextri brachij interna vena, aut media; nisi sit quod prohibeat. quæ facienda oportuno tempore in die Intermissionis ac quietis. Deinde contemperandi sunt Humores frigidis, sed potissimum talibus quæ simul aperiendi

riendi vim obtineant. Frigida sunt ut Intybum, violaria, violæ ipsæ, lactuca, acetosa. Aperiunt verò etiā cichorium, dens leonis, lactuca sylvestris vulgo endivia dicta. item semina cucumeris, cucurbitæ, citrulli, & melonum. quibus addi possunt radices temperatæ aperientes & urinas provocantes; ut sunt asparagi, graminis, fœniculi. Ex his autē decocta parari queunt; quibus addi potest syr. ex intybo, vel ex cichorio, vel ex violis. Deficientibus herbis exhibentur aquæ istarum herbarum destillatæ cum aliquo Syruporum.

7. Febris enim hæc ex putredine putrescūt autem putredini apta h. e. cal. & hum. in simili loco si ventilari non possint, propter obstructions. Vide Gal. 11. math. c. 2.

8. Decocta tamen præstant,

Humoribus præparatis & signis concoctionis in Urina apparentibus, exhibendum erit in die quietis medicamentū clementer biliosos humores expurgans; veluti infusum Rhabbarbari; cūjus in bile expurgandā eximia est facultas. cui addi potest vel Diacatholicō, vel medulla castorise fistulæ, vel manna, vel

9. Non stipitum, neque folliculorum, quod flatulenti sint. Corrigunt autē senam tormina excitantem, anisum, diacatholicon, syr. rosatus solut. & manna

10. Non conveniunt hæc in ijs qui proni ad lienteriam. lubricitatē enim post purgationem relinquunt. Scammonium inquit Gordon. facile inflammatur. unde nec in principio morbi, nec æstate dandum. c. proprio.

syrupus ex frequenti infusione rosarum. quorum singula etiam seorsim exhiberi possunt. Datur quandoque etiam decoctum, aut infusum, fol. senæ, quod quidem addito Rhabarbaro præstantius erit, futurū. exempli gratia: & rad. foeniculi, aut asparagi ʒ β. eichorij cum radicibus m. β. violarum. p.j. sem. frigidor. Communium majorū quatuor ana ʒ j. fol. senæ, ʒ β. uvarum passarū mundatar. ʒ β. sem. anisi ʒ ij. vel ʒ β. fiat decoctio in aquæ. q. s. ad ʒ iiij. aut v. in qua infundantur rhabarbari ʒ β. aut ʒ j. colaturæ adde manna ʒ β. vel syr. rosati ex frequenti infusione rosarum. ʒ j. β. Conveniunt etiam robustis, ac duris corporibus, el. diaprū. & quod de psyllio dicitur¹⁰. item quod à succo rosarum nominatur: quod tūc maximè cōvenit quando utile est adstrictionem post evacuationē relinqui. Expedit verò etiam quandoque Enema, sive Clysterem

rem injicere; quando videlicet alvus dura est, & opportunum non est purgans exhibere. Componendum autem Enema ex decocto herbarum humectantium & mollientium; ut sunt malva, bis-malva, atriplex, violaria, mercurialis; quibus quandoque additur beta. utiliter & furfures tritici adduntur abstersionis causa. hujusmodi decocti accipitur libra, cui adduntur aliqua refrigerantia ut sunt ol. violarum, ol. rosarum; & aliquid quod expurgationem adjuvet ut est diacatholic. vel diacassia, vel saccharum rubens; addita salis exigua quantitate, videlicet ℥j. vel ℥ss. ne clyster in intestinis hæreat: & malve, bis-malvæ, mercurialis ana m. j. violariæ. p. j. furfurum tritici. p. j. fiat decoctio ad ℥ss. j. colaturæ adde ol. violarum ℥ij. ol. rosati, aut ol. amygdal. dulcium, ℥j. diacatholic. ℥iiij. sacchari rubri ℥j. salis ℥j. fiat Enema.

Quod si verò in Acces-

11. Præstat tamen Diacathol. nā diacass. raro bona habetur in phar-macopotijs, eo quod facile corrumpatur.

12. Quod tamen, ut & hieræ, præsertim validiores, qualis Logadij est, & alia omnia acriter vitandum in ijs qui Hæ-morrhoidibus obnoxij sunt.

13. In *Tertiana* & omni *Intermittente febre* utilis in principio paroxysmi vomitus, præsertim spontaneus, vel non violentis provocatus; quemadmodum utile est in fine paroxysmi tolerare sudores. vacuetur enim quid de materia antecedente. unde conjunctam deinde facilius superat natura. hinc paroxysmi sensibilibus evacuationibus. leviores fiunt, & tempore intermissionis videtur sibi ex toto curati. at nulla facta evacuatione tempore intermissionis toti

sunt ponderosi & graves, cum modica alleviatione. Gord. c. proprio. 14. V. g. capo hordeo infarctus & coctus. cujus tamē jusculū quam carnes ipsas concedere satius erit. Vide 1. aph. 17. 15. Magis enim humectat. & sudores etiā promovere creditur Montano & alijs. Vile etiā serum lactis cum violaria, dēte leonis, cichor. acetosa, vel similib. refrigerantibus decoctum. 16. Quod à febrium valetudines attinet non dandum in febre, nisi veteribus aegris vinum; nec nisi declinante morbo. in acutis verò periculis nullis, nisi quæ manifestas remissiones habeant; & has noctu potius. dimidia enim pars periculi est noctu, hoc est, sp̃s somni bibentibus, Plinius l. 23. cap. 2.

tionibus natura sit ad vomitiones propensa, neque hæ faciliè succedant, adjuvanda erit vomitio exhibitō syr. acetoso per se, vel cum aquâ tepidâ, aut cum ptisanæ decocto.

Victus ratio in Tertianis exquisitis humida sit oportet ac frigida, ut est ptisanæ cremor, vel cibi cum ptisanâ, vel refrigerantibus herbis decocti, ut sunt lactuca, cichorium, rad. cichorij. Potus sit ptisanæ decoctum, quod etiam tenuissimæ cerevisiæ præferendum est. à Vino abstinendum est: & si forte vi-

res hoc requirāt, parcè admodum eo utendū, eoque tenui, aquoso, ac diluto; nec prius tamen quam apparentibus concoctionis signis. A melle, sale, & omnibus calidis ac acribus abstinendum; ut sunt sinapi, nasturtium, eruca, piper, zinziber, & alia.

De Tertiana spuria.

CAP. 4.

Tertiana non exquisita tertio quoque die recurrit. sed accessio hujus cum minore, quandoque nullo, aut exiguo invadit rigore; & diuturnior est, ac duodecim horas excedit.

Causa efficiens, non Bilis sincera, sed bilis pituitoso humori permixta cum sanguine putrescens.

Calor idcirco mitior est, nec adeò acris ac mordax, ut in purâ, sive exquisitâ. sitis quoque minor. Vomitione bilis pituitæ permixta succedit, sudores pauciores, vel qui difficiliter erūpant. urinæ ferè rubent, sed diu-

1. Quod humor spuriam hanc producat minus acris sit propter permixtam pituitam.

2. Peccans enim humor crassior & lentus magis existit. nude difficiliter & per habitum expelli, & à natura concoqui potest.

B

3. *Cruditates enim Repletio & Otiū faciunt.*

4. *Propter crassitiem, & lentorem pituitæ viscerum rafa, & pori, præsertim hepatis, facile solent obstrui.*

5. *Cannabinum, vel Avicenna dictum.*

tius crudæ permanent. Vigēt hujusmodi febres etiam in æstate, aut in vere; & maxime his corripiūtur qui calidiore sunt tēperamento, sed cibo pleniore utuntur³, ac in otio vivunt. præsertim quādo cōsuetā exercitia intermiserunt. In hac febre viscera, & præsertim hepar⁴, facile obstruitur, & ventriculus nō rarò quoque cruditate laborat.

Sanguis in Tertianā spuria utiliter quoque detrahitur, observatis conditionibus quæ dictæ sunt, & postea quam alvi excrementa descenderint. Humores verò præparandi ac concoquendi nō omnino frigidis, sed ijs quæ vim habent obstructiones aperiendi. Cōveniunt quidem cichorium & dens leonis, sed utile ipsis addi radices fæniculi, vel apij, aut petroselini; & ex herbis cuscutam, luputum, & s. hepatorium vulgare; præsertim post morbi principia, ac febre inveterata. Ex syrupis initiò quidem

dem utilis syr. ex cichorio,
vel similis. sed post paucos
dies illi admisceri cōvenit
vel syr. acetosum simplicē,
aut compositum, vel oxy-
meli, vel syr. de radicibus;
& morbo progrosso, syr. de
Byzantio⁶. Gal. verò ac Æ-
gineta etiā absinthium, sed
non nisi post septimū diem
exhibendum suadent.

*6. Cum aceto factus, ubi
majore incisione opus
fuerit.*

Purgatio instituenda est,
non ex solis ijs quæ bilem
educunt, sed expedit quoq;
addi quæ pituitam purgant,
ut est agaricus, vel turbita
in robustis corporibus. atq;
idcirco etiam, neque solum
ex prunis, aut ex psyllio, aut
ex succo rosarum electua-
rium exhibendum, sed ad-
dendum quoque est vel el.
diaphænicon, vel quod In-
dum dicitur. Clysteres verò
etiam in Tertianis spurij
non admodum molles esse
debere, Gal. ait. Vomitoriū
etiam medicamentum in
istis febribus, quando diu,
perseverāt & curationi re-
belles sunt, utile est post ad-
sumptum cibum, Gal. etiam

*7. Aetius dicit multos
se novisse qui hujus usu
curati sint. cap. pro-
prio. Dandum autem in
initijs paroxysmorum.
tunc enim facilius Vo-
mitus provocari poterit.
Lene verò Emeticum ex
radicula, rad. asari,
fol. atriplicis, cum oleo
parari poterit.*

autore. cuius tamen non est nunc usus frequens.

Victus ratio minus frigida esse debet, quam in exquisita Tertianâ. Cibus coctus facilis; cum quo hyssopus, origanum, petroselinum commodè coqui possunt. qui exhibendus in die intermissionis, non copiosus, sed ut vires sustineat. Vinum tenue & aquosum concedi potest, modo caput non laboret. quod non solum apparentibus in Urina concoctionis notis, sed etiam prius admitti potest; præsertim si diu duraverit febris. Laudatur etiâ propotu Oxymeli, sed aqua dilutum; præsertim quando crudæ pituitæ multa adest copia. potest etiam dari ptiisanæ decoctum cum cinnamomo paratum, vel cum zinzibere: cruditate existente magnâ.

De Quartana.

CAP. 5.

Quartana febris quandoque febri ardenti,
aut

aut continuæ : succedit; 1. Imò & tertianæ, quā-
quandoque nulli alteri fe- do non curatur. Hip-
bri, aut morbo supervenit, pocr. de Affect. Quar-
sed spontè oritur. tanam serè præcedunt

Quæ febribus continuis, Erraticæ. nam melanco-
& maximè ardentibus suc- licus humor fit etiam
cedit, ex bile atra per adu- adustione; quæ dum in-
stionem genita magna ex æqualiter procedit in-
parte originem habet. Mo- æquales periodos facit.
lestior autem & difficilior Stephan. 1. ad Glaucon.
hæc est quam aliæ. comm. 43.

Quæ nulli alteri succe- 2. Quia & Atra bilis
dunt duplices sunt, vel Pu- malignior, & propter
ræ, & exquisitæ; vel impu- adjunctum calorem ma-
ræ & spuræ. Exquisitæ sive joris activitatis est, præ-
puræ, ex humore melanco- fertim illa quæ ex supe-
lico frigido & sicco cum rassata flava bile gigni-
sanguine putrescente pro- tur; quam melancholia
veniunt. Impuræ sive spu- simpliciter dicta; quod
riæ generantur quando cū & bilis facie sanguinis
humore melancholico alius magis activa. Vide Gal.
quoque, humor computres- de Atra bile. circa ini-
cit, biliosus, vel pituitosus. tium.

Quod si plures humores si- 3. Rarè videntur Quar-
mul computrescunt, febres tanæ puræ; quia semper
nascuntur Erroneæ certum aliquid Pituitæ permis-
ordinem ac typum non ser- cetur Melancholiciæ. Mon-
vantes. tan. conf. 23.

* Quartanæ omnes cum 4. Itaq. illud, Πύρρως
Horrore invadunt, qui me- quod libr. de ty-
dium quiddam est inter Ri- pis Quartanis tribuitur
gorem & Frigus, calor inde de diuturnitate potius,

quam vehementia, intelligendum venit. Rigor quum duplex sit, *δυσεντέριαν*, & *σφοδρὴς*, à Melancolico succo quandoque talem qui non nisi difficulter ad calorem deveniat; quandoq; vehementem, *fiori testatur Gal. 1. comm. in 6. epid. aph. 9.*

5. Quadrini circuitus febrem nunquam Bruma; nunquam hybernis mensibus incipere, *Plinius refert l. 7. c. 50. An quod humor frigidus vix nisi tempore fervido putredinem, caloremq; concipiat? Huc referendū illud Iuvenalis: Iam lethifero cedente pruinis Autumno; jã Quartana sperantibus agris. Satyr. 4.*

sequitur, in ijs quæ ardentibus febribus successerunt, & in spurijs biliosis, satis magnus; in alijs verò minor. Sitis non molesta est, nisi quandoque in ijs quæ ardentibus febribus supervenerunt, vel ex bile simul permixta. Vomitus bilis negat Galenus in quartanis succedere. Contingit tamē non rarò in quartanis non puris bilem vomitione reddi, & quandoq; etiam prasinā, aut æruginosam. Urinæ inconstantes sunt. In ijs quæ ardentibus febribus supervenerunt subinde rubent in alijs, die quæ febrē præcedit subinde tenues sunt & albæ: die verò paroxysmo succedente, ut plurimum crassæ, & turbatæ. Incipiunt quartanæ, declināte æstate, veluti & singulares accessiones etiam declinante die ac post meridiem invadunt.

Quædam autem sub finem æstatis ante Æquinoctiū autumnī superveniunt, quæ breviores sunt. Aliæ post

post Æquinoctiū vernum;
quæ diuturniores sunt. Sta-
tus Quartanæ 6 Solstitium
est hybernū; præsertim ea-
rum quæ puræ sunt, & Au-
tumnales. nam Spuriæ bi-
liosæ, quales sunt æstivæ,
prius quandoq; terminan-
tur; vel multo ultrà perseve-
rant. Superveniunt Quar-
tanis frequēter sudores, vel
sanguinis è naribus fluxus,
vel alvus lubrica. Nulla ha-
rum Vacuationum superve-
niente vel hydrops Ascites
non rarò succedit; qui &
post immodicam sangui-
nis profusionem aliquando
etiam sequitur; aut in tho-
racem humoribus destil-
lantibus Phtisis supervenit.
Hæmorrhoidū verò fluor
in Quartanis accedens, nō
exiguam utilitatē confert,
sicuti & quandoque Dysen-
teria. Cuivis Ætati Quarta-

na supervenire potest 7. Se-
nioribus qui sexagesimum
annū excefferunt, valde pe-

6. Quartana tarde fini-
tur, nisi primis diebus
discussa est. Cels. l. 3.
c. 15. Et; Vetus Quarta-
na rarò nisi vere solvi-
tur. Ib. Durat regulari-
ter per annum, inquit
Gordon. quia sicut acuti
morbi sequuntur motum
lunæ; ita diurni motū
solis Id. Ad biennium
nonnunquam perdurat.
Gal. de typis. Ad annos
duos cum dimidio pro-
tractam vidimus, & ul-
tra annis. 1612 & se-
quentibus tribus, quib.
multi Quartanis labora-
rūt in hisce regionibus.
Vide Wieri observato-
nes.

7. In quavis etiam re-
gione; Scotiæ namque
prærogativam illam tri-
buere quod nemo illic
Quartana corripiatur,

ridiculum est. præsertim quum ipsi Scoti id controvertant:
Vide H. Steph. de latinitate Lipsij.

8. Sic tamen ut curari possit ; quemadmodum in viro amplissimo contrigisse vidimus.

9. Ac tū aqua inter cute producta sepe interficit. Hippocr. 1. epid. sect. 3. aph. 4.

10. In Quartanis medicina Clinice propemodū nihil pollet, ut Plin. refert l. 30. c. 14. nec idcirco tamen ad Magorum remedia, quod ille facit confugiendum. neque enim hic locum habet illud ; Flectere si nequeo superos, Acheronta morebo. Et potest Clinice predicere morbi longitudinem ; & omnia nihilominus ad curandum facere quantū subiectum & morbi modus admittere possunt.

riculosa est^a. In hac febre facile lien obstruitur ac durescit ; & jecinoris ac ventriculi facultates debiliores redduntur⁹.

¹⁰ In Quartanis qui acutis morbis successerunt, non temerè sanguis est mittendus ; viribus ex priore morbo languidis, & nondum reparatis. In alijs Quartanis, si vires ferant, utile est sanguinem detrahare, ex sinistri brachij media, sive interna vena. & si sanguis fluat niger & crassus, audacius, ut Gal. ait, mittendus : si verò tenuis ac flavus statim supprimendus.

Leniter autem initio omnes Quartana laborantes tractandi sunt ; & diligenter cavendum, ne ullum intensæ qualitatis sive calidum, sive frigidum medicamentum ipsis exhibeatur. Si quæ autē videantur exhibēda, ea sint aperientia, & lieni maximè accommoda ; ut sunt rad. fæniculi, asparagi, capparorum. item asplenium, capillus veneris, fumus

fumus terræ, & si causa frigidi-
or, eupatorium vulga-
re; quæ in liquore aliquo fa-
miliari incoqui possunt. In-
terim levi aliquo medica-
mento ventrem quandoq;
expurgare utile fuerit; ut
ex decocto senæ, addito
epithymo, vel diacatholi-
co. Injici quoque poterunt
Enemata; præsertim alvo
existente duriore.

Victus ratio sit ex Ci-
bis boni succi, & facilis
concoctionis. Abstinendū
à carne suilla. præterea etiā
à piscibus; à carne volu-
crū circa paludes ac aquas
versantium; ab omnib. sal-
samentis & fumo duratis;
ab omnib. quæ lentum ha-
bent succum, ut sunt anima-
lium extrema. à legumini-
bus abstinendum, & fructi-

11. In Principio non
est nimis purganda ma-
teria, quia non potest
esse concocta. Decipit
autem quandoque bene
colorata & cum hypo-
stasi urina, in ijs qui
parco victu usi benè
dormiunt. proveniunt
autem à cibo concocto;
non à materia morbifi-
ca. Gordon. Vide Ca-
poracc. de urinis. Quod
si nec hæc exhibere quis
velit & alvus dura sit,
ex decocto Veronica, &
carduibened. similibusq;
facto clystere subduca-
tur. qualib. enematis so-
lis multos curatos te-
statur Crato, qui initio
paroxysmorum tormi-
na ventris sentierant.

12. In Quartanis vi-
ctus, inquit Aristot. ex-
tenuandus non est. 1. Probl. 57. An ut siccitas faculenti
succu corrigatur! Vide Steph. Athen. in 1. ad Glauc.
comm. 140. 13. Danda opera est ut ne qua cruditas
id malum in Quotidianam vertat. nam quartana nemi-
nem jugulat; sed si ex ea facta Quotidiana est, in malis
eget est. Cels. l. 3. c. 15. Robori itaque ventriculi diligen-
ter quantum fieri potest consulendum.

14. Oportet exercitijs
uti; & quo die paro-
xysmus futurus est som-
num vitare conducit.
1. Probl. 57.

15. Ignis corporibus in-
dendus est, ut à majori
inquit Aristot. minor,
qualis in Quartanis exi-
stet, marcescat; quem-
admodum lampadis à
majori igni flammam
extingui videmus. quod
enim multū est id quod
exiguum est ad se rapit.
1. Probl. 57.

bus crudis: nec casei usus
confert. Utile est vinum te-
nue, albidum, & non valde
calidum. admittitur & ce-
revisia tenuis ex bonis fru-
gibus cocta. Eo die quo ex-
spectatur paroxysmus à Ci-
bo abstinere valde expedit.
si verò id vires non ferant,
cibus exiguus septem aut
octo horis ante accessionē
dandus erit. In diebus verò
intermissionis, ut ad con-
sueta sese exercita¹⁴ trans-
ferant, permittendum est,
autore Gal.

In progressu morbi, præ-
sertim circa solstitium hy-
bernum, & in quartana pu-
ra, vel in ea quæ ex melan-
cholico succo cum pituita
permixto provenit, liberius
calidis¹⁵ medicamentis uti
licet. tunc decoctū thymi,
ac hepatorij vulgaris utile
est. item & piper nigrum
aliquot diebus, ut Gal. tra-
dit, adsumptum, vel etiam
cibis permixtū. sic & Elect.
diatrionpiper. & Diospoli-
ticum exhiberi posset. Ex-
purgari & tunc corpus ex-
pedit

pedit medicamentis paulò
valentioribus, ¹⁶ quæ atros
humores exinaniendi vim
habeant, ut est confectio
Hamech quæ decoctioni
ex folijs senę commodè ad-
ditur. Et non semel tantum
sed sæpius, si ne cessarium
fuerit, ut Gal. monet, pur-
gatio faciendā; intermedio
verò tempore exhibenda
quæ aperiant & urinas mo-
veāt. Post purgationes Gal.
ac Ægineta suadent dari
Theriaca, aut medicamen-
tum ex succo Cyrenaico ¹⁷.
Prodest verò & Theria-
ca diateffaron ante acces-
sionē exhibita. profuit verò
& nonnullis pulvis zinzibe-
ris, & vulgaris usus zedoä-
riæ cum vino calente ante
accessionem datus.

Rondelet. post purgatio-
nes incipiente horrore spi-
nam dorsi ungendam do-
cet ol. calefacientib. ut sunt
ol. ex abrotano, rutæ, nu-
cum; pyretrum cum oleo.
dictaret narrabat. Succo condensati loco Extractum illius
sumi poterit.

16. Veteres Veratrum
dabant. Act. 1. tetrab.
3. c. 125. Recentiores
etiam decoctum, infu-
sumq; cort. rad. elleb.
nigri. 3. j. aut 3. j. β.
cum fol. senæ, rhabarb.
& correctorijs exhibēt:
Aut etiam pil. Cochias
cum elleboro nigro fa-
ctas. Sed quæ Dodon.
proponit tutiora sunt.
Gal. alb. veratri etiam
meminit, quo Paulus
prudenter abstinet. cui
quam Salio tutum id
prædicanti fidem adhi-
bere, satius fuerit.

17. Qui Laser & Sil-
phium dicebatur. Cyre-
naicus autē succus, quod
arenæ Cyrenes Laser-
piciferæ essent. Sunt qui
Asam fatidam esse con-
tendant. Author succum
Angelicæ se cū illo con-
tulisse, & prorsus eun-
dem reperisse, quum hæc

Extractum illius

18. Commēdatur & li-
nimentum ex Theriaca
& succo rutæ quo spina
dorsi immediatè ante
paroxysmū ungenta, &
lintheo calido admoto, in
lectum mittendus ager.

19. Fovenda pars que
invadente paroxysmo
dolet. illic enim focus
febris plerumq; existit.

20. Addunt quidam
pulv. sol. senæ, rad. cap-
par. ellebori nigri, colo-
cynth. & elaterij atque
cū ol. chamom. & pau-
ca resina ceratum quasi
faciunt.

21. Venam nonnulli die
paroxysmi majori cum
fructu secant; quod om-
nis tum materia morbi-
fica in motu sit; ideoque
facilius educatur.

18 quæ non solum faciunt ad
horrorem depellendū, sed
etiam ad sudores evocan-
dos, & ad morbi conco-
ctionem.

Providendum quoque est
in Quartana visceribus 19, &
maximè lieni, per ea quæ
molliunt & aperiunt; ut sunt
ung. ex ol. capparorum, li-
liorum, & rutaceo; addito
ammoniaco. Item empl. ex
ammoniaco dissoluto in
aceto, & recocto, lienis re-
gioni admoto; 20 vel aliud
simile, ut est empl. de meli-
lo to cui addi potest empl.
ex mucilaginibus. ita .n.
fiet empl. molliens, aperiens,
ac resolvens; qualia ung. &
empl. lieni adhibenda ma-
ximè esse convenit.

Verè si Quartanæ perse-
verent, & vires ferant, san-
guis non incommode ite-
rum detrahatur, ex sinistro
brachio, vel manu. 21 Non-
nullis persuasum est si san-
guis detrahatur ipso mo-
mento quo luna soli con-
jungitur, citò futurū finem
Quartanæ. Post sanguinis
missio-

missionē repetere etiā aperientia & purgationes utile est, nisi febris cessaverit. Gal. medicam. Vomitoria apparentib. signis concoctionis etiam consulit; quæ si exhibenda, veris tempore magis opportunè quam in hyeme exhiberi possunt. nam & Hippocr. satis aperte monet, hyeme à vomitione abstinendū. aph. 4. & 6. section. 4. Exhibenda autē sunt vomitoria paulo ante accessionem ²²; sed prius adsumpto cibo aliquo liquidiore. pro vomitorio sufficere potest Gratiola dicta herba, cujus plus, minus 3. j. decocta cum aliquo jusculo, vel cum cerevisia, vel etiam aqua satis per vomitū purgat decocto ejus assumpto.

²². Hippocr. Κατ' αὐτὴν τὴν λήψιν, in ipsa invasione exhibet. libr. de Affection.

De Erroneis Febrilibus.

CAP. 6.

Erraticæ febres eodem ferè modo quo Quartanæ curandæ.

¹. Quando plures humores simul putrescunt, erraticæ fiunt, ut supra dixit autor. c. de quartana. Inter hos quum sint

sint & illi qui Quartana inducunt, crassi nempe qui obstructions faciunt; ideo curandæ de obstruentibus, ut sunt illa quæ attenuant & detergunt.

2. Eleoselini, seu paludapij.

Initio sanguis mittandus; sed potius è dextro, quam sinistro brachio.

Exhibenda quæ viscerum obstructions aperiunt, & simulentos ac crassos humores attenuare queant; ut est decoctum ex radicibus fœniculi, petroselini, & apij, capparorum; Et ex herbis, ut fumo terræ, cuscuta, eupatorio vulgari, chamædr. addito aceto, aut oxymelite. itē & syr. acetosus compos. vel de Byzant. cum aceto, aut aliquis similis.

Purgantia medicamenta tempestivè adhiberi in huiusmodi febribus commodum est; & talia quæ diversos humores educunt, ut ex rhabarb. agarico, fol. senæ, epithymo, composita: Vel ex elect. diacathol. diapnoenici. & conf. Hamech; vel simili aliquò. Vomitoria etiam medicamenta, quale est è gratiola, in huiusmodi febribus subinde multum profuerunt.

Victus ratio potest esse talis, qualis in Quartana.

Ad

Ad has, & Quartanas referendæ, quas Hippocrat.

1. Epidē. Quintanas, Septimanas, & Nonanas appellat. quales tamen Gal. 1. de

differ. febr. 3 refert se nunquam observasse manifestē, scribens se nullum circuitum febris unquam vidisse, quæ ultra quatrIduum extenderetur.

3. Vide etiam quæ scribit comm. 2. sect. 3. libri 1. Epidem.

De Febre Quotidiana.

CAP. 7.

Quotidiana exputrescente cum sanguine pituita provenit, humore videlicet humido, frigido, ac saporis experte.

Cum Frigore extremarum partium hæc febris invadit, absque horrore, aut Rigore. Calor qui succedit non intensus, aut acris est, sed remissus, ac blandus velut ab aqueo vapore. Sitis in hac febre non molesta est. Nausea ac cibi fastidium sæpè adsunt. Vomitus pituitæ quandoque ac-

1. *Ad Glaucon. l. i. cap. 7.*

2. *Quia propter voracitatem etiam cruditates multæ coacervari in pueris solent; ut & in senib. propter defectum caloris nativi.*

3. *Vel etiam 14. aut 20.*

cedit. Quæ per inferiora excernuntur humidiora, crudiora, ac liquidiora sunt. Universum corpus crudis humoribus plenum invenitur. Facies sæpè tumida ac pallida est; tum & reliquæ corporis partes. Destillationes ex capite quandoq; comitantur. Urinæ sunt crudæ, albidæ, ac tenues; vel crassæ & turbulentæ; vel etiam rubicundæ testè Galeno. Obnoxij hujusmodi febribus maximè sunt pueri, præsertim natura humidiores: & senes quâdoque; tum & omnes ij qui crassi sunt ac pituitosi, inque otio & crapulis degunt; ac liberaliori potu utentes, præsertim crassioris cerevisiæ. Superveniunt Quotidianæ in regionibus humidis ac frigidis; & in anni tempore acaëris constitutione frigida & humida.

Diurnæ sunt febres, & accessiones habent longas ad duodecim; horas quandoque extensas.

Sanguinis missio quæ in alijs

alijs febribus utilis, in quotidiana minus convenit, propter humorum cruditatem. nam ubi humorū crudorum redundantia ad sanguinis missionē vires non sufficiunt, ut in libro de curandi rat. per sang. mission. Gal. apertè docet.

Et quandoquidem in hac facile viscera obstruuntur utendū incidentib. & aperientibus. Commendatur oxymeli, & omnia diuretica, ut sunt rad. apij, petroselinii, & pimpinellæ saxifragæ. Ex herbis origanū, hyssopus, satureia, thymum, betonica, chamædrys, marrhubium. Ex syr. de radicib. de Byzantijs cum aceto.

Quodsi expediens videatur corpus purgare, facienda purgatio cum agarico, vel in robustioribus cum turbith; vel cum hiera picra addito agarico; vel cum aliquo potentiore; vel cum el. diaphœnic. vel Indol.

Cibus sit facilis conco-

4. Vires enim augentur non quæ ingesta; sed quæ concocta, distributa, & partibus adposita sunt.

5. Acria enim & incidentia sunt, ut docet Gal. 5. de simplic. facultat. c. 13.

6. Ventriculū enim non perturbat; unde & medicina familiæ dictæ fuit; & tamen ejus frequenti usu Quotidianam curari posse, testatur Avic.

7. In artis operibus sæpe vidimus, dictum quidem & ab antiquis, sed rard, nempe fieri sæpe quotidianā expituita putrescente vel in ventriculo, vel in intestinis; ejusce modi, febrē cessare intra quartum, vel quintum diem, causa febris per clysteres solos vacuata. Steph. Athen. comm. 1. in l. ad Glauco.

ctionis, additis calidis herbis, ut petroselino, origano, hyssopo, thymo; vel calidis speciebus. Exhibere quandoque licet jus cicerum rubrorum additis. Vinū concedendum; album tamen; non rubens; nec valde dulce, aut crassum.

Providendum quoque est Ventriculo veluti ung. ex ol. nardino, vel ol. de mentha; additis ol. mastich. vel ol. ex nuce muscata, vel ol. ex garyophyllis, quod reliquis potentius est. Admoveri etiam potest ceratum stomachale, vel sacculi ex herbis, & seminibus, & alijs odoratis calefacientibus, ut ex absinthio, origano, mentha, si odor non offendat; rosis, sām. ammios, anisi, carui; addito cinnamomo, garyophyllis, mastiche.

1. Ἡπιάλα. Atticis quibusdā dicitur Rigor qui febrem præcedit. Gal. 2. de febr. differ. c. 6. Sic apud Pollucē hæc conjunguntur; Φερί-

De Epiala febre.

C A P. 8.

EPialæ ex genere sunt quotidianarum. In his simul febricitant ac rigent agro-

agrotantes ; & utrumque percipiunt eodem tempore in omni corporis parte.

Proveniunt ex humore frigidissimo, ut ex acida pituita, vel etiā vitrea³, quum ex dimidio computrescit, vel quum aliæ ejus partes putrescunt, aliæ verò non. Gal. de inæquali intemperie hujusmodi febrem fieri adserere videtur quando pituitosi frigidi succi, & amara bilis simul abundāt, & per sentientia corpora moventur, ita ut calidum & frigidū tenuissimis particulis sit aspersum.

ψυμδς, & εἶγ, ἡπλάλ. Et εἰσπούρεται νοce Epialon denotari scribit Enstath. Hoc tamen loco speciem febris significat qualē Gal. ex Archig. d. l. descripsit. 2. Aristoteles quidem scribit τῷς ἡπιαλῶσιν simul cū Rigore sitim molestam esse. verū id fieri quod non idē locus refrigeretur, & calefiat. Problem. sect. 27. problem. 2. Quem forte secutus Ioubertus negat ab eodem utrumque percipi & frigus, & calorem ; sed ab agro frigus

duntaxat, ab alio tangente calorem. ac calorem quidē fieri à pituita bili permixta in corde putrescente ; frigus à pituita liquata desuper, ut ex capite per habitum desfluente. Febres has Catarrhales vulgo dici &c. 2. Pract. cap. penultimo. Sed Archigeni, Gal. alijsq; viris in arte medicæ exercitatissimis hac in re fidem temerè derogare non debemus. neque enim vident omnes omnia omni tempore. Locus autē ex problemat. adductus de invasione paroxysmorum accipiendus, uti & Gal. accepit libr. de inæquali Intemperie. 3. Acrimoniam enim, ut & acetum, habent, præsertim ubi putruerint: ut non minus quā bilis Rigorem facere possint quando per totū habitum feruntur. propriè tamen dictum Rigorem bilis facit Gal. 4. aph. 63. comun.

Curatio hujus similis cū curatione ipsius quotidiana, nisi quod potentiora & efficaciora referat esse medicamenta tantò, quanto materia morbi est frigidior.

De Continuis.

CAP. 9.

1. Quando pro specie accipitur hæc vox, quæ contra Synochū dividitur. nam & generis nomen est, quod Synochos, & Continuas ambitu suo complectitur. Gal. 2. de differ. febr. c. 2.

2. Quæ alternis dieb. exacerbabantur ac τριταίοφως veteribus dicebantur.

3. Rarissimè videntur Quartanæ continuæ.

1. Epid. sect. 3. aph. 2.

4. Ac propterea ὁμογενεῖς dicuntur à Gal. 2. de Crisib. Causus, & ex-

Acta Tertianæ. 5. Has duplices Tertianas & Quotidianas continuas quidam Hemitritæorum nomine indigitabant, quod Gal. tamen se facere negat. 2. de febr. differ. initio.

FEbris quæ Synechees, h. e. continua dicitur, à Synocho differt. Continua exacerbationes habet & remissiones, sed ad apyrexiam non pervenit. Synochos verò unicam habet accessionem ab initio ad finem per durabilem.

Continuarum autem febrium quædam ad Tertianas * accedunt; nonnullæ ad Quartanas; nonnullæ ad Quotidianas. Tertianæ continua Causos *, & febris ardens proprie dicitur; præsertim si duplex fuerit.

harum

harum verò ardentium februm quædam exquisitæ sunt, ac puræ; aliæ minus exquisitæ sive impuræ.

Comitatur ardentes febres exquisitas intensus calor; mordax quoque ac acris. sitis valdè urget. lingua sicca ac aspera est. Vomitus si succedat admodum biliosus. sudores copiosi erumpunt. Urinæ admodum rubent. magna in pulsu celeritas, & frequentia. Vigent hujuscemodi febres in summo æstatis fervore. frequentes sunt in calidis ac siccis regionibus. qui autem temperamento sunt calido ac sicco promptissimè in has incidunt; præsertim si ex laboribus, aut exercitijs defatigati fuerint, aut inediam passi.

In minus exquisitis ardentibus, sive impuris calor mitior ac minus acris est, sitis, nō semper aded magna. nec lingua usqueadè aspera, sed frequentius albis fordibus gravata.

Supervenienti autem fe-

6. Hæcq; duo simul juncta propriissimum Causæ signum, atque indicium sunt. 4. Acut. 1. & 4. comm. & 3. epidem. sect. 3. aph. 34.

7. Præsertim si destilent humores ex capite. 8. Ob pituitâ adustam. hinc istud apud nos sæpissimè; linguae verd asperitas, qualis in puris Causis esse solet, non ita sæpe conspicitur.

C 3.

9. Quando sequitur remissionem prioris paroxysmi, ut sit initiū subsequēntis. Si autem in rigore paroxysmi accidat, lethale est. nam significat interiora auri, exteriora frigere. Ita conciliandi aph. in textu sup. citatus cū 46. ejusdem libri 4.

10. Major nempe morbus in minorem; quod minus malum est.

11. Ideoque nec de curatione harū, præter illa quæ de Intermitte te supra scripta sunt, necessarium fuit dicere.

12. Quod pituitosus humor agrè discutiatur.

brib. ardētibus rigor, bonus est. nā quæ febris continua fuit in intermitte tem^{io} permutatur, aut æger à morbo liberatur. Aph. 58. sect. 4.

Alia Continua ut Quotidianæ, & Quartanæ, non sunt Ardentes febres. contingit tamen, sic quandoq; nominari, sed improprie. Quotidiana continua similis est quod ad Accidentia attinet, intermittenti. sed exacerbatio cum frigore nō incipit, nec ad apyrexiam pervenit; sed priusquā una accessio desinat, altera supervenit.

Quartanæ cōtinuæ quarto quoque die exacerbantur; sed citra horrorem accessiones earum invadunt; nec integrè desinunt. Istæ si triplices fuerint difficulter ab impuris ardentibus agnoscuntur. habent tamē hoc proprium quod accessiones earum post meridiem aut circa noctem superveniunt; & quod citò in intermittentes mutantur.

De

De Synochis febribus.

CAP. IO.

Synochus febris quæ nullas habet exacerbationes, duplex est. vel enim à sanguine fit citra putredinem inflammato, vel à sanguine in omnibus vasis maximis æquabiliter putrescente. Inflammatur autem sanguis quia non eventatur, & vapor calidus non transpirat; qui retentus ea quæ contingit calefacit. prohibetur autem transpiratione propter cutis densitatem obstructis videlicet exilibus meatibus. obstruuntur autem & constipantur corporis isti meatus vel propter balnea adstringentia ut sunt aluminosa, vel propter externum frigus, vel alia simili causa. Similis autem hæc febris Diarijs habetur. quamdiu citra putredinem consistit. tunc enim calor ejus mitis, ac blandus sentitur; urinæ sano- rum similes sunt, & in pulsu

1. *Differentia Epacma-
stica, Paracma-
stica, Homotona, nihil ad cu-
rationem facit. nam cres-
cit remedijs non adhi-
bitis. decrescit adhibi-
tis, difficulter consistit:
quod si contingat Ho-
motona dicetur.*

2. *Aet. comparat vino
novo in vasis efferves-
centi. serm. 5. cap. 70.
calefactus eodem pacto
sanguis rare fit; atq; ita
loco contineri non po-
test.*

3. *Ut mora diutina sub
sole; (quod tamen ra-
rum est) vel à sordibus.*

4. *Calor sequitur mate-
riam in qua est; in bile
acris existit; in sangui-
ne mitis est.*

5. *Serum enim sanguinis
sunt; ideoque illo non-
dum putrescente muta-
ri non solent.*

C 4

6. *Potest esse magnus, frequēs, celer. in æqualis esse non potest.*

7. *Sanguinis enim tenuiores partes in bilem mutantur.*

nulla⁶ in æqualitas depræhenditur. Sed quando istæ febres diutius consistunt cito in Synochum cum putredine mutantur. sanguis enim quum calidus sit & humidus prohibita transpiratione citò putrescit. Contingit verò & synochū cum putredine fieri non præcedente altera. tunc videlicet ubi tanta est sanguinis copia ut gravet vires. quando enim vires copia sanguinis gravantur, bonitatem naturæ suæ sanguis amittit. quā amissā fieri nequit ut nō computrescat ut Gal. 9. Meth. ostendit. In synocho autem putrida Urinæ à naturali constitutione mutantur. in pulsibus inæqualitas apparet; & calor⁷ minus mitis aut blandus sentitur.

Excitatur synochus in ijs qui ætate sunt vigente, ac natura calidi, & in carnosiss bono habitu præditis. qui denso sunt corpore, sanguineq; multo abundāt. Tempus autem harum febrium maximè vernum est, teste Actio⁸.

Aetio¹. Qui autem raro ac 8. Serm. 5. cap. 70.
soluti sunt habitu, corpore
graciles, ætate ac tempera-
mento frigidi, hujusmodi
febris non corripiuntur.

Curatio autē Synocho-
rum in abundantis sangui-
nis evacuatione consistit, &
in caloris præter naturam
extinctione, & obstructa-
rum partium, si quæ restant,
Apertione.

1. Ad sanguinis autē de-
tractionem in utraque sy-
nocho festinandum; quem
ex dextri brachij vena me-
dia, vel interna duci expe-
dit pro virium ratione, nam
quibus sanguis tempestivè
detractus nō est in aliquod
gravius, malum incidunt;
nisi sanguis è naribus erū-
pens, vel aliunde profluens
ut per menses, aut hæmor-
rhoides; vel etiam copio-
sus sudor superveniens, ip-
sos à periculo eripiat.

2. Calor autem præter
naturalis victus ratione fri-
gida & humida adimetur;
ut aqua decoctionis ptisa-
næ, & ¹⁰ cremore ptisanæ, set.

9. Quia non superve-
niunt nisi in Plethora;
à qua quantum periculi
sit liquet ex Aph. Hip-
pocr. de habitu athle-
tarum. quidam ab hac
mutus factus sola phle-
botomia curatus fuit.
fiunt & Syncopæ, non
defectu, sed suffocatio-
ne spirituum. Angina
itidem, ac Catochæ me-
tus itidem nevenæ rum-
pantur.

10. Id est substantia
hordei mundati, (quod
ptisana veterum est) ex
decoctione relicta. Re-
frigerat autem, & satis
nutrit ad sustinendum
vires donec morbus ces-
set.

qui solus pro cibo sufficere potest, donec febris cessarit; nam tenui victu in febre synocho utendum est. Sunt & alia refrigerantia nō inutilia, ut lactuca, lapathum, oxalis, & similes herbæ.

II. Apertos poros indicat sudor. illo itaque procedente sufficienter, de apertione non est laborandum.

3. Meatus obstructi sudoribus succedentibus^u aperiuntur, quod si tanta fuerit constipatio ut sudores erūpere non queant balneum aquæ dulcis succurrere poterit. Aquæ frigida potio- nem in synochis, & febribus ardentibus utilem Græci tradunt medici; sed ut tutò exhiberi queat quædam requiruntur. 1. Ut venæ sectio, & Purgatio ubi convenit, præcesserint. 2. Ut in urinis manifesta appareant signa concoctionis. 3. Ut non propinetur nisi in Statu & morbi & paroxysmi; & tunc quidem tantum quantum^u ægrotanti libet. 4. Ut æger sit assuetus frigida potioni; & validis viribus, nullo interno viscere debili, aut malè affecto. 5. Ut aqua sit pura, & vitio carens.

II. Non tamen ultra quam libet, bibere cogendus est.

carens. Abstinere autem ab aqua frigida potione convenit eos qui graciles corpore sunt, & modicum sanguinem habent, ut sunt qui Hæctica febre laborant. citò enim aqua frigida solidas corporis partes¹³ carne nudatas offendit. Abstinere etiam debent naturâ frigidiores, atque in senectute constituti. Prohibenda quoque est aqua potio tempore hyberno, inq; locis frigidioribus. Ab aqua frigida & eos abstinere expedit qui febribus laborant non exquisitis ardentibus, & tertianis impuris, vel alijs ex crassis frigidisq; humoribus originē habentibus. Inutilis quoque & incommoda aqua frigida potio omnib. qui internum aliquod viscus debile¹⁴ habēt, vel obstructū, vel alioquin ab Erysipelate, inflammatione, vel tumore aliquo malè affectū habent. Aqua enim frigida intempestivè & ubi non convenit exhibita, crudos lentosque hu-

13. *Inter quos præcipue sunt nervosa. nervis autem frigidum inimicum. 5. Aph. 18.*

14. *Sive ex naturali intemperie, sive ex vitio adscititio.*

15. *Calculo, aut crudis humoribus qui alioquin descensuri erant, illic retentis.*

mores attenuari & concoqui non permittit, obstructions auget, & inflammationes, erysipelata, aliofque tumores resolvi impedit. & licet fortassis dum sumitur, vel mox à sumptione conferre aliquid videatur; morbum tamen reddit difficiliorem, & in periculum ac vitæ discriminē ægrotantem non rarò adducit. nonnullis enim stomachus, aut ventriculus ipse, alijs pulmo, vel septū transversum, vel hepar, vel renes, aut vesica, aut alia pars adeò graviter offenditur, ut difficilis inde consequatur affectus, ut difficilis respiratio, cibi cruditas, colicæ, renū^{is}, aut vesicæ dolores, & convulsiones vel tremores.

De febre Ardente exquisita.

CAP. II.

IN febre ardente exquisita, ex bile videlicet in magnis vasis cum sanguine putrescente, tēpestivè quoque,

que, si vires ferant, sanguis
letrahendus est.

Humores deinde præpa-
randi sunt refrigerantibus,
ut sunt in tybū, lactuca, vio-
aria, oxalis &c. quorū de-
coctum exhiberi potest vel
per se, vel cū syr. aliquo, ut
de violis, de succo intybi, de
succo oxalidis, syr. de succo
imonum, vel ex acetositate
citri utiles quoque sunt. qui
& per se dari possunt. Loco
verò decocti exhiberi pos-
sunt aq. ex ijsdem herbis
destillatæ cum quib. syr. di-
ui possunt. Purgatio insti-
tuenda ex ijs est quæ le-
niendo & refrigerando Bi-
lem subducant; ut est syr.
ex frequenti infusione ro-
arum, præsertim cum in-
uso rhabarbari datus. in-
unditur autem rhabarba-
um in decocto herbarum
am dictarum & sem. qua-
tuor frig. major. additis
runis, & myxarijs ali-
quot. Quibus autem hujus-
modi levis & naturæ fa-
miliaris purgatio non suffi-
cit, dari potest diacatholic. seam movet.

1. Ideoq; veteres quum
non nisi fortia cognos-
cerent in hac purgari
nolebant.

2. Syr. per se non satis
purgat. rhabarb. con-
trà calorem corrigit, &
tormina quæ facit; ne
fiant prohibet. Cassia
ventriculo molesta est;
& judicium de facibus
pervertit. Manna na-
seam movet.

vel el. de psyllio, vel diaprunum. quæ tamen non nisi valdè robustis exhibentur. In statu morbi aq. frig. liberalis potio admitti potest; observatis conditionibus antè dictis.

Victus ratio per universum morbi tempus tenuis esse debet, & simul humectans ac refrigerans. Ptisana utilissima est; cujus cremor commodè exhibetur. potest & ipsa cū pullo galinaceo decoqui, atque jus ejus propinari. Herbæ etiā utiles sunt, ut lactuca, oxalis, intybum, & similes quæ cum pullo decoqui possunt.

Potus sit decoctum ptisanæ, vel similis refrigerans. conceditur etiā nonnihil aque puræ in qua macerati sint limones decorticati, in tenues laminas scissif, addito exiguo saccharo. Aer quoq; loci in quo æger cubat refrigerandus est. pavimentū crebrò aqua frigida aspergendum. inferendum gramen virens, vel vitis, aut salicis folia, aut poly-

3. *Vel carne vitulina, si validiore alimento opus sit. Ipsa caro quod unctuosas; ideoque velut oleum in lampade sit, ut Razim experim. loquitur, negatur.*

4. *Vel serum lactis; vel lac unde butyrū extractum est; quod tamen propter caseosas quas habet partes minus quā serum probatur.*

5. *Tam in initio, atque augmento quam declinatione; sed non illa copia qua aqua pura.*

polygoni, aut plantagi- 6. *Hyphasis*, qui in sa-
 nis &c. salicis etiam rami *cris* literis *Phasis* dici-
 circumquaq; ponendi; fe- tur, præterquam quod
 neltræque quæ solem non *Caryophyllum* seu flo-
 admittunt, pateant⁶. Provi- rem, seu fructum defe-
 dendum quoq; in hujusce- rat, & aliam quod è Pa-
 modi febribus est cordi per *radysso* nascatur, notam
 epithemata foris adhibita, *habet*. fertur enim febrī
 ut ex aq. rosarum, buglossi, *laborantes* ardenti si in
 endiviæ, violarum, addito *illud flumen* mergantur,
 exiguo aceto rosaceo⁷, in morbo subito liberari.
 quibus nodulus macerari *Niceph. Callist. l. 9. cap.*
 potest continens spec. dia- 19.
 rhodō, vel diamargariton: 7. Hoc enim vim reli-
 quod Epithema per pan- quorum cito in corpus
 nos aliquos hoc imbutos⁸ *deducit. tenuibus nempe*
 egelidum⁹ admovendū est. *suis partibus quæ quan-*
 locinori verò & simili mo- *tum valeant in illis ap-*
 do provideri potest. Si vi- *paret quib. post aceti,*
 gilix molestæ sint poterit *aut cum aceto præpara-*
 & Epithema capitis fronti *torū usu continuo circa*
 ad moveri ex aq. nymphae, *verticem, aut etiam ali-*
 actucæ, papaveris, rosa- *bi, sudor prorumpit.*
 ū; addito lacte muliebri¹⁰, 8. *Granis alkermes, quæ*
 Cremori ptisanæ addi po- *cordi conferre putan-*
 est sem. melonum munda- *tur, tinctos; vel etiam*
 ū, aut etiam nonnihil sem. *albos multum enim non*
 papaver. albi. deinde & alia *refert.*

9. *Eo calore qualis la-*
lis recens emulsi. 10. *Quod quum humidum sit, non*
antum frigidum, ut reliqua, quandoque magis quam illa
omnium provocat.

12. Hæc, quia veteribus incognita, aut saltem inusitata fuere, quidam temerè damnant. Admoveri possunt post usum Universalium cum alijs, aut quando alia adhiberi non possunt. & sæpè per illa deliria sedantur. Actū frigida si applicentur ledunt, re-percussio nimirum ad Cerebrū fervore, sic ex creta frigida ad positione delirium aliquando ortū fuisse, verum est. Amoveri debent quum fœtere inceperint.

13. Fermentum acre & parabile, & potens est. commodeq; applicatur, nec odore vel agro, vel adfistentibus molestum.

adhiberi possunt, de quibus in cap. de Vigiljs. Quod si æger deliret somnus procurandus est. in quiete, & extra lucem ipse continendus. plantis pedū quædam subliganda sunt ut saponiger liquidior cum sale brassicæ folio impositus; vel columba viva fissa adhuc calens cū sanguine admovenda est, & adusque duodecim aut plures horas sub pedibus relinquenda. quæ cum aufertur in aquam frigidam abjicienda est, ne odor sit molestus. vel raphanidis cōtusa radix supponenda est, quæ tamen odore molesta est¹³. Quid autem contra sitim, asperitatem linguæ, aliaque symptomata agendum, suis locis dicendum est.

De Febre ardente non exquisita.

CAP. 12.

IN Ardente febre non exquisita sanguinē quoque mitti expediens est. Exhibenda

benda sunt non tantum refrigerantia, sed & quæ simul inscindere viscosos humores, vel obstructions aperire queant; ut sunt syr. de succo limonum, syr. de acetositate citri, syr. de succo cichorij &c. qui vel seorsim exhiberi queunt, vel cum decocto cichorij, dentis leonis, rad. asparagi, rusci &c.

Purgatio ex rhabarb. vel syr. ex rosis solut. utilis quoque est, præsertim addito agarico; tum & ex ijs quæ in curatione tertianæ non exquisitæ conveniunt.

Clysteres quoque in ardente febre exquisita tum etiam in non exquisita utiliter adhibentur, tales quales in tertianis.

Liberalis aquæ potio in hac febre admitti non debet. interim si sitis magna est, sedandæ illius causa admitti etiam potest aqua in qua macerati fuerint limones addito saccharo, & exiguo vino.

Victus ratio paulo libe-

1. *Nihil enim aliud quam tertiana impura continua est Ardens non exquisita.*

2. *Ratione frigidioris materiæ. Et nihilominus sensim, non affatim sumi debet.*

D

3. Ne phrenitis abusu vini subsequatur præcedentes cephalalgias, atque vigilias.

I. Paulus inter has febres non distinguit, sed omnes uno modo curat. tamen ratione partium differunt. nam Erysipelas ventriculi qui natura frigidus est, non tam vehementis existit, quam Iocinoris, aut pulmonum natura calidorum. itaque febris ex illius Erysipellate pronata Lipyria, quasi deficiens dicitur. In senibus, licet non post Erysipelas, sæpe supervenit; Significatque magnam debilitatem facultatis naturalis. Itaque non debet mitti sanguis; maxime in senibus; neque Purgationes; aut ullum aliud magnū remedium convenit.

ralior esse potest. Cibum coqui cum cichor. & lactucis nō abs re fuerit. Pro potu decoctum ptisanæ utilissimum est. à vino abstinendum; præsertim capite dolente & vigilijs molestis. Aerem quoque refrigerari non malum, præsertim si fuerit aeris status calidus & siccus. Contra vigilias admoveri, & exhiberi eadem possunt quæ in ardente exquisita. Quæ sub plantis pedum in exquisita ardente liganda sunt in hac quoque admoveri possunt; præsertim quando caput dolet.

De febr. ex Erysipelatium affectu.

CAP. 13.

Erysipelatis affectus tres circa interna viscera Actius

Actius refert. quorum unus circa ventriculum ac infernum ventrē consistit; unde febris dicta Lipyrias provenit. alter hepar occupat à quo Typhodes febris oritur. tertius in pulmone hæret cujus febris Crymodes propria est. In Lipyria febre interiora calent, exteriora frigida sunt. lingua sicca & aspera. sitis frequenter molesta. pulsus celer, frequens, inæqualis, sæpissime parvus. Ex harum autē genere sunt quas recentiores lentas febres appellant, quæ senibus exitiales ac perniciosæ; alijs difficiles sunt.

Venæ sectio in istis febribus nihil confert. Purgationes quoque non sunt utiles. Si alvus dura est, lenienda est molli clystere, tali quali dictum est. Victus ratio refrigerans utilis est; & quæ vires conservet, ut ex pullis gallinæis, vel alia carne tenera decocta cum herbis refrigerantibus, vel cū ptisana. Actius aquam, sed vi-

2. Manifestum quidem Rigorē inducit; at non æquè manifestum Fervorem, quod & ipsum nomen indicat. λέιπεται γὰρ πυρός, ἢ τοι τέρματος, ut Actuar. scribit.

3. In nulla enim febre alvum adstrictam esse, utile est.

no, in pauca tamen quantitate, addito, exhibuit. Aqua in qua recētes limones macerati cū saccharo & pauco vino utilis quoque esse potest, si parum ejus pro vice sumatur.

4. Vox enim τὸ Φω, à qua τὸ Φώδης derivatur, idem etiam quod καίω, uro, à quo, καὺσθαι, significat. An Venæ caræ inflammationem subsequens morbus apud Aretæū l. 2. c. 4. descriptus, Typhodes febris sit, videndum. Gal. certè Causos à veteribus dictos frequentissimè ex hepatis aut ventriculi φλογώδεσι Ἀγέρεσι, & quidē vehementissimos; quiq; frequenter in Marasmo desinant, supervenire refert. 4. de Loc. affectis. c. 6. 5. Ἀγέρη, quod idem quod καὺσθαι significat, hæc vox deducitur. Vide Hippocr. de Affect. & Gal. de loc aff. l. 4. cap. 6.

Typhodes febris + ad Ardentēs referenda est. Curatio quoque harum uti illarum. Aquæ frigidæ potionem in febre quæ ab Erysipelatio affectu originem ducit in morbi statu Ægīneta consulit. sed Gal. omnino prohibet aquam frigidam illis dari, quibus vel phlegmone, vel erysipelas circa interna viscera consistit, ut ante dictum est.

Crymodes s febris ad erysipelas pulmonis refertur, de cujus curatione Hipp. non uno agit loco, & de quo in curatione Peripneumonix nobis agendum erit.

Supersunt & duo alij Erysipalati affectus, ut erysipelas Vteri & Cerebri, de quibus quoq; suis locis dicendum.

De

De Hectica febre.

CAP. 14.

HECTICA febris est calor præter naturam cor & solidas partes diutius occupans, in quibus sic comprehensus est ut in $\epsilon\zeta\iota\nu$ vel habitum seu consuetudinem venerit. nam ægro-
tare aut febricitare se æger non sentit, omnibus partibus ejus æque calefactis. Perpetuo autem sui similis hæc febris est, & nec invasionem, nec augmentum, nec vigorem, nec remissionem habet. faciei color vividus per hanc febrem perit. frontis cutis arida & sicca redditur. nares fiunt acutæ, & oculi concavi. tempora collabuntur. universum corpus macrum ac siccum apparet; quod & aridius ab eo qui ipsum tangit, sentitur; à quo & calor initio debilis, sed immorando ac diutius manum applicando tandem acris, ac mordax percipitur. Pulsus parvi sunt, frequentes &

1. Sic dicitur, vel quod ut $E'\zeta\iota\varsigma$, difficulter solvatur; vel quod in $E'\zeta\iota$ (sic enim solidas ab humoribus destinguentes, appellat) consistat. 1. de differ. febr.

2. Non solum Humores, & Spiritus, sed etiam corpora quæ $E'\zeta\iota\nu$ habent, ut Gal. 1. de inæquali Intemp. h. e. τοῦ σερραῖ, ut Paul. 1. 2. c.

3. 1. loquitur, occupans. neque enim fieri potest ut non & Spiritus, & Humores incaluerint.

3. Nisi putredo humorum ideoque putrida febris conjuncta sit; aut pars aliqua circa cor inflammatorio, aut erysipelatio affectu laboret. Gal. in fine l. de Marasmo. Implicata autem putrida difficiliorē Hecticæ cognitionem reddit.

4. Prout ægrorum corpora natura sua magis minusve sicca, ideoque & magis minusve dura sunt; pulsus itidem magis minusve duri sunt, febris licet æqualis gradus laborantium, sic Belgarum in Hæctica pulsus minus duri quam Hispanorum percipiuntur.

5. Rarissime tamen id fieri solet. Gal. 3. de præfag. ex pulsib. c. 7. Sunt pestilentes ab initio Hæctica: & mærorem, aut iram interdum sequuntur. aliter an ulla ab initio hæctica fiat nescio. Ib. c. 4. Ab inedia etiam in cal. & siccis corporibus ab initio fieri testatur 10. meth. c. 4.

celeres, & pro corporis conditione duriores. Hæc febris si diu constiterit, & non prius æger vel curetur, vel moriatur, in non curabilem Marasmmum transit.

Duplici autem modo Hæctica oriuntur, vel diuturnis Ardentibus febribus succedunt, vel statim ab initio invadunt. Quæ ardentibus succedunt magnitudine differunt. quædam enim superveniunt nondum omni cordis, ac solidarum partium humiditate absumptâ; aliæ verò omni cordis humiditate consumpta generantur; quod fit quando febris ardens diutius prorogatur. tales non solum hæctica sunt, sed & marasmodies, ut inquit Gal. Quæ autem statim initio non præcedente aliqua febre ardente hominis corpus occupant initio Ephemeris febribus similes evadunt, sed diuturnitate temporis ab ipsis differunt.

Hæcticis febribus cæteris magis obnoxij existunt qui

qui calidi ac sicci, temperamento, & habitu corporis gracili sunt. tales enim si vel in ediam diutius sustinuerint, vel sub solis fervore diu versati fuerint, vel labore immodico aut vigilijs defatigati; vel ab animi motibus ut ira ac tristitia, aut mœrore vel gravius affecti, vel universis, vel pluribus convenientibus, in hecticam febrem facile incidunt, præsertim æstate, ac cæli statu calido, siccoque; nisi ardēte febre corripiantur; à qua etiamsi evaserint ab Hectica tamen tuti omnino nō sunt. ardentes enim febres in hecticam mutari quandoque contingit.

Curatio Hecticarum in ijs quæ squalidum corpus refrigerant ac humectant, consistit. Duplex autē horum materia est. quædam enim intra corpus sumuntur; alia foris admoventur. Intra corpus conveniunt Alimenta refrigerantia & humectantia, ut ptisanæ cremor. ipsa verò ptisana & in

6. Propterea quod partes nervosæ carne nudæ sint. ideoq; aquæ frigus integris adhuc viribus persentiscant; frigus autem nervis inimicum est. Caro verò nervorum σκέπη, & πρέβρα χαλκίων, ut loquuntur Timeus, Plato, & ex illis Alcinous.

7. Quod faciliè, in corporib. præsertim cal. & siccis, qualia Hæcticorum sunt, in bilem vertantur.

8. Quod tenue admodum est, & multum seri habet. Quū verò id apud nos rix haberi possit, vaccino fortè, præsertim aq. rosac. vel aliquin communis quarta parte permista, non incommodè ejus loco uteremur. nā & per se, propter pascuorum ubertatem, hic apud nos liquidius multo, quam in regionibus calidiorib. siccioribusque, existit.

9. Cyathus continet cochlearia quatuor, seu 3 j. β.

omni cibo utilis est, sicut & far ex hordeo, aut avena. Veluti & refrigerantes herbe ut lactuca, portulaca, violaria, & fructus nonnulli, præsertim qui non facile corrumpuntur. Aquæ potio ijs qui hac assueferunt utilis quoque est. sed non multa simul danda, sed paulatim inferenda. Cujus loco & commodè, exhibetur aqua decoctionis ptisanæ. A melle verò, & aqua mulsa, omnino abstinendum, & omnibus calefacientibus ac resiccantibus ut sunt aromata, & quæ inde conficiuntur. Febre autem hac moram trahente, commodissimè exhibetur lac asinæ, quod lacti muliebri quam aliorum animalium similis est, & minus citò in ventriculo corrumpitur. quod mane exhibendum, initio quidem non amplius 3 cyathis, ut Gal. suadet, potestea verò etiam amplius, quando

quando videlicet comper-
tum est in ventriculo non
corrumpi. bibendū autem
istud lac mox ut mulctum
est. Extrinsecus convenit
inprimis aerem contempe-
rare, ut non calidus, sed fri-
gidus sit, quemadmodum
in curatione ardētis febris
dictum est. Conveniunt &
ejusmodi Epithemata. lau-
datur autem à Gal. & ung.
refrigerans, ex cera lota, &
ol. rosato, ex ol. omphaci-
no etiā loto composito, ad-
dito pauxillo aceto. quod
non toti pectori, aut toti
ventri crit admovendū, sed
præcipuè partibus in quibus
calor residet, cordis videli-
cet, aut jecinoris regioni.
Balneum verò etiam com-
mendatur aquæ dulcis &
egelidæ, in qua si malva, aut
bismalva decocta fuerit,
tanto crit præstantius.

De Marasmo.

CAP. IS.

Marasmus est corru-
ptio corporis viven-

1. Quum riventia tria
sint, animalia, plantæ, ac
semina & fructus. de his

D 5

pro-

propriè ; metaphoricè
etiam de alijs quæ sicci-
tate corrumpuntur, hæc
vox usurpari solet. Gal.
de Marasmo. *Φθῆξις*
vox hic latè accipienda,
etiam pro illa corruptio-
ne quæ sine putredine
fit, quemadmodum ar-
bor carie corrumpitur.

tis ex siccitate. Duplex au-
tem Marasmus est. quidam
enim ætate contrahitur, qui
est ipsa mera senectus. alter
verò hecticis febribus suc-
cedit, quum videlicet hu-
midum primigenium, &
calidum innatum hecticus
febrilis calor depopulatus
fuerit. tunc enim cor &
corpus non modo siccus,
sed & frigidius redditur. &
talis quidem Marasmus se-
nectus ex morbo appella-
tur. quamdiu autem calor
extraneus sentitur, non Ma-
rasmus, sed Hectica maras-
modes dicitur. nec enim
prius quam deficiente ca-
lore Marasmus est. Est ve-
rò hic quandoque, non per-
fectus adhuc, videlicet ad
majorē corporis extenua-
tionem tendens. aliquando
vero planè absolutus. Non-
dum autem perfectus Ma-
rasmus est quū ea tantum-
modo quorum substantia
ex humore concreto con-
stat, sicut caro & adeps, li-
quata sunt. Major verò quū
propria humiditas unde
partes

partes nutriuntur, omnino consumpta est. Absolutus verò Marasmus est, quum etiam solidarum partium substantia reddita est siccior. In hoc Marasmo non solum frons tensa & sicca, oculi supra modum profundi, tempora collapsa & cava, extremâ & immodicâ extenuatione & siccitatem ostendunt, sed adeo quoque contracta sunt præcordia ac ventris muscoli consumpti, ut nihil ex ijs præter fibras & cutem supersit. Et talis curationem non recipit.

Qui verò ad perfectionem nondum pervenit curari debet extrinsecus quidem Balneis humectantibus, ut ex aqua dulci, aut ol. dulci; ut est amygdalarum dulcium, quo nonnulli senes sicci ac squalidi vitam suam produxisse dicuntur. Intrinsecus verò optimo cibo ac potu ali ac refici corpus debet, veluti ijs quæ facile ac cito cōcoquuntur & alimenti plurimum con-

2. *Extenuatis ita musculis & interaneis pulsus Aortæ lumbis incumbentis ferè ad xiphoidem cartilaginem usque, nonnunquam percipi potest.*

3. *Aristotelem in pelvi calentis olei lavare solitum Diogen. Laert. refert. Vixit autem annos septuaginta. Duo sunt, inquit Plin. liquores corporibus humanis gratissimi, intus vini, foris olei, arborum è genere ambo præcipui; sed olei necessarius. l. 14. c.*

22. *Pollio Remulus quicentessimū excessit annū corporis animique rigorem servasse se dixit, oleum foris, vinum intus adhibendo. Tali etiam balneo Paulus 3. in Pontificem maximum anno ætatis 67. electus ad annum 82. vitam produxisse dicitur.*

4. Non unius, sed trimum aut quatuor mensium. talium enim jus validius nutrimentum habet.

5. Simplici modo parati. nam qui majori artificio fieri solent, nidoris multum, imò & putredinis aliquod veluti initium habent; quod ex gustu atq; odore subputido facillimè deprehendēt qui nares emunctas, palatumque tersius habent. Succus autem qui ex carnibus elixis, aut semiaffatis exprimitur ut plus nutrit, ita debiliores etiam magis gravare solet. Medium quid inter hæc duo quod Colatitium mulierculæ vocant, atque ex concisa

pullor. aut gallinarum pulpa, superfuso ejusdem jure, ac per setaceum, aut linteum trajecto, conficiunt. 6. Vbirefrigeratum fuerit. alioquin mixtura ingrata redderetur.

De

ferunt. lactis usus non est improbandus. sed præter hoc conveniunt quoq; ova recentia, mollia, & præsertim ipforū lutea. Vina dulcia & flava. jura carniū musculosarum, pulli gallinacei⁴, carnes vitulinæ, & quum vires imbecilles admodum sunt, decoctarum carniū succi, ut carnis vervecinæ, aut vitulinæ, aut caponum⁵. Ex fructibus utiles habentur nuclei nucum pinearum, ac nuclei pistaciorum, qui contundi ac juri carnis admisceri possunt, aut cum saccharo⁶ in morculos digeri. Ab acidis & austeris omnino abstinendum est, & ab aquæ potu. Sæpius autem aliquid exhibendum; & hoc ipsum in nō magna quantitate. corpus enim refectiōem postulat; sed vires debiles copiosum alimentum non ferunt.

De febre Semiter-
tiana.

CAP. 16.

Semitertiana : ex tertia-
na & quotidiana : mi-
tura componitur ; & ex
duob. constat humoribus
putrescentibus, Bile videli-
cet, ac pituita : qui si pares
ac æqui potētes fuerint ex-
quisitam faciunt Semiter-
tianam. quod si verò alter
exuperet tunc unius mino-
ra quam alterius sunt sym-
ptomata, veluti Bile supe-
rante accidentia Tertia-
næ majora sunt : si pituita,
quotidianæ continuæ affe-
ctus firmiores sunt.

Invadit Semitertiana cū
horrore, qui medius est in-
ter Rigorem & Frigus. ab
invasione æger incalescit,
aque ratione Tertianæ; sed
propter Quotidianam ex-
stituta, caloris augmentum
interrompitur: sicut quum
febris prope Statum acces-
sionis, vel in medio augmē-
tū esse existimatur, horror
rursus accedat, & pulsus

1. Quod mediam ipsius
partem Tertiana, me-
diā Quotidiana consti-
tuat. 2. de differ. febr.
Alioquin si multitudinē
& malignitatem sym-
ptomatum spectes, non
hæc dimidium tertianæ;
sed tertiana dimidium
hujus dici deberet. 1.
Epid. sect. 3.

2. Continuæ 2. de dif-
fer. febr. c. 8. nam qui
ex utraq; intermitten-
te, ideoque intermitten-
tem fieri posse putant,
ut autor libri qui Me-
dicus inscribitur, c. de
humorib. contra men-
tē Hippocr. id faciunt.

1. Epid sect. 3. aph. 5.
Neque ex utraque con-
tinua componi potest,
quod cum horrore inva-
dat.

3. Quia tum sola invadit Quotidiana.

4. Quod tamen rarum est æqualis enim mixtura una est; inæquales infinite.

5. Quum bilis exuperat
24. quum pituita 48.
quum æquales 36. horarum paroxysmi fiunt.

tardiores, ac minores fiant, ac calor ab extremis partibus recedat; circa vetrē verò, ac Thoracem hæreat. Singulis diebus accessiones invadunt, sed uno die febris magis invalescit reduplicato etiam horrore; altero; verò mitior est. Et tales quidem sunt Semitertianæ quæ æquivalentes + fuerint humores, & tertiana quotidiana æqualis. Quum verò tertiana prævaluerit, horridior fit febris, & aliquid Rigoris associat, caloris plus habet, & magis festinat ad statum accessionis; & aliquid bilis per alvū aut per vomitum excernitur, & sudores fiunt copiosiores. Sed quum pituita potentior est frigus vehementius & diutius extremas partes occupat: horrores pauciores, tardius etiam accessio invalescit, & longiori tempore consistit, nec sitis, nec ardor excedit. Accessiones autem Semitertianarū, quandoque horarum sunt viginti quatuor, quandoque 36. longissi-

giffimæ quadraginta octo
horarum. ad apyrexiam in-
tegrè tamen non perve-
niunt. nam nullâ ex ijs quæ

ad apyrexiam evadunt, Se-
mitertianam Hippocrat. 6. *Vide 1. Epid. sect. 3.*
aph. 5.

appellavit. 7. Si pituita sub illa col-
ligatur ex cruditatibus.

Generatur autem Semi-
tertiana quandoq; ex Ter-
tiana producta; aliquando
per se incipit. Morbus lon-
gus est, & omnino pericu-
losus. Frequenter verò cor-
ripit virilem ætatem, &
ætatem virili proximam: &
tempore quidem autum-
nali. Hippocr. phthisicos
& eos qui longis morbis
detinentur, hac præcipuè
refert ægrotare. 1. Epid. 3. aph. 5. 11. Affli-
gitur autem & læditur per
hanc febrem ventriculus,
& maximè nervosæ ejus
partes. offenditur verò &
hepar non exiguè. subin-
le & lathargici conse-
quitur. Gal. d. 1. comm. 25. & de morb. temporib. circa
nem. 13. Hinc non solum nausea & vomitus, sed &
ingultus oboriuntur. 14. Quod ex tumore pedum con-
are potest. 15. Si pituita feratur ad caput.

Imo Agathinus omnes
tertianas longas semi-
tertianas vocabat; quod
Gal. non probat.

8. Quod complicatus
affectus remediorum oc-
casiones auferat.

9. In qua bilis ratione
ætatis; pituita ex prava
dicta colligi potest.

10. Quod Aer tum gra-
vis, & varius esse solet.

11. Quia magnus in cor-
de illorū calor est, pro-
pter impeditā respira-
tionem. Multa verò pi-
tuita propter ætatis
in illis coaccervatur.

12. Semitertiana ex-
quisita Romam inco-
lentibus sæpissimè ob-

16. Si bilis caput impetat.

quantur affectus; vel Vigiliæ¹⁶ molestæ sunt. lingua quoque subinde arida ac sicca. Difficilis autem hujus febris agnitio est, & vix non nisi post aliquot dies cognosci potest. atque idcirco & curatio ejus difficilior.

17. Propter vires jam prædebilitatas.

Semitertiana si prorogata & diurnæ tertianæ successerit, vel alijs longis morbis supervenerit, veluti phthisi, sanguinis detractionem¹⁷ non admittit. Si verò per se inceperit, non minùs quàm aliæ putridæ, sanguinis missionem requirit. qui tempestivè viribus adhuc constantibus, detrahendus est.

Medicamenta talia esse debent ut utriusque humoris putrescentis, flavæ videlicet Bilis ac Pituitæ consideratio habeatur. quomobrem nec multum calida, nec valdè calida hæc esse oportet; sed incidētia, aperientia, & abstergentia, & talia qualia in tertiana spuria conveniunt, sic tamen ut
ejus

ejus humoris qui amplius
 redundare videbitur major
 ratio habeatur. Ad præpa-
 rationem igitur humorum
 conveniunt rad. fœniculi,
 rusci, apij, petrosel. aspara-
 gi. & ex herbis cassuta, eu-
 patorium vulgare, cicho-
 rium, dens leonis. ex qui-
 bus decocta parari possunt,
 in quibus commodè dilue-
 tur syr. acetosus simplex,
 vel etiam de succo limo-
 num, addito etiam syr. de
 cichor si bilis amplius re-
 dundet; vel syr. de Byzan-
 tijs cū aceto, vel simili ali-
 quo, copiosiore existente
 pituita. Laudatur ab Avic.
 absinthii Ponticum¹⁸, non
 statim, nec in initio morbi,
 sed apparentib. in Urina
 concoctionis signis. quod
 & à Gal. Aetio, & Ægineta
 in curatione Tertianæ non
 exquisitæ commemoratur.
 absterget verò bilem, &
 robur ventriculo conciliat.

Humores verò peccan-
 tes expurgari convenit per
 ea quæ utrunque educunt,
 qualia in curatione tertianæ

18. *Latifolium, seu
 vulgare. illud enim Pon-
 ticum veterum est, & il-
 lo quod vulgo Romanum
 dicitur, & pro Pontico
 habetur, magis roborat,
 & melius ad illos affe-
 ctus qui non aperiens,
 detergensque, sed simul
 roborans auxilium re-
 quirunt.*

E

non exquisitæ ostensa sunt. Avic. suadet etiam quandoque Vomitorium exhiberi ex aq. raphanidis cum syr. acetoso.

Victus ratio non debet esse nimium refrigerans, sed temperata. cum cibis coqui possunt hyssopū, origanum, petroselinum, vel similes herbæ & radices quæ incidendi & aperiendi vim habeāt. laudatur & ptisanæ usus cum pipere. A vino abstinere convenit, aut eo parcè ac modicè utendum ne caput feriat.

19. Quia sæpe lethargus, aut vigilie superveniunt, in utroque autem casu vinum malum est. quod humorum ad cerebrum metastasin augeat, illiusque vires expultrices debilitet.

20. Quod Melinum Gal. vocat.

21. Proprie quando materia phlegmatica est magis vincens. Addit autem Avic. dimidiam croci partem. Crocum autem forsā satius fuerit omittere quod caput feriat.

Providendum quoque est ventriculo unctionibus ex ol. mastichino, nardino, & cytoniorum. Iocinoris curā quoque non negligenda, cui, si vehementius calet, Epithematis succurri poterit, ut in febre ardēte. Avic. pil. quoque præscribit & laudat ex aloë, mastiche, myrobalanis cytrinis, rhabarb. succo hepatorij, succo absinthij, & rosis rubris, singulorum æqualibus portionibus. quæ exhiberi possunt.

sunt cum decocto, vel aq. vel syr. alicujus refrigerantis, velut cichorij, vel endiviae²²; ut contemperetur calor pil. quæ calidæ sunt, sed alioqui jocinori & ventriculo utiles. Et talis est curatio Semitertianarum per se incipientium.

Quæ verò alijs morbis superveniunt curari debent pro ratione morborū quibus succedunt.

De morbis publice grassantibus.

CAP. 17.

Publicè grassantes sunt ex genere eorum qui Græcis Pandemij, seu communes dicuntur. Duplices autē hi sunt; quidam enim sunt Endemij; alijs Epidemij. Endemij dicuntur qui in aliqua regione frequentes & consueti sunt; & omnes ferè ex æquo corripiunt, causamque habent communem. Epidemij ve-

erirati, insuper & mulieres correptæ fuere. Pausan. in Corinth. aliquando omnes prægnantes abortisse refert.

22. Aut acetoso, inquit Avic. qui pil. has ad. 3 ij. exhibebat, non in hac tantum febre, sed & in alijs, inq; omnibus morbis chronicis in quibus viscera læduntur.

1. Qui semper in aliqua Regione sunt, ut Scorbutus in Hollandia, Frisia; Dracunculus in Guinea.

2. Epidemiam suo tempore fuisse podagram narrat Pithermus apud Athenæū. 2. dipnosoph. quum viginti annis morra ad maturitatem pervenire non potuissent, qua non solum viri, sed & pueri, puellæque, atq;

3. Talis fuit & Sudor Anglicus. qui anno 1529. Amsterdamum primum attigit. infecti verò fuere à die Ioris ad Dominicum, duo hominum millia; consistentis plurimum ætatis. minores, ac valde senes vix attigit. Pauci moriebantur. postquam scilicet remedia à vicinis civitatibus communicata fuissent. prius enim ut violenter sudorem exprimerent, multitudine stragulorum, vel charissimos sibi, veluti suffocabant.

4. Nimietatem frigoris, aut caloris, vel humoris, vel siccitatis pestilentias gignere Philosophi, & illustres Medici tradiderunt. Ammian. l. 19.

rò sunt quidem multis simul obvenientes, sed non familiares ac frequentes, sed præter consuetudinem supervenientes. Differunt autem ab his duobus qui Sporades vocantur. genere hi diversi sunt, nec omnes simul invadunt, sed modo unum hic, alias alterum alius morbus corripit. Epidemij autem sive populares morbi duplices sunt. quandoque enim non pestilentes, sed mitiores existunt ut sunt febres acutæ, dysenteria, peripneumonia, & alij similes, quos contingit nonnunquam populariter grassari. aliquando verò Epidemij Pestilentes, ac exitiales sunt, ut qui cum bubonibus, carbunculis, aut nigris maculis invadunt.

Causa autem Epidemiorum communis quoque aliqua est, veluti Aer + quem omnes, qui se in aliqua qualitatibus modum excesserit,

præ-

præsertim in calore ac siccitate morbos parit, non tamen pestilentes. quod si verò idem corruptus & inquinamentis quibusdam infectus fuerit humanæ naturæ repugnantibus, pestilentiales ac exitiales inducit. Corruptitur autem Aer vel à causis Superioribus, vel ab Inferioribus. A superioribus inficitur, si aliqua aeris intemperies perniciofa, diutinè constiterit; qualis est calida & humida ac austrina cæli constitutio. nam sub hujusmodi constitutione, sive intemperatus, sive non sit. 5. Hinc Phæbus, qui sol est, Pestem veluti tela immittere creditur. Hom. 1. Iliad. Heraclid. Pontic. Ammianus & Tyr. Maxim. serm. 12. Clam. Alex. 1. Strom. Philo mortem aeris, Pestem esse vult, propriam istam, affectionem in animata quævis ad perniciem illor. diffundentis. De Mundo.

6. Præter qualitatum intemperiem. Instrumentalis causa est, qua Seminaria nobis communicat, quæ cum illo inspiramus, sive intemperatus, sive non sit. 7. Quia sæpè inficitur aer ut pestis ad quædam tantum animalia perveniat; & quæ homines percunt sæpè animalia non afficiuntur. sic peste per Apollinem Græcorum exercitui ad Trojam immissa Muli primum & canes, deinde etiam homines moriebantur. 1. Iliad. Miasmata aeris instar veneni, imò venenum sunt. hoc verò aliud alijs animalium generi. At quæ causa quod in veneta quadam peste, & tempore Iacobi. de partib. virgines nubiles potissimè morerentur in illa quæ anno 1548. grassata est, vulgus; in alia anni 1360. quamplurimi nobiles? Vide Plin. l. 7. cap. 50. 8. Quidam recensent & stellarum dispositionem. & medicus ad causam proximam respicit. astrorum dispositionem mutare non potest; aeris &c. potest.

9. Vti in obsidione Amidenæ, quod cadaverum multitudo humanitum officia superaret. Amian. l. 19.

10. Inundationem Tyberis subsecuta est pestis Inquinaria, quæ Pelagium papam, tantamque multitudinem percudit ut ex inestimabili numero vix pauci superessent. Paul. Diac.

11. Vt post magnos terrarum motus, emittente terra aerem pigritia, æternorum ignium, terrarum, aquarum vitio corruptum. Senec. 6. nat. quæst. c. 27.

12. Agens enim non agit nisi in passum prædispositum. Socratem in

nobili illa Atheniensium peste temperamenti probitas ac spirituum vigor à contagio servavit. Ælian. var. hist. l. 13. Anno qui nostram pestem secutus est, 1603. paucissimi agrotabant. an quod ob intemperiem, humorumque vitia morbis aptissimi, peste sublati essent? 13. Sic à corrupti frumenti usu Scorbutus anno 1555. primum vagari cæpit. In obsidione Mittelburgensi quod lini semine famem sustinens, inflati distentique plurimi moriebantur. Hinc illud Hesiodi. ἀμὲς ὅμῃς καὶ ἀμὲς.

Aeris

Aeris verò pestiferi conditio multorum lignorum incendio, præsertim ab ea parte qua venti flant, corrigenda est. veterū enim medicorum experientia compertum, pestilentem aerem igne repurgari. Hippocr. quum ex Africæ locis pestifer [aer] Athenis inveheretur¹⁴, ignes construi fecit, atque ita civitatem à lue pestifera vindicavit. quod & olim Acron philosophus Agrigenti consuluit. Corrigitur verò Aer & odore ac vapore aceti, sed intra parietes citius quam alibi. sic & vestes, stragula, aliaque similia aceti rore conspersa, vel vapore imbuta, à pestis seminarijs repurgantur.

14. Ex lignis quercinis, aut juniperinis qui sunt ignes alijs utiliores sunt. Frequēs explosio aneorum tormentorum Tormentum acensem aerem à seminarijs pestiferis aliquādo expurgavit. Lemn. l. 2. c. 10. Sunt qui incenso pulv. pyrio aerem adibus inclusum ab inquinamento liberent.

[Calore aucto, ut quan-

do sol leonis signum ingreditur, in Syria, Palestina, atque Ægypto, pestis mitigari solet, uti apud nos Hyeme. Ratzevil. in itinere Hierosolym. Prosper Alpin. de med. Ægypt.] Contra etiam imbres vel exigui dissecto concreto spiritu & crassato, sospitatem aliquādo restituunt corporib. firmam, ut refert Ammian. l. 19. Quod etiam anno 1602. in peste qua apud nos 11000. hominum quinque mensium spatium, Iunio, Iulio, Aug. Sept. Octobrique, interiere, contigisse vidimus.

De Peste.

CAP. 18.

1. Quod pessum det, h.

e. funditus evertat. Est

autem malum hoc non

tantum κακῆθές, καὶ

ὀλεθρὸν, sed etiam πο-

λυμορφὲν & quod di-

versa, imo contraria

etiam symptomata in-

rebat. neque enim certi

morbi nomē est, sed qui-

cunque Communis & le-

thalis, Pests dicitur.

Gal. 3. epid. s. 3. aph.

20.

2. Spiritum ac sangui-

nem in ventriculis illius

contentum.

3. Aliquando nec qua-

litatib. intemperatus,

nec substantia corru-

ptus, tamen propter im-

mista Seminaria, non secus ac vinum bonū veneno, mixtum,

perimit.

4. Contagium qui negant communi sensu ca-

rent, qui ad causam superiorem non respicientes officium

deserunt, impietatis atque inhumanitatis, culpam incur-

runt. Est autem id quod contagium infert idem cum prio-

re causa, in porositatib. illarum rerum latens quæ aquam,

ideoque magis aerem admittere possunt. seorsim tamen de

eo fit sermo in recensendis causis, quod priore causa ces-

sante, nihilominus agat.

Pestis: est morbus con-
tagiosus & exitialis cor
& ejus contenta vehementer inficiens, vitalemq; facultatem labefactans.

Origo autem Pestis vel ab aere est: putrido ac corrupto, vel per contagionem contrahitur. Aeris autem corruptela vel Universalis est, ut quando populariter sævit: alias Particularis, quādo videlicet in uno aliquo loco, veluti in aliqua domo, corruptus est, & unam aliquā familiam tantummodo invadit. Contagium autem contrahitur ex conversatione cū infectis,

vel

el ex tractatione eorum
quæ penes laborantem, &
præcipuè morientem fue-
runt, ut sunt vestes laneæ,
ut pellicæ; stragula, lin-
eamina sudore aut excre-
mentis infecta.

Quædam autem Pestis
plurimos è vita tollit, quæ
omnino exitialis, ac maxi-
ma est. altera verò multos
spernit, quæ maligna dici-
tur.

Differt verò pestis à fe-
bribus putridis primò per
efficientē & agentem cau-
sam. putridæ enim febres
gignuntur ex humoribus in-
qualitate, aut quantitate
peccantibus, & putrescen-
tibus. pestis verò non ex

5. Tum enim corruptio
in summo gradu est; &
cause magnitudinem
ostendit mors. Alioquin
etiam qui vivunt, & quæ
ab illis inquinata sunt,
inficiunt. nec instar cor-
poris alicujus morientes
denum deferens in ca-
rum aliquem locum mi-
grat, aut lacte aquare
excipi potest, ut vulgus
sibi persuadet.

6. Hinc Deber apud
Hebr. quibusdam dicta
creditur, quod vasti-
tatem faciat, & loca
veluti deserta reddat,
Imperatore Vespasiano,
duo millia quotidie

interiisse scribit Euseb. Idem sub Commodò factum. quan-
do Camillus hac mortuus est, 10000. uno die morieban-
tur. anno 1348. per totum quasi mundum vix quartam
hominum partem dimisit. Cayri aliquando ad decem dies,
24. horarum spatio. 20000. à peste sublata narrat Rad-
zevil. in itinere Hierosol. 7. Vi illa qua apud nos anno
1602. ad summum centum uno die periere. 8. Gal.
putredinis solummodo excellentia differre putavit. 1. de
diff. febr. c. 5. & 6. Epid. sect. 1. comm. 28. Sed ubi de re
convenit logomachijs indulgendum non est.

E 5

vitio humorum, sed per venenosa quædam seminaria cordi ac ejus contentis communicata provenit.

2. Quod in putridis transmittantur ad cor vapores vitiosi qui cor & contenta ejus supra modum calefacientes, tantū accendunt: In Peste verò si invaluerit & cordis contenta, & ipsius substantia putrescit. neque parva est hæc putrefactio, aut qualis in febribus putridis, sed vehemēs, maligna, & penitissimè ad cordis contenta & substantiā ejus pertingens. Communicantur autem pestis seminaria cordi 1. modo [per Transpirationem] per poros scilicet, & exiles venas, & arterias, à quibus ad majores penetrant, & ab his ad cor. alio modo per attractionē quæ fit per inspirationem. tunc enim simul cum aere pestis seminaria ingrediuntur, quæ introducta non eadem facilitate regrediuntur per expirationem ac per inspirationem ingressa sunt.

unt. Citissimè autem quandoque Pestis seminaria ad nos perveniunt. quando videlicet acutissima & tenuissima sunt. aliquando non sedò festinant ubi minùs acuta, aut acuta existunt.

Pesti autem gravissima quæque superveniunt initio quidem 10 somnolentia, & mentis quidam stupor. post paucos dies capitis dolores, vigiliæ; & ubi morbus invaluerit, etiam deliria & linguæ asperitas. accedunt febris lenta cum extremarum partium frigiditate; inquietudo, crebræ 11 vomitiones, & respirandi difficultas. quod si verò una cū his in collo, sub axillis, aut in inguinibus tumores sentiantur, aut aliqua corporis parte 12 Carbunculus excitetur, vel maculæ nigricantes appareant pestem esse morbum dubitari non potest. Urinæ in peste non constant, quandoque sanorum

profundè satis scarificabantur; vix minima phlegmone, tumoreve in locis vicinis conspicuo.

9. *Cicuta in vino pota irremediabilis existimatur. Plin. l. 25. c. 13. tenuitate namq; vini ad cor virib. irre fractis rapitur. Idem de semicarijs tenuib. & maximè activis evenit.*

10. *Quod venenum cor obsidens Animalium spirituum alacritatem infringat. Isti anno 1652. omnes quasi moriebantur.*

11. *Talium qualia in corporib. reperiuntur. neque enim semper biliosa vomitu rejici, compertum est.*

12. *Carbunculus incipit à vesicula quasi à combustionem, quæ post concidens crustam nigram, velut à cauterio, relinquit. unde & nomen habet. In peste anno 1602. carbunculos ex cinereo albicantes frequenter vidimus, qui sine sensu*

similes, aliquando albidæ, vel perturbatæ veluti jumentorum. Ex Pulsu etiam nihil certi habetur. Alvi excrementa crebrò fœtida sunt, subinde liquida.

Præservatio.

Præservatio fit, aere corrupto in meliore commutato, ut dictum est. Id si fieri nequeat, optimum est consilium, aerem¹³ & locum citò¹⁴ mutare, & ad salubriorem secedere. Corporis verò etiā cura¹⁵ habenda est, quod ab omnibus excrementis & superfluis humoribus, & viscerū obstructionibus vacuum ac liberum esse expedit. Sanguinis detractio consueta; si prætermissa fuerit, repe-

13. Commodus Imperator suasu medicorum Lauretum, quod frigida illa regio, & lauri nemoribus, obsita, secessit. Sic Bacchus quum in Indos duceret exercitum peste correptū ex campestribus, ad montes migrare voluit, atque illic frigidorum ventorum flatu, purissimorumque fontium

usu, vicinæque recreatum, convaluisse. Diodor. Sicul. l. 2. refert. 14. Hinc illud; Mox, Longe, Tardè; vel ut alij; Cito. procul, tardè, cede, recede, redi. Recedere, & non finita peste rediisse periculosius, quam mansisse vidimus. Barbariæ incolæ siquando Pestis ingruat regionem illam deserunt. Ioh. Leo. 15. Nam utut ex vitiosis humoribus pestem fieri non putemus; tamen aliunde gravatum cor, seminarijs pestiferis facilius inficitur.

tatur.

tatur. Humores si qui fuerint vel redundantes, vel

vitiosi, levibus medicamentis ¹⁶, quæ resiccandi vim

habent, expurgentur; ut est rhabarb. vel aloë lota in

succo rosarum; vel medicamentū Ruffi quod constat

ex aloë, myrrha, & ammoniaco. ex quo pil.

confectæ, & scrupul. duorum pondere plus minus

sumptæ, excrementa alvi expurgant. Veteres in exi-

gua quantitate ¹⁷ dandum hoc medicamentum con-

sulunt, verum non expurgandi, sed præservandi tan-

tum modo gratia.

Victus autem ratio moderata, & absque omni excessu [sit] ex optimis cibis ¹⁸,

ac probo potu corruptioni non obnoxijis. aceti in om-

niacum recipit pluscu-

lum spei se ponere. roborare enim partem; quod syr. rosatus

solut. nequaquam, & minus adhuc manna, aut cassia faciant.

robore verò principalium viscerum hic omnino opus esse.

¹⁹. Fabæ Ægyptiacæ magnitudine. h. e. g. v. sex semiobuli. ²⁰. Horapollo columbis vefcentes Peste nequaquam corripit dicit. ideoque Regi tali tempore nullum

alium quasi cibum apponi solere. In Hieroglyph.

¹⁶. Iis qui in pestilentia integri sunt, movenda

non est alvus, atq; etiam si per se mota est, com-

primenda est, abstinendū potius si plenius corpus est.

Cels. l. i. c. ult. Sed ille de validioribus,

qualia veterib. solummodo nota erant, loquitur.

¹⁷. Quo calor aloës temperatur. Haud dubie

singulare remedium est, quo Dodon. se frequen-

ter uti solere, narrabat.

¹⁸. Loco ammoniaci Officinæ male substituunt

crocum. hujus experientiam se habere dicebat

Dodon. quod nihil proficeret. in eo quod am-

niacum recipit pluscu-

lum spei se ponere. roborare enim partem; quod syr. rosatus

solut. nequaquam, & minus adhuc manna, aut cassia faciant.

robore verò principalium viscerum hic omnino opus esse.

¹⁹. Fabæ Ægyptiacæ magnitudine. h. e. g. v. sex semiobuli. ²⁰. Horapollo columbis vefcentes Peste nequaquam corripit dicit. ideoque Regi tali tempore nullum

alium quasi cibum apponi solere. In Hieroglyph.

21. Per nimium enim somnum seminata magis introducuntur.

22. Quæ apud Aetium mysterium appellatur.

& Tetrapharmacum ex Philagrio, serm. 12. c.

47. Si addatur ebur Diapente appellabatur à mulomedicis. Veget.

1. Veterinaria. c. 10.

Ejus experimentis indubitata vires; & sine hac mulomedicus mutilus est. c. 16.

Pro bubus loco eboris indebant betonicam. l. 3. c. 2.

Venetijs aliquando Diatesfar. Bolū Arm. veram, dyctamnum album, scordium,

carlinam, & zedoar. addunt. Bolū vix qui mangonio caret, reperias.

Dyctamno albo, cur verum Creticum non præferamus haud video.

ni cibo utilis usus est, & aliorum quæ refrigerant ac resiccant, ut sunt aciditatem habentia, veluti citria mala, aut aurantia mala acida, limones, vinum omphacites, quod Omphaciū appellant.

Exercitiū corporis non est negligendum. In Somnō mediocritas servanda. Metus omnino propulsandus. per hunc enim, quum cor angitur, à seminarijs pestis inficitur facillimè.

Laudantur verò ad præservationem à peste utilia quædam remedia. Gal. bolum Armenam commendat, & theriacam Andromachi, quâ Antoninū usum refert. antidotus Mithridatia utilis quoque est. tum & diatesfaron, facile parabile medicamentum. Elect. liberans à recentiorib. cōmendatur. Nos & aliam composuit. invenimus magis diaphoreticam, quæ circa cor hærentia foras, & ad exteriora pellit, atque ea de causa non modo ad præservatio-

vationem, verum etiam ad
 curationem, si tempestivè
 exhibeatur, plurimum fa-
 cit, Accipit hæc rad. tor-
 mentillæ, rad. carlinæ, rad.
 angelicæ, zedoariæ, ana-
 3 β. 3 scordij. 3 iij. baccar. 23. *Quidam crudas car-*
 lauri, baccarum juniper. *nes scordio contextas*
 ana 3 ij. β. cinnamomi, ma- *corrumpi negant.*
 cis, croci, sem. acetosæ,
 ana 3 j. ex quib. fit pulvis,
 cui per minimas guttas in-
 stillandum aliquid aceti, at-
 que sic ad usum conservan-
 dus. Ex hoc pulv. tabellæ ex
 sacch. formari possunt cum
 aq. tormentillæ, aut cardui
 benedicti, quarum in sani-
 tate ad præservationem sit
 usus. pulvis ad curationem
 adhibendus ut dicetur. Ad
 præservationem convenit
 & odor optimi aceti²⁴; quo
 pongia imbui potest. quod
 si illud acrius fuerit, poterit
 lilui aq. rosaceâ. Feruntur
 & prodesse gestati nonnulli
 lapides pretiosi, ut sunt ru-
 binus, saphyrus, & hyacin-
 thus²⁵.
 Puerorum verò & magna
 ratio tempore pestilenti ha-

24. *Pilæ ex ambra simi-*
libusque quæ aromatica
& suavia sunt, spiritus
evocant. unde facilius
inficiuntur.

25. *Expertum se de*
hyacintho testatur
Dod.

26. Non usti (nā quamvis siccet, vim tamen quam à tota substantia habet, amisit) sed solummodo lima rasi.

27. Ut simul expellantur. nam alioquin in visceribus putrescerēt. Possumus & fol. sene ejus loco in pauperib. dari, sed rhabarb. melius est.

28. Quo celerius ejusmodi tempestates corripunt, eo maturius, auxilia etiam cum quadā temeritate rapienda sunt. Cels. l. 3. c. 7. Occasio enim præcepta. Itaque hic locum habet illud; Μηδὲν ἀνὰ βῆλα ποιεῖν. cunctari, est egrum quasi occidere.

benda est. nam quum calidi ac humidi sint, ac non raro vermes in corpore habeant facilius reliquis peste corripiantur. Expedi itaq; illis exhiberi quædam quæ vermes expellere queant, ut semen sementinæ cui addi convenit aliquot cornu cervi²⁶ ramenta, & nonnihil²⁷ rhabarbari, & quandoque quæ caliditatem seminis contemperent, ut est semen acetosæ. ex quibus pulvis exhibendus est cum aq. portulacæ, aut cardui benedicti. potest verò & ipsis nonnihil theriaces exhiberi; tum verò & alia contra vermes utilia, quæ suo loco ostenduntur.

Curatio Pestis.

Curatio pestis in tribus potissimum consistit. 1. In expellendis seminarijs à corde ad ambitum corporis. 2. In Localibus remedijs. 3. In Accidentium curatione²⁸.

Expelluntur autem pestis semi-

eminariorum per medicamen-
 ta diaphoretica, sudorem
 noventia²⁹, veluti quæ fiunt
 cum aq. tormentillæ, vel car-
 du benedicti, additâ the-
 riaca, vel aliquo alio sudo-
 rem movente, ut est Com-
 positio nostra; cui adjicitur
 & aceti³⁰ aliquid, vel syr.
 acetosus, vel de limonibus.
 Sumpta hujuscemodi po-
 tione æger collocandus est
 ante ignem; vel si mavult
 decumbere, diligenter con-
 tegendus est, ut sudet³¹, cu-
 stodia adhibita ne dor-
 miat, aut potionem evo-
 mat. si evomuerit, repeten-
 da³² est. Post sudorem, si
 tumores sese remiserint, si-
 milis potio, sed³³ dilutior

29. Ignea medicamen-
 ta requirit Cardan. non
 tamen noxia, ut est hy-
 drarg. sublimatum, quo
 nonnullos curatos, plu-
 res tamen enecatos scri-
 bit 2. de subtil. Eu-
 phorb. multis usitatum,
 ejusdem generis esse pu-
 to. Sunt qui salempetræ
 purificatum; aut etiam
 pulv. pyrium exhibeant.
 At Theriaca innoxius
 veluti purgatorius qui-
 dam ignis est. In libr. ad
 Pison. hanc plus omnib.
 alijs medicamentis anno
 1602. præstitisse com-
 perimus. nã aut curavit,
 aut sympt. saltem miti-
 gabat.

30. Flor. calendulæ, aut veronicæ seu tunicis. hydroticum
 est. 31. Quib. vires adhuc integræ sunt, præsertim pau-
 perioribus, aliquando præcipitur, ut obambulent. sed dili-
 genter cavendum ne sudor, quum venenatus sit, reperiatur.
 32. Aut alia similium virium propinanda, tum na-
 eadem antidotus, ut crambe, nauseam magis moveat; tum
 ne uni fidamus remedio, sed omnem veluti lapidem movea-
 mus. 33. Syr. superscripti tum copiosius admisceri po-
 tioni debent. ut temperatior existens calorẽ minus incen-
 dat; cujus furẽte adhuc veneno ratio haberi minus potuit.

F

exhibenda est, bis tervè per diem; donec tumores, vel maculæ evanuerint; sed citra sudorem.

Sanguinis missio, appa-
rente Bubone, & maculis,
non potest esse utilis. cor
enim primariò afficitur, &
non à vaporibus putrescen-
tium humorum, sed à vene-
natis pestis seminarijs op-
primitur, à quibus venæ se-
ctione liberari non potest.
interim detractò sanguine
cor etiam debilius reddi-
tur, quod nullo expedit mo-
do. Iam & sanguinis de-
tractio tumores ab ambitu
corporis ad interiora re-
vocat, quod minimè con-
veniens est. laudat verò &
Gal. libr. de Euchym. &
Cacoch. medicos, qui tem-
pore pestis à venæ sectione
abstinuissent³⁴. Carbunculo
autem apparente³⁵, quan-
doq; sanguinis missio non
omnino reprobanda si sta-
tim fiat, & ex vena Caribun-
culo proxima. Purgantia
medicamenta valdè noxia
sunt, & in quacunque pestis
specie

34. Nec nos cuiquam
anno 1602. profuisse pi-
dimus; sed sanguine ad-
huc fluente in quibus-
dam vomitus prorupisse;
mortemque subsecutam;
utut adhibitis omnibus
cautionib. ab ijs præ-
scriptis qui illam com-
mendant sectio facta
fuisse.

35. Carbunculi non
fiunt in emunctorijs. hu-
mores consentiunt; &
longior est morbus. quā
ubi Bubo. nec metuen-
dum ne intro ducantur
seminaria. nam proxi-
mam secamus. atque has
ob causas quandoque
minuimus sanguinem.
Purgandum tamen nul-
lo modo.

specie citissimè mortem³⁶ 36. In illa quàm anno
afferunt. 1602. vidimus noxia

Bubonibus autem admo-
veri ea debent, quæ humo-
res eo decumbentes attra-
hant³⁷ & educant. laudatur
cape, vel liliorum alborum
radix cocta, & adplicata.
sed certissimum remedium
est, cauterium potentiale, &
si quæ similia sint caustica
& urentia.

37. Tum quod humores
eo repant, tum quod lo-
ca illa convenientia sint.
Si ruri sint ægri ranun-
culus, aut ranunculus
qui flammula dicitur,
contusus imponitur.

38. Quum crusta non
amplius serpit certum
est venenum non amplius
augeri.

39. Et vulnus seu ulcus
apertum servant.

40. Maculis vix localia
admoventi possunt, quod
per totum corporis ha-
bitum ac superficiem di-
spersi soleant. Quod si à
Diaphoreticorum usu
non evanescant, malè se-
dit ægro.

Carbunculum³⁸ scarifi-
care utile est, deinde cucur-
bitulam admove; postea
adponere quæ mordicent
³⁹ ut ung. Ægyptiacū. Cau-
teria verò potentialia non
incommodè quoq; admo-
ventur⁴⁰.

Alvus si fuerit liquida, ut
frequenter contingit, pro
potu exhiberi potest deco-
ctum santalorū rubrorum,
aut decoctum cons. veteris
rosarum rubrarū. vel ipsa-
rum rosarum, quod exiguo
cinnamomo condit. pote-
rit. Si verò durior fuerit,
molli leniq; Enemate mol-
lienda.

De febre Puncti-
culari.

CAP. 19.

1. Rubent ob putredinem humorum. non perspicuae sunt ob seminaria pestis.

2. Atque ideo non Pestis est, sed febris Synochus pesti implicata, seu pestilens.

3. Vel à morfu cimicū relictis maculis. aliquādo latiores sunt, ut totum brachium, vel faciem instar Erysipelatis occupent. aliquando instar granorū milij prominent, instar variolarum seu morbillorum puerilium. Colore etiam variant, nam quamvis ut plurimum rubrae sint inveniuntur tamē & citrinae, purpureae, violaceae, lividae & nigrae. anno 1605. & dein Amsterdami frequentissimè conspeximus tales maculas faciem totam vel dimidiam cum tumore palpebrarum, & dolore faucium; vel alias etiam

Puncticularis febris à recentiorib. dicta, Synochis initio similis est. citra frigus, horrorem, aut rigorem invadit; & calor blandus, ac mitis est. Urinae sanorum similes, sed mox rubicundae¹, perturbatae, non perspicuae, vino granatorum persimiles redduntur. nulla aliqua parte tumor², aut carbunculus apparet. nullus vomitus. sentitur corporis lassitudo, & capitis gravitas. maculae non mox primis dieb. sed quarto, aut septimo die, vel serius primum apparere incipiunt in brachijs, dorso, & pectore; colore rubentes³, ijs similes. quae à pulicum morfu ac puncturis relinquuntur, quo tempore & calor intenditur, & febris major fit; accedente quoque vel vigilijs, vel mentis stupore, aut alienatione:

Causa hujus febris seminaria

naria quædam abaëre corrupto, sed non admodum acria, aut valdè tenuia sunt; & simul cum his sanguis computrescēs. idcirco nec celeriter contrahitur hæc febris, & diuturnior est; nec cōtagiosa, nisi per multam ægri tractationē. Corripiuntur hujuscemodi febri præcipue pueri, & juvenes, & qui molliter, ac in otio vivunt; & per cœli quidem constitutionem calidam ac humidam.

Venæ sectio ex communi dextri brachij venâ primo, aut secundo die utiliter fit. apparentibus verò maculis nullo modo convenit. Cucurbitulas interim cū scarificatione tunc brachij aut dorso admove non abs re fuerit, vel hæmorrhoidas provocare.

Purgans⁶ aliquod medicamentum non etiam nisi primis diebus, & priusquā maculæ appareant exhibendum; idq; mite admodum, veluti ex syr. rosato solutivo cum infuso rhæbarbari, aut

partes maculis planis⁷ aut etiam prominentib. invadentes, cum febris satis valida & gravi; ex qua tamē paucissimi, & non nisi 50. annum egressi moriebantur. Vbi-
cunq; maculæ apparuerant Epidermis separabatur. leviorib. purgationibus, Phlebotomia, Hydroticisq; alexipharmacis; ubi maculæ nondum apparerent; solis Sudoriferis & venenum depellentib. ubi illæ jam prorupissent, & quidem brevi curabantur. Contagiosam advertimus, ut Dod. dicit.

4. Propter similitudinem calidi & humidi temperamenti.

5. In peste contra.

6. Propter putredinem humorum opus est purgatione; miti tamē propter pestis seminaria.

7. In ijs qui cutem duram & poros adstrictos habent sunt qui decoctum gnajaci cum aceto exhibeant. Iidem ung. quod hydrarg. habet illinunt, sed hac unguendi ratio ut temeraria meo judicio repudianda est.

8. Ptisanæ cremor est nimis refrigerans. utendum familiari aliquo juscule pulli, aut simili.

9. Tenuiores posca uti possent.

agarici, pro ratione materiæ peccantis. A fortioribus medicamentis abstinendū, ne ingens alvi succedat profluvium. quod periculosum admodū fuerit. Conveniunt etiam lenia & mollia enemata. Apparentibus maculis sudor invitandus est, per ea quæ clementer ipsum provocant, ad quod theriaca utilis est, præsertim si exhibeantur cum decocto scordij, cardui benedicti, aut tormētillæ; addito syr. acetoso, vel de limonibus. Propinantur verò ab initio utiliter potiones ex syr. acetoso, vel de succo citriorum, aut limonū, cum aq. cardui benedicti, cichorij, tormentillæ; vel ipsarum decoctis quibus additum sit nonnihil theriaces.

Viæ ratio sit non omnino refrigerans *. Potus poterit esse decoctum ptisanæ, vel tenuis cerevisia, in quibus incoqui possunt aliquot ficus, deinde addi succus limonum, vel citriorum, vel aceti nonnihil.

Aer

Aer sit temperatus. non nimium refrigeretur¹⁰, si graveolentior per odores & suffitus emendetur.

10. Ne percussio fiat illius quod natura ad superficiem expellit.

De Variolis & Morbillis.

CAP. 20.

AD naturam pestis, veterum nonnullorum, & præsertim Arabum: sententia, accedunt quæ dicuntur Exanthemata & Ecthymata; vulgò Variolæ & Morbilli. frequenter enim populariter grassantur; & sæpè eodem, quo pestis, tempore.

Corripiuntur autem citius pueri: quam alij, quibus etiam facilius solvuntur, quam grandioribus. magna verò ex parte salubres sunt morbi. Fiunt autem ab infectione quadam sanguinis ex menstruo: in utero ma-

stantes, quod anno 1608. in abortu fœtus immaturi, matre morbillis correpta, contigisse, compertum est. 3. Ex cuius portione crassiore Variolæ, ex tenuiore morbilli oriuntur. Quando autem populariter grassantur, aeris corruptio magis minusve contagiosa accedit.

1. Inter quos Raz. libro de Peste. Veteribus Variolas & Morbillos ignotos fuisse qui fieri potest, quum causas illorum statuamus quæ in veteribus etiam fuerunt. Quod autem distincte de illis non egerint fortassis eadem de causa accidit, propter quam & herbas maximè notas, brevissimè, vel nominibus tantum suis, descripserunt.

2. Propter analogiã ut facilius corripiuntur, ita & facilius curantur. Imò quidam in utero materno adhuc exi-

4. Interdum etiam bis, aut ter. sed rarò. quia morbi ex aere contagioso contracti idem corpus rarò bis occupant.

5. Ut neq; cerevisia, neque vinum defecatur sine ebullitione. Febris autè secundum omnium opinionem, Synocha est.

6. Atque ideo neq; pruriunt. quod latè omnes ex pituita sint, quæ acrimoniam non habet. nisi per putredinem illam acquirat. hinc ubi in pus mutari cœpit pruritus magnus percipi solet. Variolas nostrates, de Kinderpocxkens; Morbillos, de Maselen appellant. Fuckf. Iunius, aliq; nominum horum significationem invertunt.

7. Quia humores sunt in renis; atq; in ipsa eava.

terno contracta, quæ quum natura secernit, & quasi per crisin quandam expellit Exanthemata ac Ecchymata proveniunt. & hac de causa omnibus in vita accidunt, & quidem + semel tantum; aut apta sunt ut accidant nisi præcox mors hominem prius è vita tollat. Non fit autem hujuscemodi secretio & expulsio citra sanguinis fervorem ac ebullitionem. atque idcirco cum febre erumpunt.

Exanthemata seu Variolæ pustulæ sunt latæ⁶, albidæ, quæ suppurantur, & crustas relinquunt. Ex crassiore sanguinis, & pituitosiore portione hæ proveniunt. Ecchymata verò, sive Morbilli tumores sunt, non tamen alti, qui non suppurantur. Horum generatio ex tenuiore sanguinis portione, & magis biliosa provenit.

Præcedit Exanthemata Febris lenta citra rigorem, gravitas in somno, capitis & dorfi dolor, & quandoque

doque & raucedo quædam. Præcedunt eadē & Ecchymata, & cum his quandoq; sanguinis, è naribus fluor. Apparentibus hujuscemodi signis non temere suspicari licet vel Exanthemata, vel Ecchymata citò apparitura; præsertim si patiens his ante non laboraverit, & cum infectis versatus sit, & multi laborent.

Sanguinis missio apparentibus Exanthematis aut Ecchymatis nulla ratione admitti debet: sed prius facta prodest. nam detracta impuri sanguinis portione quod reliquū facilius à natura superatur, atq; expellitur. Simile est in Medicam. purgantibus. Contineri autem laborantes loco calido debent, & diligenter contegi. nulla frigida interiorius, aut exterius applicari possunt. Decoctum ficum aridarum, uvarū passarum, & sem. anisi, aut fœniculi utiliter bibitur. Et in sorbitionib. ficus aridæ incoquantur. Quando verò

8. *Ab humoribus, versus pulmones destillantibus.*
9. *Exanthemata præcedere hæmorrhagiam rarissimū. crassiores enim humores sursum vix feruntur. Aliquando autē tā profusa est, ut copia sua terreat; quod potissimū in Sanguineis fieri solet, quæadmodū & mihi in puerita contigit.*

10. *Nam quæ natura ad superficiem expellit ad centrum, h. e. ab ignobiliorib. partibus ad nobiliores, viscera scilicet revocanda non sunt. sed quo illa vergit eo ducere oportet.*

11. *Opinio est rubra stragula similitudine coloris ad evocationem prodesse, quam sequitur Fracastor. At color obiectum visivi tantum spiritus existens, alios spiritus, humoresq; qui poterit movere?*

12. *Potest ad evocationem dari Theriaca in aqua carduibened. soluta.*

13. *Prout adstrictione, ad nascendas, veluti in initio, solâ, vel etiam de-
tersione, ad jam natas, ut morbo procedente, opuserit.*

14. *Aut folijs succisæ, hordeo integro, & glycyrriza. in quorum decocto dissolvendum mel rosaceû, & diamorum. Atque hoc gargarismate frequenter os colluendum.*

Variolæ erumpunt Oculorum, Oris, & Gutturis cura habenda est. Præservantur Oculi aq. rosac. aut lacte muliebri in quibus dissolutus crocus. quo oculi & palpebræ illiniri debent. Ori providebitur si quandoq; nonnihil diamori solum¹³, vel cum melle rosaceo in ore contineatur. Quod si verò in Guttore Variolæ jam eruperint Gargarismos adhibere convenit partim adstringentes, partim abstergentes, ut ex folijs, aut summitatibus rubi, folijs ligustri, aut corticibus granatorum¹⁴.

De Febrib. cum animi deliquio ingruentibus.

CAP. 21.

SYMPTOMATA.

1. *Febriû. De hac ut & de omnib. febrib. diligentiss. scripsit Michaël Savonarola.*

A Nimi deliquia vel cū febre, vel absque febre fiunt. quæ cum febre¹, quando cū oris ventriculi insigni debilitate ac offensa, pravi in corpore redūdāt humores, proveniunt, qui aliquando crassi, crudi ac fri-

frigidi sunt, quandoque vero
tenuēs & biliosi. Recen-
tiores ex frigidis humorib.
natam febrem nuncupant
syncopalem humoralē; al-
teram verò syncopalem mi-
nutam. Crudorū humorum
copiam ostendunt præcor-
dia tumida ac inflata, cum
& ipsius corporis tumor &
color albidus vel pallidus,
veluti eorū qui aqua inter-
cute laborant. Tenuium
verò ac biliosorum redun-
dantiam testantur corpo-
ris habitus squalidus ac ex-
tenuatus, rosiones circa os
ventriculi, & oris amaritu-
do, & quandoque vomitus
biliosi. Animi autem deli-
quium in accessionum ini-
tijs maximè supervenit, &
quandocunque æger ali quo
movetur modo. periculo-
sus idcirco morbus cujus
curatio perquam difficilis.

In nulla autem harum fe-
briū sanguis mitti potest.
Gal. multis frictionibus uti-
tur. quæ quomodo & qua-
liter faciendæ Paulus ex
Gal. habet.

2. *Leucophlegmatia.*

3. *Tunc enim pulsus de-
bilissimus vitalem facul-
tatem gravari testatur.*

4. *Axioma Gal. quod in
omnib. febrib. ex putri-
dis humorib. sanguis
mittendus hic locū non
habet. vires collapsæ
obstant.*

*Curatio ejus quod à
frigidis.*

5. *Ut possint citius concoqui humores & percutim evacuentur. quæ ratione austerum arcendum est.*

Consistit autem hujus morbi curatio, partim in victus ratione, partim in alijs remedijs. Victus ratio requiritur facilis, aperiens, & attenuas; talis qualis in quotidianis, ex quarum Genere hæc quoque est. Dandus est cibus in exigua quantitate, propter humorum copiam; & frequenter, propter virium debilitatem. laudatur pro potu primis diebus aqua mulsa in qua decocta sit hyssopus aut thymus. Concedendum, verò & vinum est, album, clarum, non astringens aut austerum. In quiete continendus est æger. Tempore accessionis nullo modo somnus admitti debet. alio tempore permittendus. Laudantur verò & à recentiorib. frictions matutino tempore & mox à somno factæ. humores verò præparandi ac concoquendi veluti in quotidiana. Purgantia med.
Gal.

Gal. dare veretur. recentiores tū leviorib. med. utuntur. Exhibenda autem talia sunt quæ ventriculum non offendunt & humores purgatim & per vices expurgent ut sunt hiera picra & billulæ, Alephanginæ dictæ, quib. agarici correcti aliquid addi potest. Si purgantia med. dari nequeant & alvus nō respondeat enenata injicienda erunt, aut glandes supponendæ. Humorib. magna ex parte expurgatis ventriculi ostio providendum est, per unctiones aut empl. ut in quotidiana.

Ingruente autem animi deliquio aromatum odoreeger reficiendus est. Gal. anem exhibet vino diluto intinctum. Recentiores erò etiam in vino aromatē madefactum, vel ipsum inum in exigua quantitate propinant, & levibus frictionibus utuntur.

Deliquium ex tenuib. humoribus.

Quando vero ex tenuib.

6. In utraque tum debile est stomachi os. nam & in alijs crassi vel tenues humores abundant nū non sequitur syncope.

7. Quæ fere ad ardentē vel exquisitæ tertianæ naturam accedit.

8. Neque enim magna febris aut accessionis ratio habetur.

9. Nā cibus quamvis nutriat non tam corroborat ventriculum ut hæc.

10. Non quod refrigeret. utile enim, sed quod non satis nutriat.

11. Non quod alant valde quum non sint dulces, sed quod roborant ostiolū ventriculi.

humorib. una cum febrili deliquium accidit tunc citò ac frequēter nutrire³ necesse est, etiam in ipsis accessionibus, ut recentiores scribunt. Aer sit frigidior in quo æger decumbit. stragulis paucis contegatur à frictionib. & sudore abstinendū. cibus sit facilis concoctionis & qui succū crassiorē ingeneret, autore Gal. cui frigida & austera quædam admisceri convenit. Aqua mulsa improbat. ptisanæ cremorē Gal. etiam non¹⁰ probat. sed panem & sorbitionem ex chondro ac¹¹ fructus austeros qui non facile corrumpantur & quandoque ovorum vitellos. Recentiores juscula carniū & succum quoq; earum commendant cum succo granatorum vel cydoniorum, vel uvæ immaturæ, aut simili astringente aliquo. Si verò carnes fuerint musculosæ succū præbebunt crassiorē & amplius nutrientem. pro potu Savonarola laudat decoctum

Potus.

ctum ex paucis hordeo¹² & multo saccharo. Gal. verò etiam vini usum inter initia admisit; modo tenue, aquosum, & non austerum, quod à cibo ait sumendum. In quiete verò æger continendus est. Somnus permittendus est excepto tum accessione tempore. si tempus omni tempus vigiliarum excesserit, bonum. si autem ponte somnus non successerit invitandus erit. In huiusmodi animi deliquio rigidam exhibendam positionem Gal. est sententia. Vinum tamē & omnibus animi deliquio accipit commendat natura candidum, colore flavum, substantia tenue, & ætate ætius. Recentiores in huiusmodi deliquio aqua rosea vel aceto frontē & faciem aspergunt & madefaciunt.

Reliquæ autem occasiones quibus citra febrem animi deliquia succedunt sunt color vehemens, vigilia nocturna, immodica ventris

12. Quoniam frigidum est; saccharum verò nutrit.

13. Traducit enim crudos humores si ante sumatur, si post, concoctum jam deducit. Disputantibus quibusdā num post cucumēs peponesve vinum calidum Hispaniense bibendum obtinuit non esse bonum, sed piper addi prodesse.

14. Non aquā sed quod exhibetur sive vinum, sive aliud, vult frigidum dari. nam mox vinum commendat.

15. Qui actu syncopen patiuntur ejus loco sumunt hippocraticum dictum. continuè si vinum utatur, sit tenue, aquosum, austerum.

tris inanitio, nimius corporis motus, & principiorum intemperies. Quomodo autē istis occasionibus sit occurrendum deinceps ostendetur.

De Dolore.

CAP. 22.

1. Quæ tamen ad priores, tensionem nempe rumpentē, aliumve modum solute unitatis, non incommode reducitur.

Affectus qui dolorem excitant 2. auctore Gal. sunt; vel enim unitatis solutio, vel intemperies, siue alteratio, quib. accedere potest magna obstructio. Continui autem divisio 3. modis (vulneratione excepta) aut enim ruptione, vel contusione, vel erosione. Ruptio fit ex distentione, Contusio à re quapiam gravante, Erosio autem mordente qualitate. Distentio autem fit vel à multitudine humorum, vel à spiritu cui non patet exitus, vel ab immodica siccitate. Contusio à re quapiam gravi aut dura. Erosio ab eo cui morsus natura inest. Alteratio verò dolorem inferens per ea fit quæ

quæ violenter calfaciunt
aut refrigerant. Magna ob-
structio ex duris meatum
aliquem occupantibus fit.
veluti quum arenulæ urete-
ras obstruunt.

Quum gitor dolor vehe-
mens urget perquirendū &
cognoscendum est an hunc
excitet humor plurimus, an
spiritus cui non sit exitus, an
verò gravis moles, an acris
humor, an siccus affectus;
vel aliud sit quod vehemen-
ter calfaciat aut refrigeret.
Ex hisce causis variæ gignuntur dolorū species qui-
bus & sua sunt nomina quæ
a Paulo referuntur.

Si itaque humores pluri-
mi dolorem excitarint san-
guinis detractione, vel pur-
gatione, vel utrisq; vacuan-
dum. Si spiritus cui non est
exitus, discutientibus atque
attenuantib. remedijs uten-
dum: aut quod potius, lo-
co dolenti cucurbita cum
flamma copiosa subinde
affigenda. Si moles aliqua
gravando dolorem efficit
moles adimenda erit. Hi

2. Nam quandoque dis-
cutientia dum pituito-
sum humorem calfa-
ciunt flatu augent.

G

acris humor dolorē affert
cujusmodi est biliosus &
potissimū æruginosus in ore
ventriculi collocatus vomitu
expellendus est. aut per
sedem enema injiciendum
quod eum eluere queat.
Quod si verò à siccitate
dolor contractus fuerit hu-
meſtare oportet, quod sæ-
penumero perdifficile aut
impossibile præsertim si
occasione febris, vel inani-
tionis sit siccitas. Si autem à
vehementi caliditate aut
frigidityte dolor superveniat
contrarijs occurrendū
est. Quod si verò idoneis
remedijs quæ affectum ſanare
queunt dolores non
ſedentur. & vires dejiciantur
ægerque ad mortis discrimē
tendat ad ea confugiendum
med. quæ ex opio & hyoscyamo
ac ejusmodi narcoticis componuntur.
etiā si corporis habitus
nonnihil sit lædendus. læſio
enim potius quam mors
optanda ut Gal. ait. læſio
enim si non fuerit magna,
temporis ſpatio emendari
poterit.

poterit. quod si verò etiam major, tamē præferenda est morti. In exhibendis autem narcoticis sequendum sapientis cōsiliū. Ne quid nimis. Nam nimius narcoticorum usus quandoque etiam mortem adfert. Narcoticorum sive opiatorum multæ quidē veterum compositiones, sed omnib. Philonis antidotum Gal. præfert. quod ad dolores sedandos nulli est inferius, ejus usus post annum à compositione tutus est, & si duorum 3. aut 4. annorum fuerit multo erit melius.

3. *Requies, qua nonnulli frequēter utuntur, quod paucissima habeat calida, æquē tutum medicamentum non est.*

De Vigilijs.

CAP. 23.

INter occasiones ad quas animi deliquium succedit secundo loco à Gal. Vigiliæ recensentur. hæ non mox & statim, sed diuturnitate temporis deliquium animi inferunt, corpore videlicet extenuato & squallido factō. Comitantur vigiliæ febres & præcipuè

G 2

ardentes. sunt verò & aliorum affectuum symptomata: ut Phrenitidis, mania, melancholiæ & magnorum dolorum.

Tolluntur autem vigiliæ partim molli frictione, partim balneo, partim leni corporis agitatione, ut Gal. ait lib. 3. de sanit. tuenda. mollem autem frictionem Gal. cum oleo suadet faciendam. sed nostra ætate absq; oleo subinde placidè ac leniter brachia & crura deorsum fricando, somnis accersitur.

Paulus loco frictionis brachia & crura vincire præcipit, ac deinde solvi, quod nec modo fieri consuevit. Balneo verò nō rarò feliciter uti contingit ex decocto malvæ, violariæ, lactucæ & quandoque foliorū papaveris in quo pedes abluendi sunt & manus. Agitatio levis corporis ad somnū quoq; conducit veluti lectica aut exigua cymba vehi. Non perficientibus autem istis aut quando fieri com-

commodum non est, ad
epithemata, & inunctio-
nes temporum, & frontis
veniendum erit, ex aquis
rosarum, violarū, & quan-
doq; papaveris. addito fre-
quenter lacte muliebri; aut
earundem herbarū deco-
ctis quæ admovenda ubi
accessio remiserit. Offe-
runtur verò & narib. quæ
somnia odore provocant;
ut papaveris vel hyoscyami
flores & folia, mandrago-
ræ poma, & pilæ quædam
aut noduli ex corticibus
capitum papaveris, cortici-
bus rad. mandragoræ, flo-
rib. nymphææ, violariæ, se-
mine lactucæ & hyoscyami
cum opio; modico croci &
seminis anethi additis. Sor-
bitionibus verò veluti cre-
mori ptisanæ cōvenit sem.
melonum à cortice repur-
gatum addi, aut papaveris
codia ipsis incoqui. Exhi-
beri verò & somni tempo-
re diacodiū potest vel ejus
loco syr. de papavere, qui
somnia provocat cochlearis
mensura sumptus. aut aliud

4. Quæ grati odoris esse,
etiam Sacræ literæ, te-
stantur.

medicamentum exhibendum opium habens qualia exhiberi quandoq; ut Gal. ait cōvenit. ut sunt ex hyocyamo catapotia vel ex styrace quæ à Paulo describuntur, lib. 3. c. 28. in quorum loco recentiores substituerunt pillulas de cynoglossa dictas, Græcorum tum compositionibus multo inferiores.

De Syntexi.

CAP. 24.

INter occasiones animi deliquium afferentes 3. loco à Gal. refertur ventris inanitio. hujus autem multæ sunt species ut diarrhæa, lienteria, dysenteria, cholera quarum curationes seorsim scriptæ sunt. Accedit his & alia quæ syntexis sive colliquatio dicitur. dejicit hæc vires vehementer & perseverans mortem adducit. præter has verò & alia est ventris inanitio à med. purgante facta quæ subitaneum animi deliquium sæpe

sæpe affert. Occurri huic potest iisdē remedijs quib. diarrhæa sanatur. sed his omnib. longe præstat the-riacè Andromachi quæ ʒj. aut ʒß. pondere cum vino exhibita mox & valde celeriter fluxum à medicamento excitatum sistit.

Syntexis autem fluxus est ventris per quē corpus omnino colliquescit & extenuatur, alvi excrementa non cibi aut potus speciem præferunt, sed flava ac biliosa apparent & supra modum graveolētia sunt. consistētia verò non omnino liquida, sed crassiora veluti lentorem quendam habentia, quib. & subinde pinguedo quædā innatat. qualis & in urinæ superficie tunc quoque observatur. Syntexis autem accidens est febrium acutarum ac continuarum, præsertim longarum. Curatio ejus per refrigerantia & astringentia instituenda est. fructus réfrigerantes & austeri utiles sunt ut mala punica acida, fructus cor-

1. Gal. hanc ejus probam dicit ac nos experti sumus, statim stitisse fluxum. idque ratione resistendi venena nam med. venenata sunt. Ad-
dit Paulus lib. 7. cap. 7. aliam causam. Nam, dicit, a d cutem deducit, humorumque ad ventriculum impetum revellit.

2. *Astringunt etiam quæ
vulgo reenbesyen, &
quæ Brabanti craakebe-
syen, Germani heeydel-
beeren appellant.*

3. *Multi putant non re-
tinere alvum ob oleum
quod habet. verum tam
exiguum est ut se non
exerat. at substantia
astringunt.*

4. *Resolvi in poculo
uno 2. 3 possunt.*

ni, uvæ immaturæ, acini ri-
besij rubentis & oxyacan-
thæ acini vulgo berberis.
ex quib. syr. vel quæ Arabes
Rob. nominant confecta
conveniunt & quæcunque
his similia. Ab omni jure
carnium abstinendum est.
forbitionib. veluti ptisanæ
cremori, æqualis portio
amygdalarū dulcium ad-
denda est. ipse vero chylus
amygdalarū dulcium vul-
gò lac nominant, etiā con-
venit, præsertim refrige-
rante aliquo addito. Ptisanæ
decocto incoqui poterit
aliquid conservæ rosarum
veteris, vel fructus aliqui
astringentes. Paulus in ar-
dente febris cum syntexi fri-
gidæ potionem ait utilem
ex frigido fonte petitem.
dari autem hæc non debet
nisi observatis conditioni-
bus prius in curatione sy-
nochi & ardentis febris,
enumeratis.

Ventriculum verò & in-
feriorem ventrem oleo cy-
doneorum & rosaceo vel
utrisque inungi expediens
quo-

quoque est.

Ex occasionib. autē quæ animi deliquium afferunt, reliquæ sunt nimius corporis motus & principiorum intemperies. Motus autem corporis veluti eorum qui insaniunt somni provocatione sedandus. qui quomodo provocandus sit ante dictū est. Intemperies vero principiorum quomodo corrigenda suis locis occurret dicendum.

De Cataphora.

CAP. 25.

Gravem somnum qui febrib. supervenit κατὰ φεγὰν græci vocant, vel alijs placet magnā dormiendi cupiditatem. A frigidiore ac humidiorē cerebri imbuente materia accedit. Oxycrato tepido, id est aceto cum aqua mixto, frontē abstergendam Paulus ait, & naribus quæ incitiam vim habent admodum. tale autē est acerrimum acētū, faciendæ etiam

1. Coma duplex vigilans quod alias catochus dicitur. somniferum est κατὰ φεγὰν quæ somnum quod pejus est, vel ejus desiderium quod non ita malum infert, neque enim tam multa fuerit materia eadem tamen curatio.

2. Adeo ut si non admodum magna fuerit copia opij sumpta, eos qui id sumpserunt excitare possit.

G 5

3. Non scapulis ut Paulus, quod aliquā possint materiā sursum trahere. ideo femorib. applicantur.

4. Quod accessionis symptomata ea non sublata tolli nequeant. eam tolli impossibile est, tum afflicto accessione danda non est afflictio. & in statu quiescendum: ait Hipp. quod & de particulari statu intelligendum.

sunt diversiones ut crurum duræ fortesq; frictiones ac validæ ligationes. Cucurbitulæ quoq; affigendæ sunt partib. femorum interioribus ut Rondeletius scribit & quidē non prius quam in remissione febris + ut Paulus ait. Hisce remedijs si vigil æger reddi nequeat sternutamenta offerenda. deinde ubi febris accessio cessaverit ad generalia remedia vel sanguinis missionem vel purgationem veniendum.

De capitis dolore in febribus.

C A P. 26.

Capitis dolor qui in febribus ardentibus aut synochis supervenit ex vaporibus aut fumis ut plurimum qui sensim sursum effeferuntur & cerebrum petunt provenit. adeo magnus hic quandoque est ut delirium afferat. Curatur autem partim repellentib. partim revellentib. Inter repellentia laudatur autē veterib.

erib. oxyrhodinon ex oleo
 ofaceo & aceto compo-
 am, quod quomodo capiti
 dhibendum Paulus osten-
 it. nostra ætas in arden-
 b. ac synochis febribus
 qua & aceto rosaceis oxy-
 rhodini loco utitur, addito
 ubinde lacte muliebri & 1. *Densari tum humo-*
 vi albo. verū hujuscemo- *res, indeque destilla-*
 li capiti adhiberi nequa- *tiones novæ fieri possent*
 quam convenit si in die cri- *unde nonnulli magis re-*
 co sanguis & narib. fluere *vellere student.*
 ncipiat, vel fluxurus spere-
 ur. Revellunt autem duræ
 ehementesque crurum fri-
 ationes, ligaturæ, cucurbi-
 æ & jam recentiorib. pra-
 tificis usitata quæ sub plan-
 is pedum ligantur ut sapo-
 um sale braslicæ folio vel
 alteri rei impositus qui in
 mediocri dolore confert.
 el raphanidis radices cum
 ale quæ tum odore cito
 nolesta. veluti & tincarum
 iscium quæ & fissæ sub pe-
 libus ligantur. Ex his autē
 quæ maximè revellunt sunt
 columbæ vivæ fissæ & cum
 sanguine suo calentes ad-
 notæ plantis pedum, quæ

2. *Quidam ranunculum supponunt pedib. unde etiam febris quandoque tollitur periculosa tamē ulcera excitant. sic ros solis carpis applicatus quartanam tollit.*

partim singulari eximiaque proprietate partim similitudine moderati caloris non modo à capitis doloribus, sed & à delirio frequenter ægrotos liberant. Quæ verò pedib. applicantur tum demum applicanda quando pedes sponte incalescunt. finendæ autem sunt columbæ sub pedib. ad minimum per horas 12. tum in lebetem aquæ frigidæ abjiciendæ, ne odore sint molestæ.

De Sudoribus.

CAP. 27.

Svdores qui in febrium statu & præsertim in critico die erumpunt nullatenus reprimendi sunt, sed quiete & mediocri calore adjuvandi. nisi fortasse adeo large erumpant ut vires dejiciant, quod si acciderit auferendo tegumenta & sudorem abstergendo recreandus æger erit, ac ei permittendum, ut aerē paulo magis perflatum admit-
tag

1. *Tum cutis obstruitur unus enim humor alium evocat.*

tat & dormiat 2. Sudores autē qui posteaquā febres cessaverint adhuc perseverant & vires dejiciunt reprimendi ac prohibendi sunt. Paulus pleraq; astringentia enumerat corpori vel inspergenda, vel admovenda quorum nostra ætate non est usus alijs remedijs repertis. Ad sudores autem prohibēdes conducit 3 saccarum, sive conserva rosarum rubrarum vesperi ad ingressum lecti 3. aut 4. 3 pondere sumptum, cui, si sola non satis reprimat sudorem, addi potest Rob de ribes vel syr. de granatis acidis & aliquid specierum diatrion santalon vel diarrhodon Abbatis. Quod si verò sudor ad huc perseveret linteamina aut indusia, aceto rosaceo aspergenda deinde resiccanda erunt in quibus æger decumbit aut induitur à laboribus & vehementibus exercitijs abstinendum, in aere frigidiorē versandum, cibus sit ex ijs quæ facile nutriunt &

2. Tum enim ad interiora revocantur humores.

3. Sic Itali vocant conservam rosarum, officina saccarum in aqua rosacea dissolutum ejus loco dant quod eam vinum non habet. non subito. hoc efficit (neque enim expedit) sed paulatim. prodest & phthisicis. optimum quod non ultra annum fuit confectus.

lentoris nonnihil habent. ut
sunt carnes musculosæ &
animalium extremæ partes
quæ & cum alijs cibis coqui
possunt. Largior non sit po-
tus neq; substantia ejus ni-
mis tenuis. vinum rubrum
& astringens laudatur.

De Tussi.

CAP. 28.

TVssis quæ non prima-
rio affecto pulmone
aut respirationis instrumen-
tis in febribus accidit circa
initium & in ipso initio ac-
cessionis molestiam facit.
& ut plurimum sicca est. Fit
autem hæc quandoque ex
acrimonia caloris febrilis,
quandoq; ex viscerum ob-
structionibus. Et siquidem
ex acrimonia fiat linctus
vel syrupi exhibendi erunt
refrigerantes, ac acrimo-
niam obtundentes: ut sunt
syr. de violis, syr. de ziziphis
& vulgò jujubis dictis, vel si-
milis. Si verò simul adsit
destillatio quod tenues cū
tussi humores prodeuntes
osten-

*1. Omnium humores
acres obtundentiū præ-
stantissimus est hic.*

ostendunt syr. de papavere

reliquis erit admiscendus.

Conveniunt autē & diatra-

gacanth. frig. succus gly-

cyrrhizæ, glycyrrhiza ipsa

& quæcunque dulcia sunt

& non calent. Si verò tussis

accidat ex obstructione jo-

cinoris aut lienis quæ & sic-

ca tussis est ac in diuturnis

febris non raro contin-

git, providendum erit vis-

ceribus quemadmodū suo

dicetur loco.

2. *Vsus sum aliquando
fœliciter syr. de tussi-
lagine, verum ea para-
ta nos habemus in offi-
cinis.*

3. *Ex acrimonia autem
in tertianis & ardenti-
bus. est autē & hæc sic-
ca. metuendum ne hy-
drops fiat.*

De Sternutamento.

CAP. 29.

STernutationes quæ dieb.
superveniunt criticis &
quando speratur aliqua san-
guinis per nares vacuatio
nullo modo sunt prohiben-
dæ, sed, ijs quæ alio tempo-
re molestæ sunt, occurren-
dum. Paulus narium, fron-
tis, & oculorum perfrictio-
nes aliaque similia, tum &
calentis olei infusionem in
aurem, consulit, veluti di-
vertentia. potest verò &
cervix in eundem finem

1. Nam *sternutamenta calfacta cerebri anteriore parte fiunt.*

deorsum perfricari. Inter remedia autē quæ cito steruntationem cohibent recentioribus comperta sunt laminæ frigida ex ære, argento, aut stanno, vel alia actu frigida: sæpius fronti admota. Abstinendū verò ab omnium acrium odore ut sinapeos, piperis & similia, & à pulvere & fumo.

De Siti.

C A P. 30.

1. Nam *calorem reprimat & humores in corpore retinentur, unde longior febris.*

Sitis quandoque propter siccitatem & humiditatis fit inopiam; quandoque propter caliditatis abundantiam præsertim in partibus per quas humor in ventriculū defertur: quandoque verò ex utraq; causa, veluti in febribus. Sitim autem optimè & citissimè potus sedat, sed hunc in febre quovis tempore exhibere aut permittere minime confert: neque enim prius quam febris accessio minui inceperit concedendus est potus. Interea si sitis urgeat

urgeat lenimenta quædam offerenda sunt quæ sitim mitigare aliquo modo queant, ut sunt confectiones quædam dulces & præsertim refrigerantes ut syr. de granatis acidis, rob de ribes, vel de agresta, cerasa condita, cucurbitæ condita, lactuca condita & similia, ex quibus quandoque aliquid in ore sumendum. Mitigant verò & sitim quæcunque linguæ asperitatem leniunt, item & glycyrrhiza & saccharum appellatū candi. Posteaquam autem calor febrilis sese remiserit ptisanæ decoctum, vel alius tenuis potus exhibendus est. & quandoq; etiam admonendus æger ut bibat.

Si verò citra febrim sitis fiat veluti à salforum usu, vel à vini fortis ac meraci potu, & quidem sub noctem illis ut Hipp. ait obdormifcere bonū est. modo non

2. Succis horum quum haberi possunt, uti possumus.

3. Crassus enim obstructionem in viscerib. præbet. monendus autem ut bibat ut sudor materiam habeat. sudare enim in fine particularis paroxysmi utile est.

4. Commentator Thucydidis 4. lib. ubi Thucyd. lacedæmonijs in Sphacteria insula obsessis per urinatores semen papaveris melle illitum & lini semen molitum fuisse allatum hoc quidem ad tempus delinire sitim ideoq; febricitantib. à sui temporis Medicis exhibitum. illud vescum esse, corpus nempe: licet lachryma lethalis opium dicta.

5. Somnus concoquit. hæc descendunt sitimque non efficiunt. multus autem potus turbaret ventriculi confectionem.

¶

magna sitis, addit Gal. nam levioris sitis somnus remedium est.

Sed si magna fuerit sitis & præsertim ex defectu humidi, aut à forti ac meraciore vino, omnino dandus est potus. nam defectui, ut Gal. ait, succurrere convenit, & caliditatem factam à vino restinguere utile est⁶.

6. Metuendum enim ne humorib. accensis febris fiat.

7. Ut fieri solet in feminis ex partu difficili, aut abortu nimium purgatis.

8. Ad miraculum usque sitim sedare sepe expertus sum.

Quod si autem post multam vacuationem sitis supervenerit⁷, citò nutrirī ac refici corpus debet. Copiosa autem vacuatione si febris aliqua accesserit alimentum ex hibendū quod non solum citò nutriat, sed & calorem contemperet. veluti est capo cum ptisana ex multa aqua decoctus. hujus etenim jus præter quod nutriat citissimè etiā sitim sedat⁸.

De Nausea.

CAP. 31.

Nausea quandoque in febrium fit accessionibus veluti in augmento: quan-

quandoque etiam post accessionem & quum febris desijt molesta est ac perseverat¹.

Si itaq; in accessione acciderit, ventriculo conante & nequeunte quod molestum est expellere exhibendum erit aliquid quod vomitionem adjuvet², veluti

ptisanæ decoctum tepidum cum oxymelite, vel oxymeli solum, quo sæpenumero vomitione vitiosi humores expurgantur.

Post accessionem cessante febre si nausea perseveret, & æger cibum fastidiat, & purgationes præcesserint, roborandus erit ventriculus: foris quidem inunctionibus, fotibus, aut emplastris astringentibus ac roborantib. intrinsecus verò nonnullis compositionibus ipsum confortantibus ac bona victus ratione Corpore verò non purgato purgans aliquod med. exhibendum, sed ventriculum non offendens, ut est hiera picra (si non obstet febris)

1. *Vel propter debilitatem relictam, vel propter reliquias humorum.*

2. *Incisione ac leni detersione qui ob crassitiam & lentorem lateribus ventriculi veluti adglutinati difficulter ejiciuntur humores separando, & in cavum veluti proturbando.*

quæ vitiosos humores in ventriculi tunicis contentos fæliciter expurgat.

3. *Tonum enim adstringentibus suis partibus viscerib. indit.*

Quod si autē febris major sit & biliosi humores vētriculo molesti sint: Rhabbarum utiliter exhibetur.

Si verò æger purgari nō sustineat & pituitosi humores ventriculum graventur, sequendum erit Pauli consilium, ac in quiete, inedia ac somno quoq; si fieri potuerit, continendus. Quorum inedia efficacissima est, quæ vel sola non modo nauseam tollere, sed & recidivas febres superare potest.

Abstinentum autē à cibo toto eo die quo febrilis accessio in expectatione est, neque prius, quam illius tempus præterierit, cibum offerendus est, atque is facilis, veluti sorbitio aliqua.

Unctiones autem, foci & emplastra quæ foris ventriculo admoveri utile est, in curatione febris quotidianæ descripta sunt.

Exhi.

4 Exhiberi verò ad vētriciuli roborationem potest Aromaticum rosatum, vel diarrhodon Abbatis, aut syr. de mentha, vel si bilis aliqua in ventriculo restet syrupus ex absinthio, qui bilem absterget, & simul ventriculum roborat.

Victus sit ex optimis & concoctis facilibus, quæ aromaticis (zinzibere caryophyllis & similibus) condiri utile erit. Vinum concedendum (nisi febris obstet) generosum.

4. *Odorata totum quod à vertice ad Umbilicum est, & turbere, & mitigare plurimum possunt, ut inquit Plato in Timeo. Quod mare conscendētes nauseant, non tantum jactationi fluctuum, sed viroso odori maris non male tribuitur.*

De Vomitu.

CAP. 32.

Vomitum spontaneum qui confert & leviter fertur non esse reprimendum ab Hipp. docemur. Sic nec illum reprimi oportet qui postquam signa coctionis apparuerint in die critico supervenit, nam & talis confert. Sed alio tempore superveniens & qui non leviter, sed molestè fertur ac vires dejicit omni cona-

γ. Nobile emplastr. cuius vim saepe sum expertus. monendi tamē aegri sentiri angustiam quandam, dum inhaeret.

tu est sistendus. neque refert si vel flava bilis, vel atra sit quæ rejicitur nisi quod atræ bilis vomitio magis sit periculosa. Habet Paulus cataplasma ventriculo imponendum ex palmulis sive dactylis, & alijs astringentibus. hujus loco uti possumus empl. ex crusta panis vocato, quod in Cordo reperitur. Nō proficiente autē hujusmodi cataplasmate, vel aegro non sustinente, cucurbitula admoveri poterit media inter umbilicum & ostij ventriculi regione. Sedato vomitu cibus paulatim dandus, cui & astringentia quædā admiscenda, ut succus malorum granat. succus omphacij, ribesij aut similis. Dandum verò & generosum vinum, vel etiam aromatites ad vires reparandas quandiu febris non obstat.

De Singultu.

CAP. 33.

Singultus est affectus oris ventriculi & veluti quæ-

quædam ejus partis : con- 1. *Fit hic pugna reten-*
vulsio quæ fit vel ex reple- *tricis & expultricis.*
tione, vel ex inanitione, aut
ab acrimonia eorum quæ
in ventriculo continentur,
vel ex nimia refrigeratio-
ne.

Singultus .g. qui in febribus accidit corpore nondum purgato à vitiosis humoribus ventriculi ostio molestis excitatur. quibus vel vomitione redditis, vel per inferiorem ventrem expurgatis cessat. Si itaque à vitiosis humoribus singultus molestiam faciat exhibendum aliquid erit quod vomitionem adjuvet, vel quod per inferna expurget veluti quando nausea molesta est. Deinde roborantia admovenda.

A frigida causa veluti à frigidissimo potu, singultus superveniens calfacientibus sedatur etiã foris admotis. Singultus autem qui in fine febris viribus jam debilitatis infestat, præsertim post magnam vacuationem, ex inanitione & debilitate oris

2. *Alioqui nimis foret frigidum.*

3. *Involutum folijs brassicæ aut betæ, aut linteis.*

4. *Vbi contusum fuerit insperguntur.*

5. *In levi singultu quandoq; solum prodest. mediocrē ejus vim comperi.*

ventriculi accidit. In hoc casu laborandum est ut retentrix vis ventriculi roboretur quod fit per astringentia ut sunt oleum ex mastice, oleum ex cydoneis, addito oleo ex mēta, item empl. ex crusta panis, vel ejus loco pomū cotoneum excavatum & oleo masticino repletum ac deinde coctum & ori ventriculi instar cataplasmatismis admotum, addito & gariophyllorum, vel mentæ, vel utriusq; pulvere. Prodest etiam fomentum ex absinthio, mentha, rosis rubris, & anethi semine in sacculo confutis. & in vino decoctis. Profuit etiam multis præsertim debilibus spongia imbuta forti & austero vino quale est Hispanicum calens ventriculi ostio sæpius admota. Profunt verò & adversus hujuscemodi singultum ea quæ à totius substantiæ proprietate ipsi resistunt ut est semen anethi præsertim in vino decoctum & sæpius olfactum. Liberat verò & à singultu

singultu sternutatio super-
veniens ut Hipp. refert. sed
ab ea, ut Gal. scribit, quæ à
repletionem fit. possunt id-
circo in tali casu quædam
naribus admoveri quæ ster-
nutationem provocant, quæ
tamen etiam si ex inanitione
fiat non sunt inutilia. Vio-
lentiore enim eo motu ali-
quo modo ventriculo co-
moto tandem expultrix ejus
facultas quiescit.

6. *Humores enim mo-
lesti ad fundum descen-
dunt.*

De Sanguinis fluore in febribus.

CAP. 34.

Sanguinis fluor, qui in
febribus contingit si ac-
ciderit die critico, nullo
modo sistendus est, nisi
diutius fluens vires dejiciat,
quo casu ut sistatur labo-
randum est. Diversiones fa-
ciendæ per brachiorum &
crurum frictiones duras, &
fortes ligationes. fronti ad-
moveri frigidam poscā sæ-
pius convenit: aut si hæc
non sufficit cataplasma ex
bolo cum ovi albo, quod

H s

1. At verò quæ extrinsecus particula profluētum adstringentia, tum citra astrictiōem frigida admoventur, hæc ipse (velut plerique medicorum) non ubique nec semper probo, sed mihi contra omnino quam fieri res postulat, ipsum sanguinem intro compellere ac venas quæ in alto sunt implere videtur. vidimus enim quosdam eorum qui ex pulmonibus sanguinem rejicerent ex thorace refrigerando manifestò læsos: æquè ut qui sanguinem vomuerunt nonnullos quod venter foris esset refrigeratus. Eodem modo & eorum quib. ex naribus sanguis profluxit aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerunt. illis itaque utendum quum ad alia prius averteris. ut .v.g. in naso ubi sanguinis missione, artuum frictione, deligatione, aut cucurbitulis hypochondrijs affixis usus fueris. Quin ne sic quidem ad frontem & caput ilico refrigerandū, sed prius est ad contraria revelendum, utiq; affixa in summa cervice cucurbitula. duplex enim in hæmorrhagia aversio est. quæ est ad totius corporis inferna, & quæ ad capitis posteriora: nares enim cum superiore & anteriore parte sitæ sunt. adversetur autem ei quod supra, id quod infra: & ei quod post habetur, id quod ante. Gal. 5. Meth.

runda

runda : oblonga illita ovi 2. *Alliganda fasciane
albo cui pulveres admixti excidat priusquam ora
sint astringentes ut dicetur venarum fuerint agglu-
lib. 3. tinata.*

De ulcere circa os sacrum.

CAP. 35.

EX diuturno decubitu ul-
cera circa : os sacrum 1. *Signum plerumq; le-
ac in inferiore lumborum thale, tamen quidam
parte fieri frequenter con- reficiuntur.*
tingit præsertim viribus &
naturali facultate deficien-
tibus. adhibenda sunt quæ
ulcera resiccent ac consoli-
dent, qualia Paulus enume-
rat quibus tamē præstantius
est empl. quod componitur
ex cerusæ partib. duab. mi-
nij factitij : parte j. & olei 6.
partib. ad nigredinem usq;
decoctis. ex quo emplastra
conficiuntur quæ fortiter
adhærescunt & ulcera con-
solident si modo aliquid
naturalis roboris superfit.

2. *Nam minerali aliud
est minium, è cuius vena
sæpe argentum vivum
effluit, hujus non est
usus.*

De Epicarpijs.

CAP. 36.

IStorum : usus est in ter- 1. *In ardentib. non est
tianis febribus intermit- usus.*

2. *Hoc restitui puellam
nobilem quæ in tertianæ
singulis accessionib. con-
vulsione commitialique
morbo tentabatur. post
usum tamē rhabarbari.*

tentibus post adhibita ge-
neralia remedia. admoventur
verò & pueris qui alia
remedia non admittunt.
materia horū ut plurimum
herbæ sunt quædam ut bur-
sa pastoris, urtica, folia vi-
tis, cornu cervi herba, & si-
miles parum succi habentes.
nobis etiam mentastri-
usus bene cessit quibus sal
& acetum adjunctum, in
quibus præcipua vis reme-
dij est. hæc enim putredini-
bus adversantur & horum
facultate per arterias cordi
cōmunicata putredini hu-
morum cor fortius resistit.
sic ut & humores minus
computrescant. ita tandem
febrilium accessiones remit-
tuntur ac desinunt.

FINIS,

Anno 1583. Iulij 16.

De

De Affectibus qui singulis corporis partibus obveniunt.

LIB. II.

De Alopecia & Ophiasis.

CAP. I.

Lea. I.

Sept. I.

Alopecia autem & Ophiasis non valde dissimiles sunt affectus. Commune utrique est quod veluti emortua summa cute pili extenuentur ac excidant, & ex ipsa cute puncta aut leviter læsa liquor quidam exeat corruptus & mali odoris, sanguinis colorem non habens nisi admodum diluti aut corrupti. Occupat utrumque vitium non totum caput, sed partes quædam, & loca tantum quædam cutis. Alopecia quidem nunc hanc¹, nunc aliam partem, aliquando verò etiam mentum. Ophiasis verò incipit ab occipite², deinde ad utrasque aures du-

1. Sic dicta, quod vulpib. perpetuo eveniat. Paulus. Est autem pilorum in album mutatio, quæ si perseveret excidunt. ob carnis exterioris corruptelam. 10. Problem. 29.

2. Propter inopiam humorum pilos nutrientium calvities: propter vitiatos humores Alopecia & Ophiasis. unum quidem ambæ secundum morbosam affectionem malum, nomina autem juxta figuras habentes diversa. Gal. 1. τὸ π.

3. Sub qualibet figura. Cels.

4. Ac duorum digitorum latitudinem non excedis

dit. Anno 1614. hos affectus quasi Epidemios vidimus, cum levi quasi Pityriasi puerulos invadentes. Curabamus discutientib. & detergentib. localibus tantum, ut vino Gallico in quo sapo communis dissolutus.

5. Subpinguis & ex toto glabra. Cels.

6. Si cutis albidior, peccabit pituita: si nigrior, melancholia: si pallidior, flava bilis. Gal. 1. 1. 1. 1.

bus capitibus serpit, & sæpe eousq; ut in fronte committantur. Ophiasin Cor. Celsus infantibus aliquando ait accidere, & sæpe per se finiri, sed Alopecian ætati cuius supervenire & absque curatione non desinere. Relinquitur ab alipecia & ophiasis cutis lævis & glabra, quandoque densior & mali coloris, atque tunc vitium curatu difficilius existit. Differunt autem ab his defluvium capillorū & calvities. Defluvium capillorum non relinquit loca nuda aut areas nudas, sed æquabiliter ab omni parte accidit. Calvitium verò à syncipite, & capitis corona incipit, paulatim progreditur & cum ætate augefcit. cutis à naturali constitutione non permutatur & sive pungatur sive vulneretur non alium quā sanguineum humorem fundit.

Causa autem alopecie, & ophasis sunt pravi ac vitiosi humores qui ex mala victus ratione subinde nascun-

nascentur⁷. Curatio consistit in expurgatione horum humorum vitiosorum, primum quidem per ea quæ universum corpus expurgant: secundo per apophlegmatismos. deinde⁸ ad movenda sunt localia, medicamenta sufficit autem quandoque sola humorum purgatio & bona diæta præsertim ubi morbus recens est, sed inveteratum malum etiam topica requirit med. qualia apud Paulum repertiuntur. Habet exemplum Gal. curati ab alopecia juvenis, qui per solam cum hiera ex colocyntide¹⁰ purgationem & bona victus revocatione fuit restitutus, prius tamē datis aliquot pillulis¹¹ ex aloë. in qua curatione observandum quod Gal. ante purgationem cum hiera diacolocyntidos non exhibuerit aliqua vel meatus aperientia vel humores præparantia, sed tantum pillulas ex aloë.

his, sed præparationis viarum gratia exhibuit.

7. Si cutis linteo neque levi nimis, neque aspero fricata rubescit, quanto citius id fit, tantò minor affectus. sic si adhibitis med. citius quam ante, vel magis rubesciat, spem curationis facit majorem. Gal. 1. κατὰ τὸ π.

8. Digerentia tenuium partium, calidum intra scopi fines ne cutem talem reddat qualem in calvis videmus. tale ol. laurinum &c. finis ut mali humores exspirent, bonus autem sanguis attrahatur. Gal. 1. κατὰ τὸ π.

9. Æstate in sola, hyeme in balneo. Ibidem.

10. Bis purgavit in 5. diebus, priori vice 4. post 5. 3. dedit.

11. Ciceris magnitudine 11. dedit sunt tam magna ut ex 3. possint fieri non enim cicer nostrum intelligendum sed orobacum quod minus. has non purgatio-

Defluvium
capillorum.

12. In muliere rarum.
in spadonib. non visum,
nec in ullo ante veneris
usum; nec infra cere-
brum, aut infra verti-
cem, aut circa tempora,
atque aures. Plin. l. 11.
c. 17. Albescunt autem
qui defectu alimenti ex-
cidunt; ut aquilis præ-
inedia pennæ, quando
pullos educat. Plin. l.
10. c. 3. Tale amantis
pallidi, atque emaciati
fuit defluvium apud
Theocryt. Idyll. 2.

13. Adeo ut Medicus
hinc audacter pronun-
tiare queat illum in quo
tale deflurium animad-
vertit ficus vel alia circa
podicem vitia pati.

Lect. 2.

Sept. 3.

πτυρία-

σις.

1. Quæ solā Cuticulam
quam Epidermida vo-
cant, afficit; cujus veluti cariem facit. nascitur ex sordi-
bus & incuria capilli impexi. Comm. in Horat.

Quod autem ad deflu-
vium ¹² capillorum attinet
illud dupliciter contingit.
quandoque enim sensim &
paulatim capilli excidunt &
attenuantur, quandoque
multi subito excidunt, &
subinde omnes capitis pili
tum & menti ac etiam su-
perciliorum. Prius deflu-
vium ad raritatem cutis, &
inopiam materiæ pilos ge-
nerantis consequitur, neq;
alijs remedijs quā localibus
opus habet. ijs videlicet
quæ mediocrē densitatē cu-
ti inducunt qualia à Paulo
describuntur. Alterum de-
fluvium ex humorum vitio
ac corruptela accidit. & est
symptoma luis venereæ,
quod comitatur ulcera &
alia circa ¹³ anum vitia, &
talem curationem requirit
qualis luis venereæ existit.

Inter capitis cutis affe-
ctiones est etiam Paulo pi-
tyriasis appellata quæ Cor.
Celso porrigo dicitur, alijs

furfu-

furfures, est autem hæc veluti scabiei siccæ species squamulas ac furfures proferens, sed citra cutis inferioris exulcerationem & pilorum casum. Contingit vero & caput scabie laborare cujus squamis detrahitis cutis exulcerata relinquitur, atq; hæc duplex est. quædam enim fit absque jactura pilorum quæ mitior ac facilior curatu. altera verò cum perditione & defluvio capillorum veluti in Alopecia. facit hæc magnas & albas crustas quæ aliquando totum caput, aliquando partem ejus occupant. & hæc non modo fera est, sed etiam si inveteraverit difficulter curabilis. Nonnulli ex ijs qui Arabum doctrinam sequuntur hanc Alopeciam nominant & lepræ speciem faciunt. & referri quidem potest ad lepram Græcorum, sed non tamen idcirco ad elephantiasin, quam Arabes lepram nominant.

Inter capitis vero externa

Scabies
capitis.

2. Quod ab humore minus acri, nec radices pilorum ledente, fiat.

3. Quæ & ipsa Scabiei species est.

Achores.

vitia quæ sub capillis oriuntur sunt & achores Græcis dicti, Latinis manantia capitis ulcera, quæ tubercula quædam sunt hiantia, exulcerata, & foraminibus patentia, ex quibus assidue humor fluit viscidus, lentus, ac foetidus 4.

4. Ferè fiunt Pityriasi, ac propemodum Psoriasis præcedente. Crito apud Gal. 1. de med. secundo loco.

Κηελον.

5. Cerium circa pectus aut dorsum tumorem inflammatum, eum describit Iul. Pollux. Sed forte Meliceridi id nomen tribuit. l. 4. c. 25.

συκωσις.

6. Meliceris est tumor non altus in quo continetur humor mellisimilis. tria sunt abscessuum sine dolore genera quæ plurimum in capite gignuntur. steatoma, atheroma, meliceris. exulceratur in melicer. non cutis externa, sed membrana interior. unde sectione tamen curatur.

Accedit ad hoc malum, quod & κηελον sive favus dicitur, cujus tubercula majora & ampliora sunt & magis patentia è quibus humor fluit melleus & veluti is qui in favis continetur, odore foetidus, quos & tumores ipsi & colore & figura non raro referunt, præsertim quando malum in latitudinem sese extendit. 6 Differens autem istud vitium est à Meliceride.

Annumerantur verò & capitis vitij Græcis dicta σῦκα Latinis fici quæ sunt eruptiones ulcerosæ, duræ, rotundæ & subrubentes cū dolore, in quo ab alijs vitij

differt.

differt. alia enim dolorem non inferunt.

Origo horum omnium vitiorum ex malis est & corruptis humorib. à prava victus vivendique ratione generatis. Oportet autem ut Gal. ait ad præscriptas affectiones cōvenienti diæta uti & corporis ac capitis purgationem adhibere per pillulas ex aloë, colocynthide & scāmonio cum brassicę succo coāctis. deinde localibus remedijs utendum. Loco autem pillularum istarum utuntur recentiores pill. cochijs, vel etiam de fumo terræ dictis. sicuti & loco hieræ diacolocynthidos accipitur cōfectio Hamech. quæ gratior est & non minus tamē purgat quam hiera illa diacolocynth. Meminit verò & Paulus * psydraciorum & exanthematum. ψυδράκια autem parva sunt pustularū tubercula. Exanthemata verò generali nomine leves per cutem humorum eruptiones dicuntur, sub

7. Quas quidam quasi ῥήκκια seu granula dicta putant quod tali forma exhiberi soleant. Habent autem præter hieram, quæ aloë quasi correctæ est, colocynt. & scam. nil aliud quam turbith, & stæchad.

8. Psydracia sunt ignea exanthemata, sponte pronata, exulcerata, in superficie. Iul. Pollux. l. 4. c. 25.

ψυδράκια.

ἐξανθήματα.

9. Vide Hippocrat. qui humorum colorem veluti florum esse asserit.

quibus Phlyctænæ, psýdracia, epinyctides & similia tumorum genera comprehenduntur. Gal. & istis eandem quam alijs curationem necessariã esse scribit. Paulus localia tantum adhibenda esse præcipere videtur.

Cephalalgia.

Lect. 3. Sept. 4.

Differentiæ.

1. Partem eam intellige quæ pilis tegitur præcipue synciput. aurium, oculor. &c. non dicuntur capitis dolores.

2. Circa aures; circa tempora aut alibi. Avicenna clavum vocat.

3. Maximè laborant interiores, sin exteriores laborent ad tactum etiã sentitur dolor. difficile tamen hæc discernuntur.

De Capitis Dolo- lore.

CAP. 2.

Capitis dolores magnitudine inter se differunt; sunt quidam leviores ut Cephalalgia dicta; alij graviores & molestiores ut est Cephalæa. Occupat dolor quandoque anteriorem & maximam capitis partem, subinde dimidiam ejus ut hemicrania quandoque vero partē unam aliquam. 3. Patiuntur dolorem aliquando partes interiores; ut cerebri membranæ, arteriæ, aut venæ: quandoque exteriores tantum: subinde ambæ. Laborat verò etiam caput quandoque primario affectu

affectu & per se, quandoq;
verò per cōsensum & sym-
patheiam. Dolor verò vel
gravans est, vel tensivus, vel
pungens, vel cum pulsatio-
ne. Causæ dolorem infe-
rentes quandoq; sunt pro-
catarticae, sive externæ,
alias antecedentes, sive in-
ternæ. Externæ sunt ardor
solis⁴, frigus, odor gravis
& molestus. ebrietas, vel
ictus sive percussio. Causæ
antecedentes sunt intem-
peries, & frequentissimè
quidem, cum humorum af-
fluxu rarò absque his. Pec-
cant autem humores quan-
doq; qualitate, quandoque
quantitate⁵, quandoque⁶
utrisque horum.

Signum autem per con-
sensum caput laborare est
dolor non permanens. vel

Causæ.

4. Talis fuit cephalal-
gia filij Sunamitidis.
2. Reg. c. 4. v. 19. & Io-
næ quum Euro silente sol
illius caput percuteret.
v. 8. c. 4. Herbae male
olentes gravant caput.
ut ocymū ex cuius odo-
re quandoque scorpius
in capite enatus fuit.
Cephalæa vehementius
fæminas tenet ob dili-
gentiam capillorū. Cæl.
Aurel. c. 1. chronic. dum
enim comuntur frigido

Signa 1.
Num pto
consen-
sum.

deri, ardo-
rive solis,
aut ignis ca-
put expo-

nunt; illudq; mades faciunt. Atqui cerebro perniciem etiam
cujuslibet synceri humoris assiduitas reservat, tū solis ani-
mādo simul & siccādo capillos exoptabilis ardor. Tertull.
de cultu fæminar. Nimietas lachrymarum Apuleio causa
doloris acris capitis. l. 3. asini aurei. Ad lunā dormire, aut
diutius in illa morari. 3. De Crisib. 5. Ut sanguinei hu-
mores. 6. Quando multi biliosi ac acres humores.

non semper sui similis, uno tempore intensior, alio remissior, pro partis videlicet conditione cui caput consentit.

2. Item & ille dolor qui alijs præcedentib. affectionibus supervenit licet permanens sit, aut parum remittatur etiam per consensum fieri dicitur. Non per consensum verò, sed primario & primigenia affectione caput laborat quando dolor perseverans ac perpetuus est, & qui alijs præcedentibus malis non supervenit.

7. *Ut quum mali cibi aut humores in ventriculo sunt: vel quum alioqui per se est infirmus.*

Per consensum autē caput dolore afficitur malè se habēte ventriculo & præsertim ostio ejus, non rarò verò & ab utero mulierib. quandoque vero & propter jecinoris, lienis, mesenterij, renum, aut aliarum partium dolores sive morbos, ut Avicenna ait.

Morbi autem sive affectiones quibus capitis dolores superveniunt & propter quos per consensum etiam

etiam dolet sunt morbi febriles, lues venereæ, & quandoque plethora ac nimia repletio. Capitis autem dolores qui per consensum fiunt quandoq; ex solo consensu sive συμπαθεία accidunt, nullis transmissis ad caput humoribus aut vaporibus: aliquando verò sursum transmissis vel humoribus vel vaporibus.

Dolorē verò capitis per consensum ventriculi factū ipse male affectus ventriculus ostendit præsertim quando dispositio ejus mala præcessit. vel hac desinente dolor capitis conquiescit. veluti quādo acris & biliosus humor in ipso ventriculo, vel circa ipsius ostiolum congregatus est, qui in ventriculum aut ab aliqua parte sponte in eum influit: aut attrahitur ut propter famem diutius toleratam; vel in ipso generatur, veluti bilis præsina quæ in ipso ex pravis cibis non raro gignitur. sic & quandoq; ex vaporibus ex

8. Est enim mirabilis horum sympathia. sic vulnerato cerebro vomitus sequitur.

Lea. 4 Sept. 7.

Per consensum
Ventriculi.

9. Ut ijs quibus alter ramus à folliculo bilis in fundum ventriculi infertur.

10. Tolerare enim famem (ut ait Avicenna) ventriculum humoribus putridis implet.

11. Sic vinum potens etiam mediocriter haustum. allium, cape &c. Spiritus naturaliter superna petens ex inferiorib. trahit corpora per arteriam atque stomachum quæ sunt corporis velut majora fumaria. Themison apud Cæl. Aurel. c. de Cephalæa.

12. Quæ sit ratione inflammationis circa mesenterium, diaphragma, je-
Ab utero.
 cur aut pulmones, consistētis, vel collecto sanguine in māmillis. aph. 40. sect. 5.

13. Ab utero fiunt dolores capitis qui post partum superveniunt.
 1. De Euporist. Gal. Fiunt autem in syncipite potissimum.

ventriculo ascendentib. caput dolet, quod fit vel à cibo vel potu vaporosis¹¹, & præsertim in vètriculo nondum concoctis. non raro verò etiā ab oris ventriculi debilitate capitis oriuntur dolores.

A jecinore autē vel splene aut alijs interiorib. corporis partibus capitis morbi facti concomitantia magna ex parte alia habent symptomata, quibus à capitis doloribus differunt. idcirco & particularia alia nomina obtinuerunt: ut¹² paraphrenitis, & melancholia hypochondriaca &c. de quib. suo loco. Ab utero verò dolores capitis fiunt, vel mensibus suppressis, vel ex alijs uteri morbis¹³, & quando ex hoc capitis dolor provenit sæpenumero sentire se mulieres affirmant, vapores & spiritus quosdam calidos ad caput ascendere. Quibus autem hoc contingit sanguine ferre abundant & calidioris sunt temperamenti. Capitis autem

autem dolores qui febricitantibus aut lue venerea laborantibus superveniunt nō primarias esse affectiones, sed per consensum fieri & symptomata illorū morborum esse, satis notum est.

Curatio doloris capitis qui per consensum.

Lect. 5 Sept. 8.

Quum itaque caput propter ventriculi affectū per consensum dolet atq; ipsius ventriculi ostium quod stomachus dicitur ē mordacibus ac vitiosis humoribus infestatur optimū est hunc citissimē evacuare & quidem ut Gal. ait vomitione quæ ijs qui ad hanc¹⁴ proclives sunt, aquæ potione, tepidæ β. facile succedit. Si verò non successerit vel digitorum, vel pennularum immissione ventriculus ad vomitū irritandus est. Sed ijs qui ad vomitionem faciles non sunt exhiberi convenit quæ infestantem bilem deorsum ad fundum ventriculi descendere faciunt, ut sunt quæ simul & refrigerant & astringunt

Ventriculi,

14. In his regionib. non sunt ita proclives ad vomitum ideo præstat reprimere molestum præterea est, ac multa sequitur incommod. estq. magis naturæ aptum ad intestina, humores peccantes deducere.

15. Curavi adolescentem, qui geminum meatū, habebat assiduo usu singulis aut alternis diebus unius pilulæ ex hiera. R. Dod.

ut panis intinctus agrestæ sive vino omphaciti, aut succo granatorum acidorum, aut succo fructuum ribesij. tum & quæcunque ex his conficiuntur. quandoque verò etiam aquæ frigida potio, & pira, aut poma eruda. Quod si vero humor magis in fundo hæreat optimum fuerit eum illic continere quod per superius enumerata fieri potest. nam in fundo hærens facile ad intestina delabitur.

Vbi verò humores conquieverint & nō multi fuerint, absinthij usus commodus est donec ventriculus restitutus fuerit. bilē enim absterget & ventriculū roborat. datur autem vel vinum, vel etiam cerevisia in qua maceratur, ante cibum vel mox initio: vel etiam ex eo compositum serapium ante cibum, quod præter absinthium etiam succum admittit cydoneorum. quæ de causa & debilem ventriculū magis roborat.

Si

Si vero humores vitiosi fuerint copiosi & frequenter molesti, sic ut in ventriculi tunicis imbibiti videri queant, utile fuerit exhibere hieram picram, quæ, auctore Gal. pharmacū optimum est ad ventriculi purgationes, nec minus bonum ad capitis ex ventriculo dolores. post purgationem ex hiera ad absinthij usum etiam pervenire licebit. Quod si ex fame diutius tolerata capitis dolor fiat cibus oblatu remedio erit, vel aliquod eorū prius dictorum quæ biliosos ac mordaces humores ad ostium ventriculi ferri prohibeant. Si autem propter vapores ac fumos à cibo pravo ¹⁶ aut potu veluti meracioris vini, caput dolet aquæ frigida potio subinde conducit. tum & ea quæ supra enumerata sunt. jā & somnus superveniens dolorem tollit. Quod si verò nec dolor reprimi queat nec somnus superveniat vomitus erit excitandus, aut

2.

3.

16. Si venenati cibi, statim vomitu rejiciendi. commune hoc veteribus ut non dent alexipharmaca nisi veneno vomitu rejecto. Hinc quū Commodus veneno exhibito multum vomuisset, veriti qui exhibuerant, ne restitueretur, strangulandum curarunt. Herodiam. l. 1.

17. *In calidis corporib. ut Italarum potus frigida convenit. nos libentius actu & potentia utimur quod forte humor debilitati adsit.*

enemate adjuvandus venter ut citius assumpta ex ventriculo descendant. 17 A debilitate ventriculi & potissimum oris ejus si vapores caput petant, (cujus signum est quod post sumptum cibum caput dolore gravetur) tunc expedit post assumptum cibum aliqua exhibere quæ ostium ventriculi roborent ac contrahant, ut sunt semen coriandri præparatum, conserva ex rosis rubris, carnes cydoniorum & similia. vel tragemata quædam ex semine coriandri rosis rubris siccis, pane tosto, quibus additur quandoque nonnihil feminis anisi, & si ventriculus frigidior galanga, garyophylli vel menta sicca. deinde saccari quantum est omnium pondus. ex quo aliquid sumitur mox ab assumpto cibo potione nulla subsequente.

Vteri.

Ex utero capitis dolores adhibitis utero idoneis remedijs, cessant. prodest suppressis mensibus venæ sectio,

sectio, & juniorib. quidem
 ex vena circa talos¹⁸, se-
 nioribus verò quæ 50. an-
 num exceſſerunt circa pe-
 dis majorem digitum. pro-
 ſunt verò & his balnea pe-
 dum & crurum deorſum
 frictiones, præſertim dum
 in balneo pedes ſunt. bal-
 neum fieri poteſt ex deco-
 cto betonicae, arthemisiae,
 florum chamomæli, addito
 fale. ſubinde & cum cine-
 ribus lignorum, aut lixivio
 decoquantur herbæ.

18. Quam venam matri-
 cis vocant.

Curatio doloris capitis à
cauſis procatar-
ticis.

Leſt. 6. Sept. 12.

Si à diuturna ſub ſole mo-
 ra caput nimium excalfa-
 ctum doleat conveniunt ea
 quæ refrigerant & hume-
 ctant¹⁹ ut eſt frigidaſper-
 ſio, vel applicatio aquæ la-
 ctuæ, vel etiam roſarum
 cum oleo roſacea, viola-
 ceo, aut nenupharino. Gal.
 ol. roſaceo frigido caput
 perfundere jubet. Paulus
 poſcam admovet cum oleo
 roſaceo. Poſſunt verò &

I. Calor.

19. Cavenda tamen, ut
 Gal. ſuadet, narcotica.
 atque etiam astringen-
 tia, niſi in pauca quanti-
 tate. 2. πρὸς 86.

20. Qui nulla ratione
permittit occiput per-
frigerari. neq; etiam fa-
cile à calore dolet.

21. Posset & anethum
admoventi nisi calidius
esset.

II. Frigus.

22. Ut à vehementi fla-
nu ventorum.

23. Vel deficiente milio
ex semine phalaridis
quod vulgo canari-saet.

capiti applicari lactucæ, vel
violariæ, vel portulacæ, vel
sempervivi folia, per se vel,
cū oleo aliquo ex superio-
ribus, contusa. Avincenua
cataplasma ex hordei fari-
na cum semine psyllij lau-
dat. Admovenda autē hæc
sunt syncipiti sive anteriori
capitis parti, non autem oc-
cipiti, ut 20 Gal. suadet. &
quidem initio ipsius dolo-
ris. Vbi dolor inveterave-
rit adjicienda sunt superio-
ribus quæ aliquantum frigi-
ditatem aliorum reprimant
& simul vim quandam ha-
beant doloris sedativam:
ut est chamæmelum & ex
floribus ejus compositum
oleum.

Si autem à nimio frigore
caput doleat calfacienti-
bus ol. caput ungendum
est: ut rutaceo, laurino, vel
si fortiore opus est etiam
ex euphorbio composito.
Aut utendum est cal. & sic-
cis fomentis. ut ex milio,
panico, vel etiam malto,
frixis & sacco impositis
& capiti calidè admotis. vel
floribus

floribus chamomæli cum sale²⁴ frixis & similiter admotis. Gal. usum vini & corporis motum commendat.

24. In vase mundo nullis odorib. infecto. rarum hoc genus doloris tamen quum incidit magnum in fomentis his usum reperi.

III. Odor.

I.

A malis odoribus si caput doleat refert cognoscere qualis fuerit odor offendens. an videlicet fuerit foetidus veluti à cadaveribus corruptis vel à calidis caput implentibus; vel à frigidis torporem inferentib. Si igitur odor à quo caput dolet fuerit foetidus veluti à cadaveribus mortuorum vel alijs similibus theriaces aliquid exhibendum est²⁵, vel alterius alicujus alexipharmaci. aërem verò etiam alterare conducit ut accensis juniperi lignis, aut baccis ejus super carbones positis; vel aromatum suffitu. acetum verò & sæpius naribus admoveere utile est. Si autem ab odore calidorum caput doluerit ut moschi, ambræ, croci, castorei, ocymi & similium offerenda sunt naribus frigida odorata ut violæ, rosæ, flores nenupha.

25. Nam si contingeret hunc foetorem ad cor ferri in pestem inciderent. Qui aërem à cadaverib. ad Neoportum Anno 1600. Julij 2. caesorum infectum hausserat, in icterum letbalem incidit.

2.

3. ris, camphora, santali latei, & aqua rosarum. Frigida verò si odore nocuerint ut sunt hyoscyamus, papaver, opium offerenda erunt calida ut crocus, semen nigellæ, caryophylli & similia aromata, addito si libuerit aceto.

IV. Ebrietas.

26. *Liberum eundem apud Ægyptios Osirin Harpocraton industria hederatum argumentatur, quod hederæ natura sit cerebrum ab heluco defensare. Tertull. de corona milit. Eidem mitra vinciri caput, propter dolores qui fumante vino caput aggre-diuntur. Euseb. 2. præpar. Evangel. c. 2. refert. Arcta sanè per fasciâ capitis dolentis constrictio, levamen affert.*

V. Ictus.

Ab ebrietate dolor capitis natus si somno quiete & abstinencia non fuerit curatus, neque vomitione consulendum est ventriculo. admittit Gal. vinum tenue & aquosum, sed dilutum. nos verò etiam non dilutum tale permittimus. prodest verò & serapium ex absinthio. Quod si verò nec sic dolor capitis conquiescat ad quietem corpore composito capiti quædã applicari possunt ut brassicæ folia in aquam calidam ut Paulus ait, immersa. item & oleum rosaceum cû succo hederæ²⁶ vel brassicæ & aceto permistû vel aliquid eorum quæ capiti ad insolatam adhiberi solent.

Ab ictu aut percussione capitis

capitis dolor inunctione
olei rosati cum exiguo ace-
ti calefacti curatur, si ictus
magnus non fuerit. nam
major diligentiorē curam
requirit. de qua non est hoc
loco dicendum.

*Dolor ex causa ante-
cedente.*

Lect. 7. Sept. 13.

Dolor capitis à causa or-
tus antecedente diligentio-
rem curam quam cæteri re-
quirit. 17. Cognoscere autem
causam inprimis refert &
anne sola sit intemperies vel
cum humore, rarissimū au-
tem est solam intemperiem
causam præbere dolorum,
ut plurimum humores con-
iuncti sunt, qui sunt vel san-
guinei, vel biliosi, vel pitui-
tosi, vel melancholici.

17. Sic hipp. lib. de arte
inquit Medicū cum suf-
ficere ad curandum, qui
sufficit ad cognoscendam
causam.

Sanguineorū humorum
redundantiam ostendit ha-
bitus corporis plenus ac
temperamentū calidum &
humidū. sensus doloris cum
tensione & quandoq. cum
quadam pulsatione, faciei
cum rubore tumor, pulsus
magni, urinæ vel rubentes,
aut perturbatæ. Supervē-

Sanguis.

K

28. *Vinum si foris applicetur est cal. & siccum. intus actuali suo humore humectat.*

29. *Ab hac autem causa dolor valde magnus atque excedens in cerebri inflammationem quandoque transit.*

Bilis.

niunt autē ex sanguine dolores frequentius veris tempore & cum cæli constitutio calida est & humida : ut flante austro. Promptissimi autem ad huiusmodi capitis dolores sunt qui liberalius vivunt & multo cibo ac potu præsertim²⁸ vini utuntur.

Biliosi humoris redundantiam ostendit dolor capitis cum²⁹ puncturis & corporis habitus extenuatus ac biliosus, ad iracundiam promptitudo, facies pallida ac flavescens, somnus rarus aut exiguis & quandoque cum insomnijs de pugnis, contentionibus, sanguinis profusione, vel incendijs. adest sæpe oris amaritudo, linguæ quandoque siccitas vel asperitas, & sitis. Ex bile autem capitis dolores fieri magis æstate contingit & quum aer cal. ac siccus est quam alio tempore præsertim post multum laborem ac corporis exercitium & calidorū frequentem usum.

Transit autem huiusce-
modi

modi dolor quandoque in
maniam, phrenitidem, vel
cerebri erysipelas.

A frigido ac pituitoso
humore 3^o si caput laborat
dolor gravans est & non
intensus apparet, sed veluti
alicujus pōderis sensum af-
fert. præsertim si materia
fuerit copiosa. adsunt non
raro humorum per nares
distillationes, & quandoq;
ad palatum quæ linguam &
os humectant. adest & som-
nolentia vel somnus pro-
fundior, facies tumet & ex
albido colore pallet. urinæ
cruditatem ostendunt. pul-
sus tardi sunt. Promptissi-
mi autem ad hujuscemodi
dolores sunt frigido ac hu-
mido temperamento præ-
diti. anni verò tēpus maxi-
mè idoneum quod frigidū
est ac humidum. hujusce-
modi autem capitis dolori
quandoque lethargus suc-
cedit, aut carus, aut etiam
catochus.

Pituita.

30. *Non infert dolorem
nisi sua copia.*

Ab humore autem me-
lancholico crasso frigido
& sicco dolores nulli fiunt,

Melancholia.

K 2

31. *Quod vel ex solo
potest colligi schirro.*

³¹ nisi flatus sint permixti qui
tensivum aut gravantē do-
lorem inferant. talis dolor
cum vigilijs, aut gravib. &
molestis insomnijs accidit,
& facile in melancholiam,
aut epilepsiam, aut in lycan-
thropiam mutatur.

Ex sola intemperie.

32. *Quia dolor semper
atrahit ad se.*

³² Dolores ex sola intem-
perie, si fieri contingat, non
diu durant, accidunt enim
illis qui temperata habent
corpora, & neque plenitu-
dine neque cacochymia la-
borant.

Dignoscitur autem cau-
sa ex ipsius intemperaturæ
sensu. calida intemp. caput
reddit calidius: frigida fri-
gidius. siccitas & humidi-
tas dolorem non adferunt.
sed siccitatem comitantur
quandoq. vigiliæ & subinde
falsæ imaginationes quod
melancholicum est. humi-
ditas oblivionem quandoq.
parit & memoriam offen-
dit, veluti non raro & ipsa
frigidity.

Lea. 8. Sept. 15.

Sanguis.

*Curatio capitis doloris ex
sanguine.*

*Capitis dolor qui ex san-
guine*

guine vel solo vel alijs humoribus permixto factus est quandoq. remissior est, quandoque verò vehementior. mitiore cephalalgiam: vehementiorē cephalæam appellat. Cephalæa autem adeo gravis ac vehemens dolor est ut neque ullum strepitū, vel nimium splendore³³ æger perferre queat, cui superveniens febris continua meningum sive membranarum cerebri inflammationem adesse ostendit quam Paulus cerebri³⁴ inflammationē appellat. Dolores quidem continui in cephalæa sunt, sed tamen frequenter per intervalla exacerbationes suas habet, adeo ut ipse æger caput sibi malleo tundi vel frangi vel distendi existimet. ad oculos quoq; ipsos quandoque dolor extenditur.

In utroque dolore³⁵ sanguis mittendus est ex vena brachij media aut exteriorē quā cephalicam aut humerariam vocant, habitatione & virium ægrotan-

33. Non enim solum pericranium sed & meninges afficiuntur.

34. Quin & esse nihil prohibet. cerebrū enim non minus quam Meninges, sua vasa habet, venas inquam, atque arterias, per quas alimentum accipit. omne autem quod alitur etiam inflammari potest, etiam ossa ipsa. rarè tamen id fit, ob frigidam & horum, & illius intemperiem.

35. Non enim fit nisi in corpore repleto sanguine.

36. Nam sæpe dextra vena secta dextram tantum partem leuat. nam dextræ rami demittuntur per dextrā tantum partem, sunt intersepti sepimento à sinistris. Sic cuidam laboranti inflammatione tonsillarum secta dextra vena dextra tonsilla subsedit. altera non prius subsedit quam & à sinistro brachio detractus esset sanguis. R.D.

37. Alvus adstricta semper exacerbat Capitis symptomata. 2. Pro-
rhet. comm. 55.

tis & vehementiæ ipsius doloris. si enim dolor vehemens fuerit & ægroti validæ vires iterata sanguinis detractio ex 3^o altero brachio utilis fuerit. Alvo etiā providendum est, & magnopere curandum ne illa dura sit. convenit itaque illam aliquo enemate etiam sæpius eluere 37 quod feces educet & humores etiam aliquatenus evacuet. quod si verò æger enema admittere recuset exhibendum erit aliquod medicamentū clementer alvum dejiciens ut est infusum rhabarbari cum manna vel cum serapio ex infusione rosarū &c. faciunt verò ad diversionem etiam frictiones & ligaturæ crurum, balnea pedum tum & ea quæ sub pedibus ligantur de quib. ubi de dolore capitis in febribus, dictum est.

Iam & sanguis derivandus est per cucurbitulas circa cervicem vel in dorso positas cum scarificatione si copiosus fuerit. Venas
etiam

etiam in naribus secandas
est qui consulat, vel in fron-
te. Paulus verò etiam venas
sub lingua secare ³⁸ jubet.
spontè autem è narib. san-
guinem profluere bonum
est, nec reprimendus ullo
est modo nisi superfluat.
Continendi autē sunt ægri
in tenebris & in quiete se-
moti ab omni strepitu. Vi-
ctus ratio humida ³⁹ esse &
frigida debet, & in maxi-
mis doloribus tenuis in mi-
tioribus verò dolorib. ple-
nior. A carnibus & ovis in
maximis doloribus est ab-
stinendum. in mitiorib. ve-
rò non usque adeo. Vinum
in neutro admittendū do-
lore. fugienda quoque om-
nia sunt quæ caput imple-
re possunt ut sunt nonnulli
odores, & cerevisiæ. ⁴⁰ Lac
etiam caput dolentibus au-
tore Hipp. malum. Potus
sit aqua hordei, vel aqua
simplex ijs qui illa uti con-
sueverunt, vel tenuissima
omnino cerevisia. Cibus
ptisanæ cremor, vel lactu-
ca, oxalis. intybum aut simi-

38. *Præclicis quidem
ob capitis dolorem re-
nam sub lingua secare
usitatum non est. Ana-
tome tamen id omnino
suadet, aliarum vena-
rum sectione præmissa.*

39. *Quamvis sanguis sit
humidus tamen ratione
caloris excitati à san-
guine humidus sit victus
siccitas enim lima calo-
ris est.*

2. *Sanguinē enim gene-
rant qui dolorem majo-
rem reddit.*

40. *Vel illa ratione quod
augeat sanguinē. in alijs
doloribus prohibetur
quod butyrosæ partes
facile in bilem vertan-
tur. 5. Aph. 64.*

les herbæ decoctæ sicut in curatione ardentes febris dictum est.

Topica remedia fronti ac sincipiti admovenda sunt humectantia ac refrigerantia, talia qualia in dolore capitis ab insolatu. Periculosissimus autem morbus Cephalæa est si superveniat febris. ostendit enim hæc cerebri membranarum inflammationem adesse ut dictum est.

Leç. 9. Sept. 19.

*Curatio capitis doloris
ex bile.*

Bilis.

A bilioso humore capitis dolor mox ab initio vacationem & humorum contemperationem requirit. Venæ sectioni parcendum est, nisi simul cum bile sanguinis redundantis adsint signa & æger venæ sectioni assuetus, annique tempus propitium. quo casu sanguis ex vena humeraria detrahi poterit & præsertim dextri⁴¹ brachij. Inter purgantia admodum familiare est rhabbarum⁴² quod cum decocto herbarum refrigerantium, vel stillatio liquore exhi-

41. Quia sedes bilis in dextro potissimum latere.

42. Quia siccum est valde per se hic non exhibetur.

exhiberi potest. addito vel
 Serap. ex infus. rosarum,
 vel manna. ⁴³ potentius est
 scammonium cū quo com-
 posita diaprūnis & elect. ex
 psyllio, robustis corporibus
 conveniunt. potest verò &
 exhiberi decoctum folio-
 rum ⁴⁴ senæ additis herbis
 refrigerantibus & aliquo
 supra dictorū purgantium.
⁴⁵ Prodesse verò & enema-
 ta possunt qualia in dolore
 cap. ex sanguine. Herbae
 contemperantes sunt lactu-
 ca, intybum, malva, cicho-
 rium, borago, violaria, atq;
 ipsae violariae, & nymphæ
 flores albidī. Serap. con-
 temperantia ex violis, ex
 intybo, ex floribus nym-
 phæ, ex infusione rosa-
 rum, ex cichorio & similia.
 Victus ratio frigida & hu-
 mida esse debet, ut in do-
 lore à sanguine. Aerē verò
 & ipsum refrigerari conve-
 nit per arborū ⁴⁶, & præci-
 puè salicū, viventes ramos,
 gramen recens decerptū &
 aquæ frigidae frequentem
 asperisionem, ut in curatio-

*43. Inter purgantia quæ
 solum habent scammo-
 nium est & el. de succo
 rosar. verum illa ob san-
 talos minium resiccant in
 hoc casu.*

*44. Possunt tanquam
 commune med. ad om-
 nes purgationes adhibe-
 ri, ut Gal. de hiera picra
 dicit adhibitis ijs quæ
 casus requirit. ne autem
 tormina excitent syr.
 addendus.*

*45. Quia in nullo dolo-
 re cap. prodest feces re-
 tineri.*

*46. Quercuum rami non
 sunt inutiles, non tamen
 graveolentes sunt adhi-
 bendi.*

47. Cucurbitilis magis sanguis quam bilis trahitur, frictiones siccant ideo his non utimur hoc casu.

48. Ad retundendam acrimoniam.

49. Nam & hoc dolorem capitis lenit.

50. Ut diutius maneant humida, & retineantur.

51. Quia humectat & lenit.

52. Æstate.

53. Hyeme.

ne feb. ardent. dictū. 47. Naribus infundi vel per ipsas attrahi succus betæ potest aqua tamen hordei admixta⁴⁸, in qua vel violæ vel malva, vel illarum herbarum similes incoctæ sint. Profunt verò & lotiones pedum ex herbis refriger. & humectantibus supra dictis in aqua decoctis. atque huiusmodi decocto & 49 manus lavari & caput rigari utile est. capiti siquidem & quæ refrigerant, ac humectant admovenda etiam sunt. ut prædictarum herbarum decocta vel aquæ destillatæ. possunt verò ex iisdē fieri cataplasmata addito oleo ex violis vel florib. nymphææ, vel unguento ex populo nigra. quæ etiā fronti & temporibus applicari possunt. præsertim addito⁵⁰ ovi albo vel lacte⁵¹ muliebri.

Quod si verò vigiliæ molestæ sint, neque somnus his remedijs succedat, supra dictis herbis addi poterunt folia⁵² aut⁵³ capita papaveris,

is, aut oleis addi aliquot
rana opij, & tantundem
ere croci, ⁵⁴ vel in cremo-
e ptisanæ unum aut alte-
um capitulum incoquen-
lum est. vel omnino somni
empore ꝑ. aut ad sum-
num ꝑ. j. serapij de papave-
e ⁵⁵ sive diacodij exhiben-
lum veluti latius dictum est
ibi de vigilijs in febribus.
omnū enim omnino pro-
vocare refert. illo siquidem
non succedente superveni-
e huic dolori maniam ⁵⁶
valde malum est.

*De ⁵⁷ gravitate cap. ex
pituita.*

Quando autem pituito-
sus frigidus humor caput
aggravat exhibenda sunt
quæ hunc expurgent & per
alvum deducant ut sunt ex
compositis diaphœnicon,
diaturbith, elect. Iudum,
pil. aureæ, cochia, & ex
aloë Gal. omnium * fortif-
simæ. & siquidem gravitas
diuturna fuerit sæpius exhi-
benda hæc sunt sed tamen
in minori quantitate. ad
quod plurimum conducunt

54. Si nimirum capiti
quid apponi ager non
ferat. vel ex cererisia
cui sit capitulum papa-
veris incoctum sorbiti-
uncula cum farina hor-
dei, tritici aut secalis
componi potest.

55. Non est aliud discri-
men quam quod diaco-
dion fiat cum melle. se-
rap. cum saccaro cujus
usum eximium reperit
Dodon. quamvis alij à
diacodio recedere no-
lint.

56. Cui si febris acces-
serit jam phrenitis est.
nihilq; est aliud discri-
minis manie & phreni-
tidis.

lett. 10. Seq. 1. 2c.

57. Est enim magis gra-
vitas quam dolor. non
est mittendus sanguis
quia crudi humores ag-
gravant caput.

* Fortiores pill. illæ de
quibus in Alopecia.

58. Quia cum diutius teneantur in ventriculo ideo trahant è longinquo.

59. Alia med. in minori quantitate data conficiuntur à natura ne quicquam agunt. pil. ob substantiam duram non possunt.

60. Non tantum potentia, sed & actu.

61. Non quotidie. ratione opij quod tuto quotidie exhiberi non potest.

62. Ex ligno cedrino, juniperino & similibus si haberi possunt.

63. Nam succos crudos generant.

pillulæ quæ licet infra dosin exhibitæ alvum tamen movent, quam singulis diebus officio suo fungi maxime refert. Possunt verò & mitiores pillulæ dari ut ex hiera picra vel alephangi-næ dictæ. Intermedijs diebus exhibere convenit quæ calefaciant & resiccent, ut est serap. ex stœchade, conserva florū rosmarini, conserva majoranæ, vel florum betonicæ, rad. enulæ campanæ conditæ. item elect. pleris archonticon. item diambra, diamuscum pro ditioribus. Convenit verò & quandoque nonnihil mithridatij, vel theriaces Andromachi, manè jejuno ventriculo sumere. Aerem verò quo æger utetur ad cal. & sicum mutari conducit, ut hyeme accenso luculento foco. Ab oleribus & fructibus fugacibus abstinendum est. Cibos condiri refert aromatis; vel hyssopo, salvia, thymo, origano & hujuscemodi calidis herbis.

bis. In cibo verò ⁶⁴ & par- ^{64.} Nam carnes habent
cum esse convenit, præfer- ^{ti} humiditas fames debe-
tim cœnæ ⁶⁵ tempore. Vi- ^{tur} Hipp. 7. Aphor. 59.
num ⁶⁶ non admittendū nisi ^{65.} Quoniam cœna po-
tenue admodum. sic nec ^{tissimum} gravatur ca-
cervisia alia quam tenuis. ^{put.}
Aqua decoctionis cinna- ^{66.} Nam humorib. cru-
momi vel seminis anisi cō- ^{dis} caput implent.
ducit. Naribus offerenda ^{Localia.}
sunt odorata & præsertim
melanthij ⁶⁷ sem. tostum & ^{67.} Resiccat potenter.
in nodulo colligatum. Ster- ^{unde} in destillationibus
nutationses quandoque pro- ^{utile.}
vocari utile est pulvere pi- ^{68.} Extrahunt humores
peris vel. veratri albi. man- ^è capite & relinquunt
dere quoque cubebas ⁶⁸ vel ^{qualitatē} qua cerebrum
masticem subinde condu- ^{siccant.}
cit vel rad. pyretri, aut pim- ^{69.} Est Archigenis quem
pinellæ saxifragæ. ^{scivisse} sympathiam esse
^{inter} anum & caput est

Frons verò illinenda & ^{neceffe.} de qua dictum
aurium nariumque meatus ⁱⁿ defludio capill. ex lue
oleo rutaceo vel chamæ- ^{renerea.}
melino, vel nardino vel
consimili calido. Gal. etiam ^{70.} Nā nimia contectio
sedem ⁶⁹ sive anum & pe- ^{attrahit} humores. Eri
dum vestigia oleo rutaceo ^{locandus} æger si totum
quosdam inungere refert. ^{caput} doluerit, supinus:
lib. 2. ^{ἡ ὀπὸς}. Caput quoq; ^{si} autem ex parte, ea
⁷⁰ mediocriter contegen- ^{parte} quæ patitur. miti-
gatur enim quodā blan-
dimento straminum, pars in dolore constituta. Cœl. Au-
rel. l. 1. chron. c. 1.

71. Non nimium odorati. nam omne odoratum gravat caput. 3. Probl. Aristot. 13.

72. Paroptesis etiā adhibenda, inquit Cæl. Aurelianus, ex carbonibus aequali vapore medentibus. l. 1. Tædar.

c. 1. Sed vehemens nimis auxilium nisi prudenter administretur.

73. Tunc enim resiccat: alias humoribus distribuendis magis humectat.

74. In sanitate non est prohibendus assuetis nisi ledat. ut qui parci potus sunt. qui autem multum pro more bibunt ad potum illum digerendum, egent aliquo tempore. aliam causam cur alijs noceret, alijs minimè reperire non potui.

dum est ne à frigore lædatur. conducunt ad hoc faculi cucuphas vulgò nominant, in quibus simul cum gossypio pulveres⁷¹ insuti sunt, nonnullorum calefacientium. ut betonicæ, majoranæ, florum stœchados, florum rorisinarini, seminis anisi, sem. amyos, cardamomi & similium, & si lubet species etiam pleris archontici. ⁷² Somno autem non nimis indulgendum. excitandus sæpius est æger & ad labores, exercitia, deambulationes ducendus est. præsertim corpore⁷³ jejuno. ⁷⁴ Meridianus somnus etiā omnino fugiendus nisi admodum consuetus sit, cui tamen detrahendum quantum possibile. Gravitas autem ista capitis cum somnolentia si in lethargum transeat lethalis est.

De dolore cap. ex melanch. hic nil dicemus nam nisi ratione flatuum dolorem non excitat.

tunc autem melancholia est de qua pòst.

De

De Hemicrania.

IN hemicrania una capitis Lea. II. Sept. 22.
pars tantummodo dolet

dextra videlicet vel sinistra. dolor verò quandoque mitior est. aliquando vehementior, nec cephalæa minor. sic ut nec lucem nec strepitum ager perferre queat. mitiores dolores à causis externis, vel etiam per consensum nō rarò fieri contingit. possunt tamen & ab antecedentibus causis etiam provenire.

Curatio autem huiusmodi doloris est pro causarum efficientium diversitate veluti Cephalææ. Vehementiores dolores ex causis nascuntur antecedentibus. videlicet ab humorū influxu, qui vel sponte sua ad caput ascenderunt, vel per causam aliquam externam attracti sunt. Curatio hujus à sanguinis quoque missione auspicianda. secunda autē est humeralis brachij illius quod è directo est partis dolentis. reliqua deinde

1. Quod frequentius fit. nam si sponte influant in utraq; ut plurimū partem incumbunt. Sic quidam remedijs Cephalææ debitis (eadem enim ferre remed. hemicr. & cephalææ sunt) qui surditatem qua laborabat ab alijs persuasus fumo seu vapore quarundam herbarum per inversum infundibulum in aurē recepto, qui hoc recepto omnes propemodū corporis humoris in caput attraxerat. unde gravissima hemicrania tentabatur.

facienda quæ in curatione
Cephalææ dicta sunt.

*De dolore capitis circa mus-
culum temporalem.*

1. Pauci hunc attingunt
aut potius nulli. Aricen-
na autem hunc nomina-
re videtur sodam tem-
poralem. jubet lanam
succidam & mazam ap-
plicari. per quam intel-
ligo cataplasma ex fa-
rina.

2. Sola tum topica ad-
bibere convenit.

Contingit verò & in al-
tera capitis parte dolorem
fieri non tamen per totam
dimidiam partem sed cir-
ca musculum temporalem
& supra aurem. talis dolor
sæpe initio non magnus est,
sed cum tempore intendi-
tur. pars verò affecta citra
doloris intensiorem con-
tingi nequit, & calor cir-
ca locum affectū sentitur.
adeſt quandoque febris, sed
exigua admodum. & urinæ
aliquando nonnihil rubent.
talis autem affectus est in-
flammatiō musculi tempo-
ralis quæ ferè semper ad
suppurationē convertitur,
pus autē per aurem erum-
pit. In principio hujusce-
modi inflammationis san-
guinem detrahare ex vena
humeraria partis dolentis
utile est. sed suppuratione
facta & pure per aurem ef-
fluente parum prodest.

Pur-

Purgantia etiā med. exhibenda & præsertim pilulæ quales supra dictæ quas etiam per vices sumi expedit non tam purgationis, quam diversionis causa.

Locus dolens mox initio unguendus oleo rosaceo vel cataplasma ei admovendū partim reprimens 3 partim resolvens ut ex farina hordei vel vulgarium fabarum & rosis rubris, floribus chamæmeli, & floribus meliloti in aqua decoctis addito oleo rosaceo & chamæmelino. Quod si dolor huiusmodi cataplasmate non minuatur vel jã diuturnior factus fuerit, applicandum erit cataplas. quod suppurationem adjuvet: ut ex farina hordei, sem. lini & fœnugræci, additis rad. althææ decoctis & cum ipsarum decocto cataplasmate formato, addita axungia porcina vel oleo amygd. dulcium & ung. dialthæas.

Posteaquam verò dolor cessarit & puris fluxus minor factus, addenda sunt

3. Quum non possit sanguis per os repelli.

4. Ne cito resiccetur & nihil efficiat.

5. Omelysis græcis sine epitheto dicitur. omelysis triticea cū farina tritici adhibetur. fit autem nullum cataplasma sine farina. substantia enim ex hac queritur, quam pulti similem habere debet. nulla autem herbae sine farina habere possent.

6. Nondum neglecto cataplasmate cum adhuc possit aliquid circa locum hære quod in pus converti debeat.

L

cataplasmati quæ resiccare, roborare, astringere & nonnihil resolvere queant. ut sunt absinthium, rosæ rubræ, flores chamæmeli, ol. chamæmelinum, unguent. dialthæas.

Posteaquam autem dolor omnino conquieverit & pus per aurem fluere desierit, à cataplasmatibus cessandum, locus tamen à frigore defendendus. Auri aliquando quid infundi potest mellis rosati diluti cum vino. deinde imponi gossypium aut lana succida, imbuta, ol. amygd. dulcium. ne in auribus sordes concrecant quæ auditum impediant.

Victus ratio moderata esse debet, veluti in leviori cap. dolore ex causa calida.

Dolor capitis unam aliquam partem occupans.

Sunt verò & alij capitis dolores qui unam aliquam vel plures partes occupant, sed tamen exiguas sic ut locus dolens pollicis aut digiti

7. Prohibet concreescere
oleum sordes in auribus.

Lection. 12. Sept. 23.

giti extrema parte contegi
 queat. tales contactu de-
 præhenduntur & sæpe cir-
 ca verticem capitis, quan-
 doque etiam circa frontem
 cōsistunt. Causa est humor
 aliquis vitiosus collectus in-
 ter membranam os conte-
 gentem & ipsum capitis os.
 Si materia non fuerit acris
 & mordax valdè, excitatur
 etiam successu temporis tu-
 mores, os verò diuturnitate
 quod subest exeditur & ca-
 riosum efficitur. Vbi verò
 materia valdè acris os etiā
 citò ad tumorem corrumpi-
 tur.

Crebò autē hujuscemodi
 cum ossis corruptione do-
 lores accidentia sunt luis
 venereæ, possunt tamen &
 ex alia causa fieri.

Initio autem generalibus
 præmissis utile est empl. ali-
 qua admoveri loco dolenti
 quæ humorem resolvant ac
 discutiant: ut est empl. ex
 meliloto quod vel solū vel
 addito empl. oxycroceo
 applicari potest.

Et si quidem humor non

1. *Et cutis mollior osse
 non exeditur ob naturā
 humorū. si exedatur os
 sine tumore conferri po-
 test cum meliceride. ta-
 men illa non exedebat
 os.*

2. 13. 14. aut 15. die-
bus continuis.

1. In aph. prodest. dici-
tur quasi tum ex multis
singularibus animadver-
sis regulam constituerit.
quā ante in paucis tan-
tū hoc observasset. Ego
aph. corruptum puto. ut
& alij. sunt enim mea
sententia aph. ex scriptis
Hipp. collect. ab alijs;
non ab Hippocrate quod
& apparet in aph. Au-
tumnus tabidis malus.
cui alibi additur apud
Hipp. & ver quum folia
fici cornicum pedibus si-
milis sunt.

discutiatur nec dolores hoc
remedio cessent, ad alia
transeundum est remedia.
& siquidem os nondum vi-
tium esse videatur utile
erit sudorifica: aliquot die-
bus exhibere ut est deco-
ctum zarzæ perillæ, vel ligni
guajaci.

Vbi verò diuturnitate os
craniij vitiatum fuerit ad
manus opus veniendū erit
& tumor vel locus dolens
aperiendus sectione in cute
facta, & humor vitiosus ex-
purgandus, ossisq; pars ca-
riosa eximenda. Tumore
verò existente magno sta-
tim ad sectionem venien-
dum. Victus ratio modera-
ta esse debet ex cibis boni
succi etiam quo tempore
zarzæ aut ligni decoctum
bibitur.

*Dolor partis posterioris
capitis.*

De dolore posterioris
partis capitis scribit Hipp.
lib. 6. epid. & in aph. sed
non alibi. ait autem sectio-
nem rectæ venæ in fronte
profuisse. Rarum autē est
dolo-

dolorem in occipite fieri & quum fit citius à causa externa quā ab antecedente originem habet, veluti à casu aut percussione. Vbi autem contigerit vel ab hac causa vel ab alia cui sanguis conjunctus est, dolorē fieri, sanguinis missio ex vena frontis per modum revulsionis prodesse poterit. si modo corpus laborantis plethoricū non fuerit. nam repleto corpore prius sanguis è brachio erit detrahendus quam ad hanc localem venæ sectionem veniendum erit. Detrahendus autem erit sanguis ex recta frontis vena, hoc est illa quæ à fronte rectè deorsum descendit versus nasum. quæ confluens ex ijs est quæ utrinque naso adjacent, ut ex anatomicis cognoscere licet. Non sola autem ista venæ sectio prodesse poterit sed & alia facienda quæ doloris postulabit conditio. veluti si abiectum aut percussione adhibenda quoq; quæ ad ictum & per-

cussionem remedia requiruntur.

De Phrenitide.

CAP. 3.

Lea. 13. Sept. 26.

1. Ita sæpe Hipp. appellat. interpretes sæpe desipientiam vertunt, quū possit delirium propriè dici.

2. Meminit Hipp. 12. aph. 1. 7. A peripneumonia phrenitis malum.

3. Aph. 7. 18. Propter vigiliam convulsio aut desipientia malum.

4. 7. Aph. 24. Ab ossis vulnere desipientia, si in vacuum penetraverit. i. ut Gal. ait, si cranio aperto detegantur membranae.

Phrenitis sive delirium duplex est. quædā enim per consensum fit. altera verò cerebro primaria affectione laborante. Per consensum facta paraphrenitis, sive ¹ παρὰ φρεσίν dicitur. & talis ardentibus febrib. aut partium internarum inflammationibus ut pleuritidi vel ² peripneumoniae aut ³ diuturnis vigilijs, aut quandoque ilij doloribus, aut capitis vel quandoque aliarum partium vulneribus, vel etiam ossis aliquo ⁴ insigniter læso supervenit.

Delirare autē sive phrenetici esse agroti tunc dicuntur quando aliena loquuntur, quādo clamitant, vociferantur, irrequieti sunt, vel quando floccos in veste, aut festucas legunt. Futuri autem in febribus vel

vel internarum partium inflammationibus delirij signa sunt vigiliæ, vel in somnia perturbata, & urinæ prius crassæ & rubicundæ postea tenues & albidæ factæ.

Curantur autem hujusmodi, paraphrenitides in febrib. quidem vel propter internarum partium inflammationem factæ, viribus adhuc valentibus per revulsiones. ut per frictiones, ligaturas, cucurbitulas, & per ea quæ sub pedibus ligantur. de quibus in curatione cap. doloris in febribus dictum est.

Quod si autem propter diuturnitatem vigiliarum delirium factum fuerit somnus provocandus erit sicuti in vigilijs quæ febribus accidunt, & veluti in curatione dol. cap. à bilioso humore dictum est.

Ex alijs verò occasionib. deliria supervenientia curari convenit pro conditione affectuum ad quos consequuntur.

5. Signum enim est quod materia rapiatur ad caput. Si ante judicationem super-

Paraphrenitis. veniant, sine dubio deli-

rium significant. Si autem post judicationem urinæ alba multa, significant sordes retineri quas ad caput raptum iri verisimile post judicationem non est, sed circa viscera hepar aut alibi harere possunt. Hipp.

in epid. Xenophanem & Critiam dysentericos post judicationem hac apparente factos, refert.

6. *Ab ileo vomitus, & singultus, & desipientia, & convulsio malum.* lib. 7. aph. 10.

7. *A sanguinis profusione delirium aut convulsio malum.* 7. aph. 9.

8. *Propter plagam in capite stupor aut delirium, malum.* 7. aph. 14. *Fit etiam ex multa potione.* 7. aph. 7. *Ex multa potione rigor & delirium malum. Quidam ita mutus factus ex plenitudine videlicet phlebotomia vocem recepit.*

Phrenitis.

9. *Non est tamen possibile quin ipsa cerebri substantia etiam calore præter, naturali incalescat.* 1. *Prorhet. comm. antipenultimo.*

10. *Quod licet permixtus sit humor melanch. humorib. capitis non tamen tumorem aut inflammationem alicujus partis excitarit quæ nunquam sine febre est.*

Interim deliria sive paraphrenitides quæ propter magnos dolores fiunt veluti⁶ ilij, vel magnas⁷ sanguinis profusiones, vel alias immoderatas vacuationes consequuntur, vel capitis⁸ aut aliarum partium gravibus vulnerib. superveniunt lethalia habentur virib. jam dejectis ac debilitatis. Sed quæ in febrium & nonnullo⁹ morborum initijs fiunt viribus ægroti adhuc valentibus minus periculosa sunt.

Phrenitis autem quæ cerebri humani affectio est, membranarū ejus inflammatio⁹ est. non tamen pura, sed erysipelatodes. neq; enim ex sanguine solo, sed ex sanguine bili permixto originem habet. differt verò à mania quod hæc absq; febre fiat, phrenitis verò febrē habeat conjunctam, eamque continuam & ardentem.

Est autem inter phrenitides quædam mitior leviter tantummodo mentem per-

permovens: aliæ vehementiores pro conditione videlicet & qualitate bilis. tenuis siquidem bilis ac¹¹ pallidior mitiorem parit phrenitidem. à flava sive ruffa bile malignior ac vehementior fit. quæ verò ex bile ruffa, adeo præaffata ut ferè in nigram degenerarit, gravissima est, & ferinam quandam dementiam conjunctā habet¹², sic ut coerceri ægroti debeant.

Acutissimus autem & periculosissimus affectus phrenitis est, ¹³quem nō solū acuta febris aut inquietudo comitatur, sed adsunt quoque capitis dolores, vigiliæ, aut insomnia admodum turbulenta, linguæ asperitas, sitis inexhausta, oculi subinde sunt terribiles, venæ illorum rubent, quandoque sponte illachri- mant, vel læmis gravantur. ¹⁴sanguis etiam aliquando è naribus stillat.

In urinis autem & dejectionibus frequenter febris nulla signa apparent. quod

11. Quæ quodammodo est tenuior pars sanguinis.

12. Vbi deferbuit melancholicus succus in melancholiam facile transit phrenitis.

13. Difficillimæ phrenitides in abortientibus. 3. Epid. 3. sect. Ægyptū quotānis invadunt Phrenitides quæ paucis, duabus, tribusvè horis perimunt. Prosper. Alpin. de med. Ægypt. c. 14. Lect. 14. Sept. 27.

14. Quod est signum magni fervoris in capite. neq; enim ob copiam erumpit, sed calore re-
refactus ebullit.

L 5

15. *Quum anterior pars afficitur cerebri, non posterior in qua memoria, ea integra manet quod liquet ex versib. & can-tilenis quas recitant.*

16. *Hæc enim vel si-
maximè sese jactitent
tum empl. echecollo seu
glutinoso, tum ligatura,
sic obturari seu occludi
potest, ut à sanguinis
prorruptione metuendum
non sit.*

17. *Quod humores con-
turbet & vires dejiciat.
morbo satis affligas.*

tamen valde malum Hipp.
affirmat. læditur autem sub-
inde imaginatio tantum-
modo, quandoque sola ra-
tiocinatio, aliquando verò
utraq; facultas, ut Gal. 4.
de locis affectis exemplis
ostendit¹⁵.

Curatio autem phreniti-
dis à sanguinis missione ini-
tium habere debet. ex bra-
chio revulsio facienda; ex
vena frontis derivatio.

Secunda autem erit vena
media ex Aetij præcepto si
adsit sanguinis redundan-
tia. illa non præfente, ex hu-
merarijs sanguis ducendus.
Quod si ex brachio com-
mode fieri nequeat propter
magnam ægri inquietudi-
nem, tunc, inquit Paulus, ex
frontis vena tantum aufe-
rendum quantū satis erit¹⁶.

A sanguinis missione in-
jicienda sunt enemata emol-
lientia ac lenientia. vel illo-
rū loco aliquod leviter al-
vum deducens & simul al-
terans exhibendum. quale
est serap. ex rosis aut ex vio-
lis, fortiora med.¹⁷ fugien-
da

da sunt. Diversiones etiam
leves faciendæ sunt per fri-
ctiones, per pedum & ma-
num balnea, ut aliquo mo-
do humores deorsum re-
vellantur. Continendus æger
in quiete¹⁸ & ab omni cor-
poris motu arcendus, & in
loco quidem continendus
nec obscuro nec nimium
lucido ab omnibus picturis
libero. non calido, nec ta-
men omnino frig. sed mo-
deratè frigido¹⁹. Victus te-
nuis refrigerans & hume-
ctans. potus aqua hordei.
²⁰ cibus ptisanæ cremor, aut
panis ex aqua, vel lactucæ
vel cucurbitarum aut pe-
ponum carnes coctæ &c.

A frigida aquæ potione
omnino abstinendum est.
Somnis²¹ provocandus est
vel odoribus, vel unctioni-
bus ut ex oleo violarum.
nymphææ, unguento ex po-
pulo naribus & temporibus
admotis, vel capitulis papa-
veris sorbitioni incoctis ut
in curatione cap. dol. ex
hile dictum. à multo ta-
men narcoticorum usu

¹⁸. *Motus enim acriores
humores reddit.*

¹⁹. *Quod inflammatio-
nes non solum repelli,
sed aliquo modo etiam
simul discuti, necessum
sit.*

²⁰. *Paulus potiones ali-
quot ex melle habet
quod quum facile in bi-
lem vertatur posteri hac
reprobarunt. potest re-
ro aquæ hordei in fine
decoctionis aliquid syr.
rosati addi. ita boni sa-
poris fuerit.*

²¹. *Phreniticos somnus
sanat. Plin. 26. c. 11.
Omnib. phrenitide affe-
ctis somnus & difficilis,
& præcipuè necessarius
est. sub hoc enim pleri-
que sanescunt. Cels. l. 3.
cap. 18.*

abstinendum est præsertim quum longior factus fuerit morbus.

22. *Quod nec inflammatio, nec pars princeps valde frigida ferat.*

23. *In Heræa Arcadiæ vites sunt ex quib. vinum sanam mentem aufert atque ecphronas seu dementes Arcadas; fœminas verò sæcundas reddit. Ælian. l. 13. variæ histor.*

Inter localia med. laudatur oleum rosaceum, vel oxyrhodinum quo frons & futura coronalis inungenda est, non tamen frigidior, sed ætate tepido. hyeme verò calido. cui in progressu morbi oleum chamæmel. vel anethinum admiscendum erit.

Vbi autem delirium cessaverit, vires reficiendæ & idonea victus ratione reparandæ sunt. & tenue, aquosum, dilutumq; vinum concedendum.

Cavere interim debet æger ab ebrietate, ira, à solis æstu, à nimijs laborib. & ciborum corruptione.

Erysipelas Cerebri.

C A P. 4.

LeA. 15. Sept. 29.

AD phrenitidem quoque referendum est quod erysipelas cerebri à Paulo appellatur nam & in hac affectione ægroti desipiunt

piunt & aliena loquuntur.
caput universum dolet ac
frequenter etiam calet. fa-
cie tamen sæpenumero pal-
lent. os siccum est & lin-
gua nigra & valde aspera,
febris adest lenta in qua
etiam exteriora frigent. in
urina nullæ apparent febris
notæ. Est autem hic affe-
ctus non tam cerebri quam
membranarum ejus prima-
rius morbus, qui à sola &
puriori tenui bile gignitur.
Periculosus verò ac diffici-
lis hic morbus est. germa-
ni dē bruyñ appellant, non
nulli latinè morbum Hun-
garicum. Initium curatio-
nis fit per sanguinis missio-
nem non tamen copiosam;
neque ex brachio, sed ex
venis tantummodo sub lin-
gua per quas & revulsio &
derivatio humoris fit. Al-
vum lubricam esse conve-
nit. itaq; si non sponte pro-
fluat adjuvanda erit.

Victus ratio frigida quo-
que ac humectans esse de-
bet. arcendus autem est
aeger non modo à frigida

1. Imò etiam frigent.
Paulus. ob caloris in-
trorsum retractionem.

2. Per med. non potest
trahi materia quod id
nimis forte foret si ex
cerebro trahere posset.

3. Si somnus provocandus provocantia sint valde tenuia nam narcotica nocent.

4. Quod Vng. populeum Officinis dicitur.

potione, sed etiam ob aere frigidiorē, ne erysipelas introrsum reperiatur. Linguae verò & ea adhibenda quæ in febribus ardentibus adversus linguae asperitatē dicta sunt. Fronti verò ac temporib. ol. viol. aut nymphaeae illiniri potest: vel cū lacte muliebri calide 3 apponi. addito quandoque ung. ex populo nigra⁴. Narcotica med. & hic fugienda sunt.

Erysipelas Faciei.

CAP. 5.

1. Vel natura quod primum est expellente; vel natura propter vulnus, etiamsi magnum non sit attractam.

Est verò & aliud erysipelas quod extrinsecus & praesertim in facie exoritur. rubet autē & tumet facies, cutis ejus tensa levis ac relucens apparet. erumpunt etiam quandoq. exiguae vesiculæ. in declinatione laxiore facta cute albidæ quædam ac tenues instar furfurū decidunt squamulæ. In hujuscemodi autem erysipelate sanguis, ut inquit Gal. nō necessario mittitur.

tur, sed ventrem per inferiora purgare sufficit med. quod flavam bilem ducat.

2. Si tamen erysipelas, phlegmonodes esset sanguinem quoque mittere utile foret.

Localia autem med. faciei adhibere oportet quæ non

repercutiant, ac non multum refrigerent, sed temperata quæ discutiant ac digerendi vim habeant, ut est

lactis serum in quo fumus terræ & nonnihil chelidonix sint incocta. cuiusmodi decoctum sæpius adinoveri

convenit, telis etiam lineis in hoc madefactis superpositis tepidis aut calentibus.

Summopere cavendum est ne frigidum aliquod admoveatur & ne frigidus quidem aër admittatur. per

frigus enim erys. introvertitur quod lethale esse Hipp. in Coac. ait. Signum autem quod introversum sit

erysip. est, quod desinente faciei rubore difficilior

tantummodo dicitur. unde magis confirmor aph. non ab Hipp. editos. est autem revera lethale.

2. Vidi med. forti quale diaprunis est uno die subsedisse tumorem eaq; fortibus adhiberi possunt. mobilis enim propter tenuitatem & calorem humor est; ideoq; vel ex remotis partibus, facillimè versus alvum retrahitur.

3. Si adsit tumor ac rubor magnus; ac signa redundantis sanguinis ad sint.

3. Vid. interfectos imposito succo plataginis quæ astringit. Gal. utitur frig. non tamen astringentib. verum neque frigida nostra corpora ferunt. cui illicum Nutritum in phrenitim cum periculo devenit.

4. Quæ frigida est herba quando viridis existit, & leviter discutit.

5. 6. Aph. 25. Malum

6. *Materia ad pulmones & cor delata. Quod si ad Cerebrū ejusq. membranas repellatur Phrenitis, & Convulsio succedunt.*

reddita sit respiratio. Vitus ratio in hoc affectu qualis in superiore, sed tamē minus tenuis esse debet.

Erysipelas crurum aut aliarum partium.

CAP. 6.

1. *Estque crisis ac terminatio febris. Fit & per se, maximè in sexu fæmineo. in quib. ichores sæpè miscētur aquei. tumq; Erysipelas album vocare solent mulierculæ. nos Oedematodes appellare possemus.*

Contingit verò & aliquando erysip. & in alia corporis parte ut in cruribus fieri & frequentiss. post aliquot dierum febre. sed neque tali refrigerantia adhibenda sunt, sed tēperata & aliquo modo discutientia. veluti supra dictum. Vel serum lactis solum. Fiunt autē hujusmodi erysipelata à natura quod pravum est expellente, veluti in crisi, atque idcirco nullo modo repercutiendum.

Lea. 16. Sept. 30.

1. *Quare neque acutus morbus, ut phrenitis est. De mania per consensum non dicitur. quod illa nisi in morbis febrilibus non oriatur.*

De Mania.

CAP. 7.

Mania insania est & delirium absque febre in quo, ut dictum est, à phre-

phrenitide differt. Causa quandoque est biliosus humor sanguini permixtus ad cerebrum perlatus: quandoque capitis vehementes ex bile dolores: vel vigiliæ: vel labores: vel etiam inedia. Biliosus autem humor aliquando mitior, aliquando malignior, ut supra dictum est; sic & mania quædam minus vehemens est & quandoque cum risu; alia verò vehementior, veluti quæ à bile ruffa affata gignitur, omnium autem gravissima est ac molestissima quæ à melancholico humore præaffato ac adusto originem habet. præsertim si talis humor multus ac copiosus fuerit. sævissima siquidem & maximè ferina mania ab hoc procedit, quæ & sæpe diuturna ac curationi rebellis evadit, cum qua & frequenter malignos spiritus commisceri contingit. Transit verò mania quandoq. in melancholiam quando videlicet biliosus humor affari de-

2. Quod non solū Christiani sed & Iulius Firaeus scribit. Agrippa nullos facilius à demonibus obsideri quam melancholicos.

M

3. *Furiosi non dormiunt propter perpetuā mentis agitationē, qui quum in alia ex alijs jugiter cogitando transiliant torvè impu lenterque aspiciunt, sicut insonnes dracones. Philostr. l. 2. de vita Apoll. Erga medicum potissimum exacerbari maligni ac lethalis morbi inditium est. Lucian. in abdicatione.*

4. *Non detrahendum donec viderimus sanguinis redundantis signa. sunt qui nullo modo secari volunt. verum hoc probandū non est. quum sanguis una cum pravis humoribus peccet.*

si erit. & jam calor defuerit, quod quidem quum non multus fuerit vitiosus humor citius accidit, quàm quum copiosus. Differt autem mania, à melancholia accidentium magnitudine & sèvitia. nam in mania adest vel multiloquium, vel clamores, motus & jactatio corporis in ordinata, temeraria audacia, aspectus torvus & inverecundus. In melancholia verò metus aut tristitia absque causa, taciturnitas, & quandoque amor solitudinis.

Curatio autē maniae initio quidem quum per se incipit & redundantis signa sanguinis adsint fit per sanguinis è dextri brachij vena detractionē. sed si post diuturnas vigilias, labores, vel inedia supervenerit sanguinis detractioni parcendum erit.

Somnus verò omnibus modis in utroque casu provocandus. deinde & reliqua facienda quæ in curatione capitis doloris à bile, & in

& in curatione phrenitidis dicta sunt.

Quando autem mania aliquandiu duraverit curatione instituenda est qualis in melancholia. de qua suo loco.

5. Mandandum ministris ut eorum errores quodam consensu accipientes corrigant, ne aut omnibus consentiendo augeant furorem eorum visa confirmantes; aut rursum repugnando asperant passionis augmentum; sed inductivè nunc indulgeant consentientes, nunc insinuando corrigant vana, recta demonstrantes. Cael. Aur. l. tædar. c. de Mania.

De Caro.

CAP. 8.

Lea. 17. Orob. 6.

CAros, sive subeth profundus, est sopor cum sensuum & motus cessatione, illæsa permanente respiratione absque febre. in quo à lethargo & cataphora differt. nam Cataphora febrib. supervenit. Lethargus verò febrem habet ab initio conjunctam. Differt verò & ab apoplexi quod respiratio libera sit & non impedita. in apoplexi enim respiratio læditur ac impeditur. deinde per apoplexin membrū aliquod, vel pars

1. Sequitur ut de morbis ex causis frigidis capitis agamus. Quidam & Coma appellant verum generalius. nā Carus coma somnolentum: Catochus vigilans.

2. Atque per hoc à naturali differt. ac sopor quid magis quā somnus videtur. Unde virg. Tum consanguineus lethi sopor.

3. De qua egimus quum de sympt. febrium agemus.

M 2

4. *Vt quandoque vidi solos oculorum musculos resolutos, vel etiam musculos masseteres.*

5. *Post vigilias ac labores diuturnos, vel in senectute extincto calore naturali cum pulsus parvitate, & est signum lethale.*

6. *Rarum quidem est. vidi tamen & curavi. R.D.*

corporis + resolvitur: in caro verò nulla pars. Differt verò etiā à Catocho quod catocho laborantes oculos habeant apertos, & vigilantib. similes appareant: in Caro verò oculi sunt clausi sicuti dormientium. Accidit autem Carus quandoq; per consensum à vaporibus ad cerebrū perlatis. quandoq; verò propter nimiam cerebri refrigerationem, quæ fit vel citra humorum affluxum, vel cum humorum affluentia. Accidit autem & carus cranio contuso, vel sic percusso ut cerebrum vel meninges lædantur. Supervenit verò & aliquando carus à virium imbecillitate.

Per consensum fit carus veluti ab ebrietate propter vapores ad cerebrum perlatis. aliquando verò propter vermes, ut in pueris, ex humoribus putridis generatos, præsertim frigidis ac pituitosis, unde vapores ad cerebrum crassi ac frigidi perferuntur. Fit & verò & non-

nonnunquã carus per consensum mulieribus ex uterò laborantibus.

Refrigeratur autem cerebrum & quidem citra humorum affluxum per narcotica med. vel intro assumpta, vel foris applicata: ut sunt opium, mandragoras, hyosciamus, cicuta, coriandrum recens & similia, quæ intro assumpta gravem soporem adducunt, & similiter cum oleis, unguentis aut cataplas. permixta capiti temporibusque admota. & nonnunquã etiam ex solo & frequenti odore. Potest verò & cerebrũ refrigerari à frigido aëre ventoso vel nivoso, & vel simili de causa. Quum affluxu autem humorũ refrigeratur cerebrum quando ad caput multi pituitosi frigidi humores perferuntur, atq; hinc factus carus facile in lethargum transit. quando videlicet humores putrescunt & febris accedit.

7. *Non statim, sed diuturnitate.*

8. *Veluti si quis frigidam multã aquam frequenter infunderet capiti.*

Curatio.

Ad Carum autẽ ab ebrietate non prius remedium

M 3

9. Nisi fortè placeat, aut necessum sit, remediū quod *Amphis* apud *Athenæum* probat: nempe tristitiam incutere. ἐξελκύνει γὰρ σφόδρα λήρησ &c. 1. *Dipnosoph.* in fine.

10. Pulsus est magnus, & menses sistuntur.

Lect. 18. Octob. 16.

11. Difficile est enim aliquem excitare antequā concoquatur. Quod exemplo mulieris quam *Mescliniæ* vehementer

adhibendum quam præterierit tempus quo ebrietas solvi solet. atque si tunc patiens nō expergefiat concutiendus & agitandus est, sternutatioque provocanda aliaque facienda quæ infra dicentur.

Si ex vermib. factus carus fuerit adhibenda erunt quæ adversus eos conducunt. excitato tamen prius puero. nisi sint quæ ventriculi regioni vel umbilico admoventur. quæ etiā puero sopore detento applicari possunt.

Ab utero autem si carus factus fuerit adsunt repletionis signa 10 & facies rubet. ac in isto casu si, quæ ab utero laborantib. adhiberi solent, non profuērint, sanguinem ex vena pedis interiore detrahare multū prodest.

Si ab usu narcoticorum & stupefacientium in carū quis inciderit & tēpus præterierit intra quod narcotica concocta esse potuissent 11 temporibus ac fronti admo-

admovenda erunt exalfacientia ut oleum de euphorbio, de castorio, de piperibus rutaceum, vel simile aliquod. Narib. etiam admovēda odorata calida ut calamamentum in aceto decoctum, crocus cum aceto acerrimo. Aceti etiam vapor ac fumus per nares receptus aut attractus multum excitat, & somnolentiam expellit. Excitatur fumus quādo super laminam vel lapidem acetum funditur. 12. *Quamvis meliora fumus aceti & reliqua precedentia.*

13. *In qua ris opij jam fermentatione non ita elucet.*

14. *Exactius enim anus sentit quam reliqua omnia intestina. Tum si mandrogora siccus in balano suppositus hypnoti-*

ma supposita 14. Quod si

pnoticus est & somnum inducit, quid contrariæ facultatis remediū .ano submissum dormientem præter naturam excitare poterit.

hoc modo patiens excitari nequeat de vitæ agitur periculo.

Vbi autem excitatus fuerit sunt nonnulli qui putent provocandum esse vomitum ut narcoticum assumptum rejiceretur: vel ad minus enema injiciendum ut deorsum pertrahi posset. sed frustra hoc fit quando tamdiu narcoticum in corpore hæserit, ut concoqui potuerit. quia posteaquam jam concoctum fuerit à natura superatum & evictum nocendi vires amisit. possunt tamen nihilominus exhiberi calefacientia ut vinum generosum¹⁵, piper¹⁶, & compositiones ex pipere, theriaca vetus cum aliquot granis¹⁷ castorij. convenit verò & sinapeos ac nasturtij usus, quæ dantur ut si aliqua mala qualitas à narcoticis relicta fuerit emendetur & corrigatur.

Quod si verò à sola frigidityte cerebri carus supervenerit velut à frigido aëre vel simili causa externa,

15. *Præcipuè contra cicutam valet.*

16. *Maximè contra hyosciamum, papaver & reliqua.*

17. *Quod præstans ad omnia narcotica remedium.*

na, utilis quoque erit calidorum oleorū & unguentorum usus, sed ab aceto abstinendum.

Conveniunt verò & fomenta sicca veluti ex milio¹⁸ & panico in sartagine munda frixis, capiti admotis.

Quādo verò capite multis frig. humoribus impleto carus factus fuerit, ut quam minimū æger dormire permittatur omnino expedit. Corpus vacuandum est, & omnino ijs remedijs utendum quibus in capitis dolore ex frig. humorib. contracto. neque cessandum est à remediorum illorum usu.

A¹⁹ contusione autem cranij carus aut propter vulnera capitis factus requirit ut benè vulneri aut contusioni consulatur. Carus autem hinc factus subesse magnum indicat periculum & meninges cerebri læsas aut cerebrum ipsum sphacelo laborare.

A virium autem debili-

18. Aut ejus loco semen phalaridis vulgo canarij-fact. his fomentis quendam curavit. R.D.

19. Memini 4. aut 5. sic mortuos leviter vulneratos. ita tamen quod membrana cranium tegens & pars ossis essent læsa; interior enim pars ossis porosa. unde facile frigus penetrat ad interiora.

20. In primis enim accessionibus est morbus acutus ut ait Celsus. nihil tentandum, quod natura tum se colligat.

21. Sic quendam Antverpiæ & quandā Mechliniæ mortuam fuisse vidit Dodon. remedia producant sed non restituant vitam.

tate propter corporis defatigationem ab exercitatione aut vigilijs aut vacuationem aut à morbi comitialis accessione si gravior aut profundior sopor obrepit periculo caret. nam ab exercitationib. aut vigilijs subinde longior somnus succedit. Si verò propter caloris naturalis paucitatem vires debiles fuerint ut valde senibus contingit, tunc gravis sopor imminere vitæ exitum ostendit. neque datur occasio multa tentandi aut faciendi propter virium debilitatem nisi quis velit theriacen cum aqua vitæ rectificata, vel aquam vitæ solam ori infundere, & ex eadem tempora & nares illinire, aut aliquo oleo ex prædictis tempora inungere.

De Lethargo.

CAP. 9.

LeA. 19. Orob. II.

Lethargus quem Latini Veternum appellant, gravis & altus etiam sopor cum

cum febre, non tamē acuta, sed lenta. Cessant in hac affectione principes animæ functiones imaginatio, ratiocinatio, & memoria. corpus segne est. facies sæpe pallet. extrema refrigerantur. Decubitus est supinus. urina sponte ignorantibus effluit. & quum moriturus est, inquit, Hipp. multum liquidum infernè egerit.

Duplex autem est lethargi origo, ut Archigenes, apud Aëtiū refert. Vel enim septum transversum & viscera malè affecta cerebrū per consensum afficiunt, vel cerebrum primaria affectione laborat. Et incidit quidem primaria affectio vel statim & ab initio, vel ex alterius morbi + mutatione succedit: veluti à phrenitide quando per stupefaciētia medicamēta nimis refrigerati sunt ægrotantes. tunc enim transitus fit ad lethargum. Læditur autem in primaria affectione cerebrum, non quidem

1. Humorib. putrescentibus. non autem putrescit humor in parte principe ut febris non succedat. in parte tamen ignobili potest.

2. Quia significat naturalium facultatū extremam debilitatem.

3. Quomodo hæc distinguenda non reperi, sed curatio ostendit. soli enim sanari videntur qui per consensum laborarunt.

4. Contrarij β. ut ex erysipel. cerebri vel phrenitide. nam si ex caro succedat non est ita periculosum.

5. Nam si ij afficerentur apoplexis fieret.

6. Non omnes consentiunt. verum quum in eo consentiant quod med. omnia fronti sint adhibenda & anteriora affici concedant oportet. Vidi præterea lethargicam cui cum caput post mortem dissectum esset anterior cerebri pars erat corrupta. R. Dodon.

7. Verum non probatur omnib. quia videtur sensisse non posse humores nisi in tumore putrescere. tamen contrarium in tabidis quibus sine tumore putrescit, videmus. concedi tum hoc Avic. potest quum non faciat ad curationem.

8. Eosque solos curari videtur indicare. ac si ex

humida peripneumonia fiat paucam spem superesse ait Hipp. nisi suppurati fiant. multò minus igitur in primaria affectione.

secundum ventriculos, sed secundum suam propriam substantiam, & quidem cerebri pars anterior.

Origo autem ejus quando ab initio invasit ex frigidum. pituitoso est humore corrupto ac putrescente. Avicenna tumorem esse vult œdematis & partim inflammationis naturam referentem .i. esse œdema phlegmonodes ex pituita parte plurima, & sanguine collectum.

De lethargo autem per consensum facto videtur scripsisse Hipp. in lib. de Coacis prænotionib. Quicunque ait, ex lethargicis servantur plerunque pectore suppurati fiunt. nam idcirco suppurati fiunt quod circa septum transversum & præcordia affectio constitit.

Gravis autem & acutus

• morb.

• morb. lethargus est. nam, ut Hipp. in lib. de morb. Lethargicus in 7. diebus moritur, si verò hos effugerit, sanus evadit. lethalis autem & quidem citissimè est qui ex alterius morbi permutatione per stupefactionem ac nimium refrigerium factus est.

Quando igitur lethargus non ex alterius morbi permutatione successit, sed per se incepta tentanda erit curatio¹⁰, per venæ sectionem si vires permittant. sunt & injicienda acria enemata¹¹ in quibus hiera diacolocyn vel similes compositiones addendæ. Cucurbitulæ etiā humeris ac lumbis admovendæ & sanguis extrahendus. Frons & tempora oleis calefacientibus ungenda sunt ut in caro à narcoticis facta, vel cum oxyrhodino¹² addito castoreo. castoreum verò & naribus admoveendum. idem quoque trandum, valde autem commodat castoreum in hoc casu.

9. Gal. 1. epid. sect. 3.

in fine; in definit. Cæl.

Aurel. & Herod. itaque

in l. qui Medic. inscribi-

tur, quum inter chroni-

cos recenset Lethargum

roce hac improprie est

usus. Magis plus Le-

thargici quam phreniti-

ci periclitantur. nam

phrenitici plus gravati

lethargicos faciunt: le-

thargici verò relevati in

phreniticos revocantur.

Theod. Priscian. 2. lo-

gici. c. 3. Ut lethargicus

quum sit pugil, & medi-

cum urget.

10. Propter morbi mag-

nitudinem, febrem, &

quod nulla vacuatio

promptius tollat humo-

rem peccantem.

11. Non semel, sed sæpe.

ad revulsionē. non enim

fit nisi ex multitudine

humorum.

12. Paulus tostum vult

ad moveri quod tenuius

ita reddatur ad pene-

casu.

ori, si fieri potuerit, infundendum cum aqua pulegij; vel sinapeos semen tritum cum melle.

13. *Phenignus, qui ex alto trahit humores.*

14. *Incidit ac attenuat crassos ac frig. humores.*

15. *Ob humorem multum. & morbum brevem. ptisana frigidior quam ut hic conveniat.*

16. *Satis calidum & expurgat pectus.*

17. *Motus animi in avaris per affusionem nummularum, ut Horat. refert. aut corporis, ut ab iclib. à phrenitico illatis, de quo versus in Authologico extant, convenit.*

Itis non proficientib. pili capitis abradendi erunt. & applicanda calida fomenta ex milio & sale, vel cataplasma¹³ ex stercore columbino cum oleo rutaceo aut simili aliquo. aut cataplasma ex euphorbio, castoreo, pipere, semine rutæ, semine sinapeos cum eodem aut simili oleo. Si æger assumere aliquid potuerit detur ei¹⁴ oxymeli per se vel cum oxymelite scyllitico.

Parcè autem ac modicè cibandus¹⁵ est. & sufficit jus pulli gallinacei in quo rosmarinus, thymus, hyssopus vel similes herbæ incoqui poterunt. Si ad sanitatem morbus inclinaverit largius cibandus erit, & pro potu¹⁶ hydromeli exhibendum¹⁷.

De

REMBERTI DODONÆI,
De Carcho.

191

CAP. 10.

CARO aut lethargo simili- *Lect. 20. Octob. 13.*
lis esset: catochus nisi *1. Non tam rarus est af-*
oculi non clausi sed aperti *fectus quam lethargus*
permanerent qua de causa *aut carus.*
& coma vigilans dicitur; à
nonnullis etiam Catalepsis
sive deprehensio. in ea enim
qua apprehensus est figura
ager permanet, nullâ cor-
poris partem movens. hac *2. Est enim Imaginatri-*
enim affectione correpti: *cis veluti quædam para-*
motu & sensu privantur. in- *lysis. l. de differ. sym-*
terrogati non respondent. *ptom. Condiscipulus ta-*
palpebras habent apertas, *men ille Gal. cujus sect.*
oculos fixos, & penitus im- *2. Prophet. 1. aph. 59.*
mobiles, sic ut & ad mota *meminit obscure se au-*
manu non claudantur. subi- *dire correptum dicebat.*
to autem invadit & quan- *quorundam meminerat.*
doque in febrium intermit- *sed nec linguam, nec ul-*
tentium accessionib. ut in *lam aliam partem mo-*
anis non exquisitis. *vere poterat.*
Quandoq; verò sine fe- *3. Quia subito ventricu-*
bre apprehēdit & per se in- *licerebri posteriores hu-*
cipit. Periculosus est mor- *more aut vapore im-*
bus, & quàm lethargus, ut *plentur.*
inquit Aëtius, periculosior. *4. Vt in adolescente illo*
Causa, ut idem Aëtius *qui à triduo paroxys-*
ait, sanguinis est multitudo *mo hæmorrhagia succe-*
confertim caput occupans *dente liberatus est.*

5. *Quod aliquo modo vigilare videantur. vigilie autem ex siccitate.*

6. *Quod inde liquet quia nullorū meminerunt quæ circa ipsos facta sunt. Catochus enim condiscipuli Galen. fortè minoris vehementiæ fuit.*

& ipsum superimplens. Paulus causam ad pituitam refert, bilem ipsam superantem, & ad humorem frigidiorē & sicciorē quam is sit ex quo carus oritur. & quando ab hujuscemodi humore posterior cerebri ventriculus obstruitur ubi memoriae sedes, tunc catochum excitari ait. non fit tamē ex pituita sola, sed etiā ex pituita sanguini permixta. neque etiam semper ab humore, sed quandoque ab ipsis vaporibus eo perlatis. atque ita in febribus fieri contingit, in quib. tempore accessionis vel paulo post catochus supervenit & una cum declinatione desinit.

Quando igitur catochus una cum febris accessione apprehendit pulsus sæpe numero parvi & languidi sunt. Durante autem ipsa accessione frictiones, ligaturæ & similes diversiones faciendæ sunt. ab alijs verò remedijs donec febris accessio præterierit abstinendum.

Die

Die verò intermissionis præsentibus plenitudinis & sanguinis redundantis signis, sanguis mox detrahendus erit, vel illis non apparentibus. purgans medicamentum exhibendum quod pituitosos expurgat humores, neque ab alterutro remed. cessandum. nam si subsequente accessione catochus iterum redierit valde lethale habendum. non posse enim naturam, per febrem præsertim debilitatam, hujus affectionis vim bis sustinere apparet.

Vacuationibus factis reliqua curatio instituenda quam febris cui supervenit postulabit.

Quod si verò citra febrem catochus subito aliquè invaserit corpore existente repleto, vel non omnino extenuato, mox sanguis pro viriù robore educendus erit citra cessationem.

Deinde acria enemata injicienda. & ubi æger ad se redierit humores præpa-

7. Quod facile animadvertitur. nam 1. accessione non invadit sed quando sibi jam quandoque restituti videntur post hebdomadas duas aut tres.

N

randi & amplius vacuandi sunt & victus ratio instituenda, veluti in curatione doloris & gravedinis capitis à frig. humoribus.

Si autem Catochus citra febrem supervenerit macilento alicui gracili & extenuato, præsertim seni, aut decrepito, sola sufficiunt quæ caput calfacere & calidis vaporibus implere & frigidos discutere queant. ut sunt aqua vitæ rectificata & deficiente illa aqua lavendulæ vel pulegij cū the-

3. *Qui multum facit ad confortationē capitis.* riacæ veteri aut^r croco, aut simili aliquo.

De Memoria læsa.

CAP. II.

Lea. 21. Octob. 14.

1. Morbi de quibus jam dictum circa cogitatricem ac imaginatricem memoriæ partē fuerunt.

Memoria læsa: aut deperdita dicitur quando quis nō recordatur eorum quæ memoriam. Non aliud æquè fragile in homine quam memoria morborum, & casus injuriarum, atque etiam metus sentiens, alias particulatim, alias universa. ictus lapide oblitus est literas tantū. Plin. l. 7. c. 20. Valer. maxim. l. 1. c. 6. Messala Corvinus post morbum proprii nominis oblivione percussus est. Solin. c. 6.

ram

rum quæ sibi antea nota fuerunt. Accidit autem hoc dupliciter, vel enim per se nullo alio morbo præsentē, vel aliquando cum aliqua alia affectione, ut cataphora, catochō, caro, phrenitide, apoplexia, morbo comitiali, vel² simili.

Vbi igitur memoria perijt vel insigniter læsa est nullius alterius morbi occasione frigida cerebri intemperies in causa est, ut Galenus ait.

Fit autem quandoque ut per solam intemperiem frigidam memoria lædatur: aliquando verò simul adsit, vel humiditas* vel siccitas. Humiditatē simul cum frigida intemperie cerebri adesse ostendit somnolentia, & profundi ac longi somni. præsertim si multi per nares³ ac os humores ex capite defluant. Siccitatem ostendunt vigiliæ, somni & excrementorum paucitas⁴.

Læditur autem cerebrum & quidem posterior ejus

2. Eratolai filio dysenterico hujusmodi oblivio oborta est ut eadē paulo interposito spatio iterum percontaretur, seq; desidere nisi admonitus oblivisceretur. Ipse autē sibi conscius erat hujus affectionis, neque ignorabat. 7. Epidem. Hipp.

* Præmiū sumunt ebrietatis rerū omnium oblivio, morsque memoria. Plin. l. 14. c. 22.

3. Non est tamē signum πρεσβυτις nam & ab imbecillitate cerebri proveniunt, ut in senibus.

4. Tum causæ siccantes, ut labor, vigiliæ literariæ, tenuis victus. Gal. 3. de loc. aff.

N 2

5. In his autem maximè remedium occasio est.

6. Aëtius utitur hiera Ruffi. utuntur & alijs verum cum vel scammoniam vel colocynthida recipiunt libenter ab ijs abstinemus.

7. Quod duplici ratione confert. qualitatis videlicet calidioris, & quod capitis humores tanquam apophlegmatismus expurget. Utuntur & pœonia quam capiti proprietate prodesse experientia docet.

8. Nullam enim habet qualitatem. Vtlo quidam utuntur, at tum non nisi resiccando convenire poterit. etenim proprietatem amittit.

9. Ac potissimum futurae lambdoidi.

pars. per proprium corpus, ut Gal. ait, non autem ventriculus ipsius.

Vbi igitur propter frig. & humiditatem, memoria læsa est redundantes humores vacuandi sunt ad quod conducunt pillulæ ex hiera cum agarico vel his fortiores cochia vel aureæ, & ea quæ in dolore capitis à causa frigida ac humida dicta sunt.

Exhibenda quoque omnia quæ excalfaciunt ac resiccant: ut majorana, stœchas, betonica, rosmarinus, & ex his conservæ. item & cubebæ, cardamomum, pyretrum, quæ & in ore sumi ac mandi possunt. Ex compositis laudantur elect. pleris, diamuscum, diaambra, & Arabum confectio anacardina. Aëtius eboris ramenta memoriæ opitulari tradit. profunt autem non qualitate, sed substantiæ suæ proprietate.

Iam & capitis posteriori parti & calida, admoventur ut ol. ex castoreo, ol.

ol. laurinū & similia. Æstate, inquit Aëtius, oleum per se^o calidum: hyeme irinum cum aceto. aliquando serpillo vel calamintha in ipso decoctis.

10. *Maturum tamen sit, non omotribes. hoc subviride, illud magis flavum est.*

Victus rationem cal. quoque & siccam esse oportet. Ab oleribus fructibus præsertim cradis omnino abstinendum. item à caseo & lacte & ab omnibus quæ crassum succum^o ingenerant, & flatus gignunt, ut sunt legumina. Vinum utile est tenue & album, mediocris ætatis, moderatè sumptum. nā nimium sumptum caput implet & humectat.

11. *Qualia omnia operantur quæ à lacte conficiuntur.*

Quando verò propter solam frig. vel siccitatem simul memoriæ detrimentum factum est: veluti post labores, vigilias, vacuationes immodicas, aut post affectionem aliquam cerebri frigidā, reficiente diætā^o uti, inquit Aëtius, convenit. neque aliud curiosius agendum. viribus enim reparatis memoria restituitur.

12. *Vt sunt ora, & generosum vinum, quale malvaticū quod aliquibus semibus aliquando consului ut his manè uterentur qui senectutis frigiditatē istis temperari quodammodo senserunt. R.D.*

Eodem modo si propter senectutē memoriæ offensam sola conveniente diætā contentum esse oportet.

13. *Neceſſe eſt ut hoc fiat ex influxu humorum in ventriculos. qui ſi poſt ad principia nervorum decumbāt, epilepſia oritur.*

Quibus autem ſubitò, addit Aëtius, & derepente ¹³ memoria deficit in his comitialem ſucceſſurum morbum, vel reſolutionem timere oportet vel omnino aliquod magnum malum.

De Melancholia.

Lea. 22. Octob. 17.

CAP. 12.

1. Melancholiæ participes fuere viri clari ut Hercules, Bellerophon, Empedocles qui ſe in Æthnam præcipitarit. deniq. Socrates, & Plato abſque atra bile non fuere. Volater. At hæc illa Mania eſt. Σεῖα δὲ οὐδὲ δίδου ἐν, per quam optima quæque nobis contingunt. Plato in Phædro.

Melancholia à cauſa efficiente nomen accepit ab humore videlicet melancholico. Delirij eſt ſpecies abſque febris cum metu & mæſtitia. melancholicī ſiquidem frequenter abſq; cauſa mæſti ſunt. hominum conſortia quādoque etiam vitant. timent & vix ullo tempore metus illos deferit. non eſt tamen omnibus idem modus. ſunt etenim & qui non metu, ſed & alia quadam imaginatione

natione detineantur. Depravatur autem per hanc affectionē imaginatio. ratiocinatio verò & memoria non læduntur.

Accidit autem melancholia uno modo, cerebro per essentiam sive primariò affecto: alio modo per consensum cerebro laborante. idque dupliciter. vel enim à toto corpore venis scilicet sanguine melancholico plenis, vel ab hypochondrijs malè affectis, quæ flatuosa & hypochondriaca melancholia dicitur.

A toto corpore melancholiam fieri ostendit habitus corporis macer extenuatus & hirsutus, venæ latæ. præsertim si accesserit victus ratio crassum & melancholicum sanguinē ingenerās. deinde & sollicitudines, mærores, vigiliæ, hæmorrhoidum ac mensium suppressiones. Hypochondriacā verò melancholiam præter metum & tristitiam testantur cruditates, acidiructus, flatus, ventriculi do-

2. *Ut qui cimices per aures irrepfisse, ac copiosa prole auctos, totum sub cute, habitum occupare, ingentesque species. sibi molestias faceffere, cōquerebatur. Plerunquē tamen deliria ista avaritiam, aut superbiam conjunctam habēt, ut in illo juvene qui Regina nuptias, somniabat.*

Melancholia fit vel	{	A toto corpore.
		Per cōsensū
		Ab hypochondrijs.
		Primaria cerebri affectione.

N 4

lores, & quandoque in hypochondrijs ardores, & circa splenē tumores. quum verò neque circa ventriculum aut hypochondria prædictorum aliquod apparuerit, neque redundantis in toto corpore sanguinis melancholici adsunt signa, metu tamē & tristitia æger torqueatur cerebrum primariò affici existimandum erit.

Lect. 23. Octob. 18.

I. A. Corpore toto.

3. *Face sanguinis, vel humore ex adustione nato.*

4. *Sic scribunt autores. id tamē vix fieri potest. & tam ijs quos primò invaserat melancholia, quam illis quos post maniam adoriretur, omnibus atrum fluere sanguinem animadvertit. R. Dodon.*

Si itaq; melancholia fiat ab atro humore in toto corpore redundante sanguis ex sinistri brachij vena media detrahendus est. & si quidem valde niger fluxit copiosus. si autem pulcher & rubicundus, non multus.

Si verò atrii sanguinis copiosam vacationem æger nō sustinuerit una vice, post aliquot dies, aut post purgationem, sanguinis detractionio iteranda erit. Misso sanguine exhibenda sunt quæ humores ad purgationem idoneos reddant, quæ ex differentibus facultatib. permista esse convenit, ita ut

ut quædam sint quæ crassos humores attenuare queant, alia quæ siccitatem eorum contemperent, & cordi profint. Attenuantia sunt cort. rad. capparorum, cortices tamaricis, fraxini, & rad. mori. chamædrys, thymum, epithymum, asplenium sive cæterah, adiantum, polypodium.

Contemperantia verò sunt fumus terræ, borago, buglossum, violæ, succus pomorum dulcium, & hujusmodi ex quibus vel syr. vel decocta parari possunt. Decoctis addendi sunt syr. ut de epithymo, fumo terræ, buglossio, vel de pomis Mezuæ.

Præparatis humorib. exhibenda sunt quæ ipsos expurgent, ut folia senæ, epithymum, & quod efficacis-

polypodij, cort. rad. fœniculi, cort. rad. cappar. ana ℥ 2. passul. glycyrb. ana ℥ 2. f. anisi ℥ 1. chamæd. beton. melissæ ana p. 1. flor. comm. p. β. veratri nigri ℥ 2. misce. f. omnium ad ℥ 3. decoctio. adde succi pom. dulc. ℥ 2. in quib. infunde senæ, epith. ℥ 2. syr. de epith. & bugl. ana ℥ β misce. f. haustus.

5. Ne ex incidentibus quæ calida valde, adurantur & ex humore atro naturali, in non naturallem, & ægro damnum majus inferatur.

6. Quia raro aut nunquam fit melancholia absq; communitate cordis.

7. Dioscor videtur florem thymi sic appellare, recepta tamen pro hac cassutha quæ thymo innascitur.

8. Quidam destillata aqua utuntur quæ vim non habet nisi novo modo ut aqua vitæ, tubis per aquam frig. transfuentibus destilletur.

9. Decoctio purgans in melancholia. ℞. Rad.

10. Credo cum imitatione Tralliani nitrum intelligi voluisse.

11. Nitri loco sumendus sal gemmæ. non sal petreæ. A compos. alcermes & omnibus lap. lazuli habentibus quod valdè venenosus sit lapis lazuli nisi sæpe abluatur, libenter abstinemus. Quidam quum frequenter hac uteretur pro cordiali, tandè in morbum incidit. ex qua mortuo effluxit sanguis multus putridus. quod si corpus apertum fuisset sine dubio viscera corrupta fuissent inventa. quum enim in pauca quantitate uteretur non potuit hinc purgari. at si pro cordiali uti quis velit omittat lazuli lap.

12. Ad cujus imitationem syr. hunc composui quem utilem inveni. Rec. rad. bugl. asparagi, rusci ana ʒ β. chamædryos, cuscute, hepatorij vulgaris, melissæ ana manipulum semis. cort. myrobal. indorū ʒ β. senæ, epithymi ana ʒ i. vel β. veratri nigri ʒ β. seminis anisi ʒ i. passularum ʒ i. f. decoctio ad ʒ i. colato addantur succi pomorum dulc. ʒ 4. sacc. 12. & si. syr. R. D.

simum veratrum nigrū. Ex compos. confect. hamech diasen. pill. de fumo terræ, pill. indæ, præsertim quæ sunt descriptæ à Guilhelmo de saliceto quæ recip. aloes ʒ i. agarici ʒ 2. salis indi ʒ i. aut gemmæ ejus loco ʒ β veratri nigri ʒ i.

Commendantur & pill. de ʒ nitro Alexandri præsertim ab ipso descriptæ in cap. de cura quartanæ. Repetere autem hujuscemodi purgantia subinde, utile est. Medio tempore poterunt exhiberi quæ cordi profunt & ad hilaritatem faciunt: ut sunt elect. de gemmis, elect. lætificās, aut diamar-gariton vel simile aliquod. aut syr. supradicti dandi sunt, vel syr. de pomis regis ʒ i. Saporis qui omnibus

præ-

præferendus alijs est. cui si veratrum nigrum addatur multo erit futurus efficacior.

Post purgationes factas balneo aquæ dulcis utendum in quo malva & violæ, & flores chamæmeli incoqui poterunt.

Hæmorrhoides si fluere desierint conandum est ut iterū fluant vel sanguisugæ ipsis sunt admovendæ. Menses etiam præter naturam suppressos provocare refert. non tamen per assumenda ¹², sed potius per externa remedia ut balnea, fœtus, olea vel emplastra.

Originem habet melancholia hypochondriaca ab atro humore circa ventriculum, mesenterium, hypochond. & lienem ¹³ ut plu-

12. Etenim valde calida qualia sunt quæ provocant menses, metus est ne adurant humores.

Lect 24. Octob. 20.

11. Hypochondriaca.

13. Imò, secundum Arabes, etiam hepar atque

uterum. Non in venis. In flatibus autem ratione caloris naturalis intumescit quamvis effusus foras non fermenti modo radat terram ut adusta melancholia. maximè autem flatibus excitat quando adest pituita unde in quibusdam locis palpitatio fit.

rimum consistentem, ubi collectus non modo cruditates aut flatus excitat, sed & vapores melancholicos procreat qui ad cerebrum transmissi imaginationem lædunt ac depravant. Non est autem hæc melancholia adeo vehemens ut aliæ, sed mitior, & quæ per certa intervalla remittitur.

Qui hac affectione laborant vacuatione opus habet, sanguinis missio non¹⁴ requiritur, nisi vel mensium retentio, vel hæmorrhoidum adsit suppressio,¹⁵ vel omnino corpus sanguine redundet, vel lien inflammatione minetur, sed purgantia medicamenta exhibenda sunt. Habita tamē ventriculi ratione. quia in hac affectione sæpe cruditate laborant. idcirco à fortibus initio medicamentis abstinendum, & senna, epithymo, polypodio & similibus contentum esse oportet.¹⁶ utilis verò & aloës usus,¹⁷ etiam singulis diebus in exigua quantitate sumptæ.

14. Quia humor peccans in venis non continetur.

15. Quia circa hypoch. herere solet regurgitans sanguis.

16. A cassia & ea quæ cassiam habent (nisi confectione hamech quæ paucam recipit) abstinendum quod & ventriculum perturbet & flatus augeat.

17. Vel in satis magna quantitate ut purget: vel in minima ut tantum sit innoxium.

sumptæ. facit enim ad alvi dejectionem quam utile est non astrictam esse. ventriculum non perturbat. sed magis corroborat. hæmorrhoides aperit, menses provocat. ex hac formata pill. leviores exhiberi possunt. Perseverante malo & non proficientibus istis ad fortiora transeundum qualia supra dicta sunt.

Exhibere & quandoque ad humorum præparationem syr. expedit. inter quos de epithymo reliquis præstat.

Exhibenda verò & quæ ventriculi concoctionem¹⁸ adjuvèt & flatus discutiant ut diatrion pipereon, diagalanges, vel aromaticum rosatum pro delicatis. tum & ipsum piper per se in cibo sumptum.

18. Paulus exhibet absinthium ratione ventriculi sed non admodum rectè. nam crudi humores eo non perducuntur ad concoctionem; quin magis astrictione in ventriculo retinentur, bilem tamen abstergit.

Vsus quoque seminis anisi, ammios, carvi, & similia etiam à cibo non est improbandus. Ventriculo verò & hypochondrijs externis quoq; remedijs providendum. veluti fomento

19. *Solum ad roborationem. reliqua ad flatus discutiendos.*

20. *Simul mixtus.*

21. *Dissolvit.*

22. *Mollificat.*

23. *Unguent. spleniticum. & Olei liliorum*

3 1. ammoniaci dissoluti in aceto & ad spissitudinem cocti 3 1. β. cere. qu. s. f. ung. molle.

24. *Quia non potest esse magnus morbus, nisi & reliquum corpus afficiatur.*

ex ruta, anetho, 19 absinthio, pulegio, origano, melissa, sem. anisi, cumini, in sacculo confutis qui deinde in aqua decoctus ventriculo & hypochondrijs calens est admovendus. Possunt verò & hæc in oleo decoqui cum quo ventriculus & hypoch. ungenda. Ventriculus etiã seorsim ungi poterit oleo nardino, 20 & de absinthio: Sinistrum verò hypochondrion, si lien tumeat, oleo 21 capparorum, 22 liliorum, addito 23 ammoniaci vel ex ammoniaci emplast. admoveri.

Quando verò melancholia cerebrum primariò & per essentiam afficitur initiò non 24 medicamentis, sed idonea & nonnihil humectante victus ratione curatio instituenda. & paucis externis remedijs. ut in unctione frontis & temporum ex oleo violarum vel nenupharino si somnus non succedat. Sed ubi diuturnior facta fuerit hæc melancholia ad majora remedia

vo-

veniendum est. & talia quæ
lia quando ex toto corpore
melancholia procedit, &
crebro balneis, utendum
est.

Ad melancholiam verò
& referenda quam Paulus
25. Lycanthropiā vocat quæ
ex humore melancholico
in toto corpore redundan-
te originem habet. fugiunt
qui hac laborant hominum
consuetudinem. tenebras
amant. circa monimenta
mortuorum libenter ver-
santur. Curandi autem hi
sunt veluti qui melanch.
totius corporis vitio labo-
rant.

Huic vero & affinis vi-
detur Incubus 26. licet non
nisi dormientibus supervē-
niat 27. Comitatur hos in
somno suffocationis & ve-
luti à re quapiam gravan-
te atque ipsis incumbente,
oppræssionis 28. imaginatio.

crassis succis purgatæ fuerint post partum. 28. Atque
huic quum vitiata sit imaginatio ad melancholiam tan-
quam genus referendum, quum in hac lædi imaginatio-
nem in definitione dictum sit.

Lycanthropia.

25. Nihil nisi intensa
melancholia est. Apud
Marcellū & Cynanthro-
pia inter Melancholia
species recensetur.

26. Plin. videtur Fau-
norum in quiete ludibria
appellasse. l. 25. c. 4. &
nocturnam lymphatio-
nem. l. 34. c. 15. Pniga-
liona Themison. quidam
veteres Ephialten, vel
Epibolen. Neque Deum,
neque semideū, sed Epi-
lepsie tentationem, h. e.
prælium Soran. pro-
bavit. Cæl. Aur. Babu-
tycarius posterioribus
Græcis. Suyd.

27. Sæpe contingit in
puerperis si non benè à

28. Atque

**Quæ ex ciborum repletionē, & cruditatib. in caput effertur anathy-
miasis, Ephialtes dici-
tur. Suyd.* Prognosis.

29. *Herculem quod me-
lancholiæ particeps ef-
set, sacro morbo obno-
xium fuisse dicit Vola-
teran. Non raro admo-
dum hoc fit. est autem
comitialis gravior incu-
rabilis si post 24. annū
incidat. fit autē si tam-
diu remaneat morbus
donec cerebri ventriculi
in quib. comitialis, cor-
rumpantur.*

30. *Hoc quomodo fieri
poterit non video nisi in
morbo comitiali puerorū mutatione ætatis, temporū &c.
Unum habui sub manib. melancholicum qui in pueritia co-
mitiali dicebatur laborasse. R.D.* 31. *Capitis sensum,
aut motum auferentem.*

& subinde voluisse clamare
ac non potuisse sibi viden-
tur. & tanta quidem est hu-
juscemodi falsa imaginatio
ut expergefacti præ sudore
madidi quandoque repe-
riantur. Causa sunt crassi &
melancholici humores pi-
tuita subinde admixta*.

Curatio verò hujus etiam
veluti melancholiæ à toto
corpore.

Melancholia autem sæ-
pe in morbum transit co-
mitialem 19 quod Hipp. 6.
epid. affirmat: Melancho-
lici, inquit, magna ex parte
morbo comitiali afficiun-
tur. & è contrà morbo co-
mitiali 30 laborantes fiunt
melancholici. Incub. etiam,
si sæpe & continuò accidat
morbum aliquem magnum
31 superventurum præfagit.
vel apoplexiam β. vel comi-
tialem morbū, vel maniam,
autore Paulo.

Me-

Melancholici autem in tenebris aut loco obscuro non sunt continendi, nec in solitudine relinquendi³², sed inter amicos versari eos convenit, & omni decenti animi recreatione delectari: ut cantibus, instrumentis musicis, fabulis. ad deambulationes deducendi sunt per loca amana. ad ludos quoque & spectacula ludicra & ad gaudia & hilaritatem omnibus modis excitandi³³. & ita quoque cum ijs agendū qui nimio amoris affectu languent. Victus sit ex optimis cibis. Vitanda sunt sale aut fumo durata. caro item bubula, cervina, aprina. pisces in cœno viventes. legumina omnia & inter olera maximè fugienda est brassica. Caro autē vervecina, caponum, gallinarum, & omnium volucrum quæ non circa aquas versantur, commendatur. & præstat subinde magis elixis uti quam assis.

Inter olera buglossum, borago, lactuca, cichorium.

32. *Helenam Ægyptijs medicamentis in crate mixtis, h.e. philosophicis sermonib. quos in Ægypto vino interpositis, mæstitiam discutere solitam vetustas credit. Philostr. 7. de vita Apollonij. Iræ tristitiæque remedium etiamnum reperiri apud Diospoliticis solos, testatur Diodor. Sicul. l. 1.*

33. *Expedit quandoque ut decipiantur. sic quidam costam sibi confractam imaginabatur. cui exhibita purgatione ac in excrementis costa boris aut alterius animalis confracta reposita, quæ se excreasse eam opinaretur, à morbo melius dein habuit.*

34. Sic etiam cererisia
tenuis couenit.

non reprobantur. Fructus
crudi nō admittuntur. Vvæ
passæ non sunt inutiles. Vi-
num album & tenue³⁴ con-
ducit. rubrum & crassum
non probatur. multo minus
mustum. Sic neque etiam
cerevisia potens & crassa.

In vigilia & somno mo-
dus seruandus. Curæ &
solicitudines omnes excu-
tienda.

De Comitiali

morbo.

CAP. 13.

Leſt. 26. Oſob. 24.

1. ἱερον νόσημα, ἡε-
κλειον νόσημα ob diffi-
cultatem dicitur. item
ἐπιληψία quod subito
apprehendat: vel quod
sensus atq; mentem pa-
riter apprehendat. Cæ-
lius Aur. Sacer, quod di-
vinitus immitatur, seu quod sacram animam; vel sacrum
templū partis anime in corpore dominantis, contaminet;
sive ob magnitudinem passionis. Cæl. Aurel. Vide Apule-
jum 2. apolog. 2. Contagiosum vetustas credidit. hinc
illum despuebant, h. e. contagia regerebant. Plin. Eo labo-
rantes fugiebant. Horat. & ne familiam inficerent rus ab-
legabant. Apul. 1. apolog.

COMitialis: morbus si-
ue epilepsia est universi
corporis convulsio cū prin-
cipū operationum læsione
ac oppressione, sed nō diu-
turna, in quo à reliquis con-
vulsionum generibus dif-
fert². Contingit autem hic

mor-

morbus frequentissimè ipso cerebro primario laborante & in ipso affectu consistente. interdum verò ab ore ventriculi cerebro per consensum laborante. fit etiam sed rarò, ut Gal. ait, morbi comitialis species quum à parte aliqua (cui id fortè accidit) incipit affectus, qui sentiente ægro ad cerebrum usque ascendit. Causa primariæ affectionis est humor pituitosus⁴, vel multus vel crassus. interdum verò crassus melancholicus. quales si in⁶ meatibus ventriculorum cerebri sive is medius, sive postremus sit, retineantur, comitiales morbum efficere solere Gal. testatur.

Primario autem cerebrum affici cognoscitur quando non propter oris ventriculi sensibilitatem, aut non propter alicujus partis magnum dolorē vel non ab aliqua parte vaporosus spiritus ascēdere sentitur.

Corripiuntur autem hoc

3. Sic ab uteri suffocatione comitiales ortum vidit. R. Dodon. Ego etiam in parturientibus. Vide Cæl. Aurel. l. 1. Tard. c. 4.

4. Ad quem semper refert Hipp.

5. Ad quos etiam refert Gal. & Plato in Timæo.

6. Ab uno ventriculo ad alium.

7. Qui comitali vitio solent corripri jam adventare valetudinem intelligunt si calor summa deseruit, & incertum

lumen nervorumque trepidatio est. si memoria sublabitur, caputq; versatur. Seneca de ira. c.

10. Splendores instar iridis oculis obversantur, odorem fædum sentiunt, aures sonant, bilis præter rationem accenditur. Aretæus, l. 1. c. 5.

8. Hinc puerilis passio dicitur. Cael. Aurel.

9. Aetatis melioribus & pulchrioribus viget. cum aetatis flore sepe evanescit ; sed & tum abiens, quasi pulchritudinis invidia quosdam deformat, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquē auferens, quod apud Aretæum repertum in praxi verum esse aliquoties vidimus.

10. Potissimum tamē illi quibus cerebri sensus exactior ; ut maximi quiq; hanc passi sint Livius Drusus, Iul. Cesar alijque. Mahumeth fortē arreptitius, h.e. Deo plenus videri voluit. De Carolo 5. hostis Galli commentum puto.

11. Ut ex Lunæ radijs. quos Anthyllus medicus apud Stobæum. serm. 100. dicit καρηθαρίας & ὑπληψίας ἀνακινεῖν quod humidius reddent cerebrum. idem etiam Gordonius asserit. 12. Quia oportet causam esse magnam quæ cerebrum jam per aetatem siccius humectarit. Quod si familiaris propria, non ætas, non medicus discutere illam valet. Pallad. 6. epid. s. 1. aph. 4.

morbo facillimè pueri. deinde adolescentes ac juvenes. rarius ætate majores. Pueris autē planè infantibus à naturali intemperie hic provenit, quādo cerebrum valde humidum est. definit verò in his cito ac facilè ætatis conversione. sed qui in ætate aliquousq; progressa vexare inceperit ob peccata in victus ratione commissa, vel aliam quampiam causam externam exortus est. atque in his ætatis conversionem expectare non convenit, sed morbosum affectum discutere & idonea adhibere remedia priusquam invalescat. Gal. quoque autore. Qui autem in majore ætate supervenit & post 25. annum ferè ad mortem usque comitatur,

nam,

nam, ut Hipp. quibuscunq;
morbi comitiales ante pu-
bertatem fiunt, mutatio-
nem accipiunt: quibuscun-
que autem in 25. commo-
riuntur. Quicunque verò
senes apprehendi incipiunt
maxime moriuntur.

Gravissimus autē & dif-
ficillimus est morbus qui
à capite oritur & cerebro
primaria affectione labo-
rante. qui verò ab alia par-
te veluti à ventriculo, aut
à manu, aut à pede initium
sumunt maximè sanari pos-
sunt. Quum autem pri-
mum morbus iste aliquem
apprehēdit acutus & mag-
nus est, & subinde diutur-
nam habet accessionem,
nec cito ad se homo redit.
quando autem frequentius
invadit minus gravis est &
accessionem minus diutur-
nam habet.

Curatio.

Si itaque puer recens
Amphiarai. Plutarch. in Hallenic. Menecrates qui se pro
Iove gerebat, quos à sacro curabat morbo variorum deo-
rum habitu circumducebat. Athenæus. l. 7.

13. Aut aliqua parte le-
viter syderati fiunt. aut
si non moriantur cito li-
berabuntur.

14. Ac talem in qua-
dragenarijs quandoque
curari. R. Dodon.

15. Ita ut quandoque
per triduum jaceant. ac
quandoque diu manent
in sopore seu caro solu-
ta convulsione. fit au-
tem hoc ob magnitudi-
nem causæ quæ sanū an-
te hac potuerit afficere.

16. Elafij dicebantur
qui hunc propulsarent,

Lect. 27. Argis. erant

Octob. 25. autem ex
posteris Alexidis filie

natus hoc morbo corripia-
tur nulla opus est curatio-
ne. spes etenim est æta-
tis mutatione cessaturum.
interim radix pæonia collo
appendi potest, quæ pueris
gestata maxime prodest.

17. In Oasi non solum
nulli comitali morbo
corripiuntur; sed & qui
aliunde illuc veniunt, ab
illo morbo liberantur;
propter aeris maximam
tēperiem. Olympiodor.
apud Photium in biblio-
theca. Belgio nostro
contrà frequens; quod
frigida humidaque re-
gio sit, quam auster,
ventus minimè salubris
perpetuè afflat. Læm. l.
2. c. 3. Adde quod cibus
crassi succi ut plurimum
utamur.

Quod si verò alicui ma-
joris ætatis morbus hic su-
pervenerit cura & diligen-
tia major requiritur. ad
aërem calidiorem & sic-
ciorem perducendi sunt &
ad exercitia & labores, je-
juno corpore. In victus ra-
tione abstinendum est ab
omnibus quæ crassum, fri-
gidum, lentum ingenerare
succum queant. Attenuan-
tia conveniunt ut carnes
volucrum quæ nō in aquo-
sis aut circa aquas versan-
tur. inter olera sinapi, na-
sturtium, eruca probantur.
ex herbis hyss. orig. majo-
rana, rosmarinus, thymus,
betonica. Quod si verò &
ætas sanguinis detractiōni
& purgationi suffecerit non
erit hæc prætermittenda.
Et statim post morbi inva-
sionem vel vere aut autum-
no

no hæc facienda.

Quando verò post 25. annū morbus hic primum invaserit frequenter initio morbus acutus est. atque tunc si vires ferant sanguis ¹⁸ quoque detrahendus. aut ^{18.} Metui enim posset acri enemate alvus irritanda. & quando æger aliquantum ad se redierit purgans medicamentum non negligendum.

Victus ratio ad calidam & siccam mutanda ut supra dictum.

Prodest verò non rarò ^{19.} In morbo recenti histum & junioribus ¹⁹ cauterio ulcus in cervice procurare, idque diu apertum ^{19.} in quadragenarijs videri profuisse. in inveterato non tantum prodest. dicitur vulgo *fouranella*. in uno brachio ²⁰ aut uno videtur Appulejus mercurare facere. quod & diu minuisse quū dicit rapum apertum manere expedit. *ramunculi collo alligatam curare comitalem.* Laudat Rhazis lib. 9. ad ^{20.} Non primò, ante quod valde utile est in morbo comitali, cujus loco sumi potest aliud compos. ex *ulcus in cervice. nec illud claudendum antequā in brachio vel cruce* Mithridatio & conserva *apertum, quod diu, imo majoranæ additis cubebis, quandoque per totam vitam, apertum retinendum.* cardamomi, pyretri radice, & pæoniæ radice aut semi-

21. *Exteriore dextri posterioris pedis. Parac. post alios Viscum commendat. qui suo more Viridellum appellat.*

22. *Vt in Diodoro Grammatico, de quo Gal. I. contra Erasistratos.*

23. *Dolorem calculi vel etiam coli in testini.*

ne cum syr. ex stœchade permixtis.

Gestare verò & ex²¹ ungula alcis vel annulum vel aliud quiddam subinde tum his, tum & alijs utile est.

In senectute autem si quis hoc morbo corripitur & ab hoc convaluerit idonea victus ratione continendus est, & danda quæ cerebrum resiccant ac corroborant, veluti quæ jam diximus.

Quod si verò ab ore ventriculi morbus comitialis fiat²², id quod ex oris ventriculi dolore & sensu rosionis præsertim ab inedia ac fame cognosci potest, ventriculi ac oris ipsius ratio habenda erit. cibus tempestivè exhibendus qui ut bene concoquatur curandum. Si aliquo humore gravari ventriculum contigerit exhibenda erit hiera picra. exterius verò & ad movenda ventriculum roborantia.

Si autem propter alterius partis affectionem vel²³ dolorem

lorem acciderit parti laboranti curatio debetur. Si ex crure vapor aliquis efferri sentiat qui ad cerebrum perveniens affectum ingeret mox vinculo priusquā ascendere vapor queat membrum stringendum. deinde parti calfacientia & exulcerantia adhibenda ut sunt medicamenta ex thapsia, sinapi, euphorbio.

De Vertigine.

CAP. 14.

Lea. 28. Orob. 27.

Vertigo : five scotoma inordinatus est spirituum in cerebri ventriculis motus, propter quem omnia quæ quis videt sibi in orbem converti, ac circulariter rotari, falso apparet, adeo ut stans nequeat consistere atque in terram con-

1. Scotomata & Illinges, cōgeneres Epilepsia sunt, ex iisdem causis, & circa eadem loca fiunt. superficie tenus tamen inhaerent tantum. unde & facilius curatur. In l. Medico. c. de humoribus. Hinc veteres parvā Epilepsiam vocarunt.

Cæl. Aurel. c. 2. l. 2. Chronicor. 2. Nihil enim refert τὸ ὄψιν, an quod videtur, in orbem vertas. 3. Probl. 9. & 2. de cælo. t. 48. & 3. Meteor. c. 3. 3. Quod spiritus animalis perturbatus, & cum humoribus confusus, ineptus fiat ad suscipiendam facultatem sensum, motumque suppediantem, Aphrodis. 1. problem. 131.

O 5

4. *Leviorem Græci solum δίον vocant. Differt autem hic morbus sola magnitudine ab epilepsia. hic enim perturbantur ibi prorsus impediuntur spiritus.*

5. *Vt in πικροχόλοις. & in ebrijs. 3. Probl. 9. Effertur autem vel per arterias quæ circa aures; vel illas quæ interiorius ad Retiformem adscendunt, plexum. l. 3. de caus. sympt. Gal. Alienus autem hic spiritus internum cum humoribus in gyrum pellit ut simile quid fiat ac si quis caput in gyrum vertisset; nihil enim interest, aut quod movet intus, aut foris sit. Theophrast. l. de vertigine.*

cidat nisi aliquo fulciatur quemadmodum sanis post multas corporis circūgirationes accidit. Non solum autem stantibus aut euntibus, sed subinde & in lecto decumbentibus ac quietis hujusmodi accidens supervenit quod & quandoque adeò magnum est ut & tenebras oculis offundat, quod + σιγτόδιον græci nominant. Contingit verò & hanc affectionem quandoque per consensum fieri, quandoque verò cerebro primariò laborante.

Per consensum fit quando ex ventriculo acres, calidique vapores efferuntur. cujus signum ventriculi atque ipsius ostij morsus acrosio, & quandoque nausea. Cerebrum verò primaria affectione sive per essentiam laborare ostendit dolor capitis, & præcipuè aggravans, & cum somnolentia, stupor sensus odoratus, aurium tinnitus, quæ in capite frigidos redundare humores testantur, unde cras-
si va-

si vapores generantur spiritus cerebri perturbantes, ac inordinato motu concitantes.

Quando igitur vertigo propter ventriculi ac ipsius oris affectionem accesserit providendum est ventriculo ut supra dictum est, & si multo humore vitioso gravatus fuerit hiera picra exhibenda.

Sed quando propter crudos humores in capite redundantes vertigo facta fuerit. citò ad corporis evacuationem festinandum, & aut sanguis detrahendus, aut purgans medicamentum exhibendum; prout conditio agrotantis suaserit, aut postulaverit. deinde verò & apophlegmatismis ac sternutatorijs utendum. Quod si verò etiam sæpius recurrat neque factis evacuationibus cesset, cauterium etiam cervici admove- vere utile fuerit, veluti in comitiali morbo.

Tempore verò accessio- nis cum vertigo molesta est

6. Quòd non solum pituitosos sed & biliosos humores evacuet.

7. Quosdam vertiginosos ac jam convellendos atq; ad epilepsiam pronos cauterium liberavit, nec unquam sefellit, inquit Dodon.

si non cito cessaverit frictions, ligaturæ, similesque diversiones faciendæ, & odore aromatum æger reficiendus, ut cinnamomi, garyophyllorum &c.

8. *Nam quæ cum febre sit criseos per hæmorrhagiam futuræ præ-nuncia.*

9. *Si in ventriculos fluat humor.*

Non est autem hæc affectio negligenda. nam ut Hipp. in Coacis; Quibus capitis sunt dolores & sonitus aurium² citra febrem & vertigo, & vocis tarditas, & manuum torpor, eos aut³ apoplecticos, aut lethargicos, aut epilepticos fore, expectandum.

De Apoplexia.

CAP. 15.

1. *Dicitur morbus attonitus. & sideratio quod pars aliqua ferè siderata relinquitur.*

2. *Vna cum principalium actionum læsione. Aëtius. estque ut idē ait, morbus toto genere acutus.*

3. *Læsis instrumentis voluntarij motus à quib. & respirationem quodammodo perfici certum.*

Apoplexia¹ est sensus & motus universi corporis privatio² subitò & derepēte superveniens servata tamen aliqua ex parte respiratione quæ tamē difficulter admodum³ procedit, ex qua periculi magnitudinē intelligimus. quando enim respiratio adeo est exigua ut nulla esse videatur fortissima ac vehementissima

tissima est apoplexia⁴. ubi
verò vel liberior vel minus
impedita est respiratio mi-
nus fortis apoplexia habe-
tur quam Hipp. debilem
vocat.

Lect. 29. Octob. 28.

Causæ autem apoplexiæ
sunt humores crudi ac pi-
tuitosi, quandoque soli, sed
frequenter cum sanguine
permixti, in ventriculos ce-
rebri subito incidentes eos-
demque implentes ac ob-
struentes, sic ut nullus aut
vix ullus, spiritus animalis
nervos subire queat.

5. Apoplexia fit multo
sanguine in principium
animalis incurrite. Gal.
de phlebot. c. 5. Sic Ve-
rus Antoninus dum cum
fratre in Vehiculo ve-
heretur subito sanguine
ictus est casu morbi quē
Græci Apoplexin vocant
Eutrop. l. 8. & S. Au-
rel. Victor. Valentinia-
nus dum Quadorum le-
gationi responderet, su-
bito effusione sanguinis
quæ Græcè Apoplexis
vocatur, voce amissa,
sensu integer exspiravit.
Paul. Diacon. l. 11.

Affligitur autem in hac
affectione cerebrum pri-
mariò sive per essentiam, &
nō modo ventriculi ipsius,
sed & substantia ejus su-
perfluo humore imbuitur,
citra autē febrem & humo-
rum putredinem in quo à
ethargo differt.

6. Primū oportet ut sint
humores in substantia
cerebri ex qua in ven-
triculos subito influant.
Vide Pallad. 6. sect. 6.
epid. com. 7.

Cessante autē apoplexiæ
vigore, & excitato utrum-
que ægroto, facultatibusq;
animalib. aliquo modo re-
paratis, succedit paralyfis
ive resolutio, vel dimidij
corporis, vel alicujus unius

7. Quando materia non est copiosa.

8. Non est convulsio, sed est resolutio. unde oppositus musculus ad principium suum retrahitur. Quod in nobili fœmina clarissimè advertimus ex eo quod qui Oculum claudit musculo, una cum alijs faciei resolutio palpebras arcte conducere non posset.

9. Quod humorib. maximè tunc abundantib. dominari calor nativus non amplius potest. utpote qui jam declinare incipiat. Videtur autem Gal. in comm. hujus aph. sui oblitus referre ad melancholiam quum alibi semper pituitam causam ejus statuatur.

10. Detractio fiat è dextra manu & copia ejus qui detrahatur dividatur. commovere enim oportet, non exolvere vires, & calorem extinguere.

7 partis, ut maxillæ cynico
8 spasmus, vel linguæ, vel vocis instrumentorum vel alterius membri, mens etiam in nonnullis læsa manet, præsertim post fortissimam apoplexiam.

Fiunt autem apoplexiæ ut Hipp. ait maximè à 40. usque ad 60. annum. Supervenit verò & non raro senioribus ac majorè ætatem habentibus. Sed his potissimum ex solo pituitoso humore: illis verò ex pituitoso humore cum sanguine permixta. nam ut Gal. apoplexia senilī ætati familiaris. quoniam in ea cerebrum pituitosis repletur superfluitatibus.

Quum itaque alicui mediæ ætatis apoplexia supervenerit sive illa fortis, sive debilis sit, à sanguinis missione curatio incipienda est, quæ etiam repetenda, si repletio magna est, morbus vehemens, & vires constant. Ecnemata deinde acria injicienda, aut glandes similes subjiciendæ; neque cess-

cessandum si fieri potuerit
donec æger excitetur fri-
ctionibus & ligaturis etiam
adhibitis, alijsque diversio-
nibus ut cucurbitulis cum
scarificatione * dorso ad-
notis.

Senioribus verò & præ-
sertim macilentis non te-
nerè sanguis detrahendus
erit, sed enemata injicien-
da vel glandes subjiciendæ,
diversionesque quales jam
dictum est faciendæ.

Restituti aliquo modo
groti sive juniores, sive se-
niores, mox purgandi sunt
ut vires ferant, medicamen-
ta quæ pituitosum humo-
rem subducant ut sunt dia-
phœnic. elect. indû, dia-
rbith, pill. aureæ, pill. co-
niacæ, vel similes; vel ex sena
& agarico decocta.

Præmissis autem genera-
bus vacuationibus ad par-
ticularia veniendum, ut sunt
pneumophlegmatismi, sternu-
toria, odoramenta, un-
ctiones & similia.

Exhibenda quoque sunt
quæ cerebrum resiccent ac

* *Vel pedibus. ut in Io-
hanne Imperatore Con-
stantinopol. factū nar-
rat Georg. Logothet.
Scarificationibus autem
inditum Ephorbion (for-
tè ἐφόλκιον, vel ἐυφόρ-
γιον) addit. ut major fie-
ret attractio.*

11. *Obstat tempera-
mentum & virium debi-
litas.*

12. *Quod valde com-
modum præsertim si in
pulvere dari posset.*

13. *Quæ singularia in
affectibus capitis.*

roborent : ut conser. ma-
joranae, conf. florum ros-
marini, elect. pleris ar-
chonticon, diambra, ¹³ cu-
bebæ, cardamomum, pæo-
niæ radix, aut semen; ex
quibus cum syr. de stœcha-
de permixtis, conditum ef-
formari potest, ex quo ma-
ne jejuno corpore aliquid
exhibendum. Prodest verò
& ipsum el. pleris arcont.
vel diambra si in tabulis
formatum sumatur.

Lect. 30. Octob. 31.
Apophle-
gmatisimi.

14. *Utebantur veteres
etiam rad. staphidis
agriæ qua abstinemus
quod strangulationem
afferat.*

Apophlegmatisimi fieri
poterunt ex radicib. ¹⁴ py-
retri, rad. pimpinellæ saxi-
fragæ, thymo, origano, hyf-
sopo, semine erucæ, in aqua
decoctis addita tertia aceti
parte, vel ejus loco oxyme-
lite simplici, aut quod for-
tius est oxymelite scylliti-
co, quo sæpius gargarizan-
dum & os colluendum est.
Lac quoque ex amygdalis
amaris, aut ex nucleis per-
sicorum cum aqua pulegij
factum non inutiliter, apo-
phlegmatisimi loco, usurpa-
tur. nam & pituitam detra-
hit & linguam expedit fre-
quen-

quenter in ore detentum,
præsertim erucæ aut sina-
peos semine addito. Pos-
sunt verò rad. pyretri & so-
læ manducari vel cum sem.
erucæ & cubebis, tritæ in
nodulo colligari.

Sternutatoria¹⁵ facienda
ex¹⁶ pipere & veratri albi
radicibus quibus addi po-
terit nonnihil castorei. atq;
his etiam in ipsa 1. morbi
accessione uti licet. ad ipsos
videlicet apoplecticos ex-
citandos, sed tamen post
purgationē tutissimus ho-
rum usus.

Semen¹⁷ melanthij. i. ni-
gellæ per se vel cum majo-
ranæ folijs in nodulo colli-
gatum, sæpiusque narib. ad
motum, & odoratum, ad
cerebrū resiccandū etiam
confert.

Quod si verò post san-
guinis missionem vel ene-
mata adhibita apoplecti-
cus excitari nequeat & pi-
tuita vel sola, vel plurima
causa morbi fuerit, calfa-
cientia etiam capiti op-
portune admoventur. qua-

Errhina.

15. *Quod educant hu-
mores & excitēt agros.*

16. *Struthio seu condys-
itebantur olim, nunc in
cognitum est.*

17. *Sic cuidam cui sen-
sus odoratus perierat ex
humorum decubitu ad
nervos odoratus sensum
restitutum memini me-
lanthij odore.*

P

lia in curatione lethargi dicta.

18. Quod fortuitò fuit observatū. etenim quandam mihi cognatam ex apoplexia balbutientem curabam quā delapsam per gradus quū ex vulnere frontis vena rupta multus sanguis effluxisset post expedire loqui animadvertit. R. Dodon.

19. Quod 7. par nervorum ibi ex calvaria excidat quod linguam & labia movet.

Dieta.

20. Quod morbus acutus, & quod fames morbum humidum juvare poterit, siccando.

21. Pro quo oxymelite uti nil prohibet.

22. Tantū quantum additum saporem non reddit ingratum.

Membris autē ac partib. exteriorib. resolutis cujusmodi remedia adhibenda sint in curatione paralyseos dicendum. Ad linguæ autem resolutionem conveniunt gargarismi jam dicti, tū¹⁸ & venæ rectæ in fronte sectio, præmissis generalib. Possunt verò & circa colum superiores partes proximæ¹⁹ capitis ossi, inungi oleo aliquo calfaciente, ut de castoreo, de euphorbio, costino quod describitur à Rhazi nono ad Almanz. quæ ad linguæ expeditionē etiam conducunt.

Victus ratio in apoplexi initiò²⁰ tenuis esse debet, postea paulo plenior, sed attenuans, & ad calidum & siccum inclinans, veluti in curatione comitialis morbi. Ab omni vino toto curationis tempore abstinentiū & ab omni potione inebriante. hydromelite utēdum aut²¹ apomelito in quo si incoctū fuerit²² nonnihil

nihil salviæ vel betonicæ,
utilius erit. neque etiam ex-
hibenda est aqua vitæ aut
aqua lavendulæ, vel cum
ipsis composita, nisi in val-
de senibus. nam usu istorum
humores funduntur & ca-
put magis impletur. In val-
de tamen senibus quibus
venæ sectio aut purgatio
non convenit & vires debi-
les sunt & universum cor-
pus perfrigeratum, conve-
nire potest ex aqua laven-
dulæ vel sola vel addita
aqua vitæ, cum theriaca &
mithridatio ac exiguo cro-
ci, mixtura; ex qua mane &
ante cænā dimidij cochlea-
ris instar exhibendum.

23. *Mithridatij, &
theriaca veteris ana* ʒ ʒ.
croci. g. 5. aquæ laven-
dulæ ʒ 2. vel aquæ la-
ren. & aquæ vitæ ana
ʒ 1.

Cæterum superveniens
apoplectico febris, signum
est malum: significat enim
humorum in cerebro pu-
trefactionem quod absque
periculo cōtingere nequit.

Prognosis.

De Paralyfi.

CAP. 16.

Paralyfis est potentia *Leet. 31. Nov. 4.*
voluntarij motus priva-

P A

tio & quandoque simul sensus tactus. & talis quidem paralyfis exquisitissima & difficillima, sed rarò accidens. frequentius siquidem non nisi voluntarij motus deperditur.

Contingit autem resolvi quandoque dimidiam corporis partem ut in hemiplexia; alias inferiorum: aliquando unam solam partem, veluti manum, pedem, vesicam, anum &c. Causæ autem resolutionis duplices sunt, quædam externæ sive procatarticæ, aliæ antecedentes sive internæ.

Externæ causæ sunt ut fortis alicujus membri ligatura diuturna fortis. præsertim primis annis quando corpus adhuc incrementum sumit. item nervi aut principij ejus attritio, contusio, vulneratio, præcisio, durities; refrigeratio, vel

1. Cæl. Aurelian. etiam interiorum singula paralyfi vitiari credibile putat pulmonem, cor, diaphragma, lienē, hep. & Herophilum ex cordis paralyfi repentinam mortem, nulla ex causa manifesta fieri credidisse refert l. 2. At emissus harum partium sensus repente haud perimit. Cordis motus animalis non est. Diaphragmatis tantum suffocare posset.

2. Vt in puero in quo à sagitta cervicis nervus læsus erat. unde stupor in crure, cum atrophia, & incrementi privatione. Vide Niceph. Greg. comm. in Synes. de insomnijs.

3. Vt à plumbo, argento vivo aut alijs metallis.

ver-

vertebræ + alicujus luxatio. 4. *Luxatio ex casu, ictu vel tumore fit. casus aut ictus si magnus sit resolutionem inferiorum omnium inducit. Sed à tumore ut in gibbosis paralytis non fit quod sensim fiat, & proxime vertebra una quodammodo cedunt.*

Interiores causæ sunt humores, nervorum principium aut ipsos nervos nimia, humiditate imbuentes atque relaxantes, & subinde quoque obstruentes tunc videlicet quando sensus tactus abolutus est. humores autem qui nervos ipsos humectant, pituitosi & tenues sunt: vel tennis & pituitosus sanguis.

Succedit autem paralytis quæ non ab externa causa accidit frequentissimè apoplexiæ. Contingit verò & quandoque citra interiorum sensuum & facultatum principum offensa, nulliusq; partis quæ ad faciem & caput pertinent actione amissa, servata etiam respiratione, omnes tamen partes inferiores resolvi. Fit verò & paralytis critica quadam permutatione ex alio morbo, & frequentius per colicum dolorem.

Sunt verò & qui diuturnam cataphoram; quod cerebrum utero

5. *Ætius. Sanguinis, detrahendus verum moderate, ne refrigerentur frigiditas enim cum siccitate morbi causa. i. ut ante dixit, frig. crassi ac viscosi humores.*

6. *Bilis licet tenuis tamen quum omnes partes resiccat quas attingit paralytin non efficit quod vult fernelius, sed potius convulsionem induceret. atque in hoc accedo Ronde.*

7. *Gordonius. Nos Vteri suffocationib. frequenter tentatam, apoplecticam demum mori vidimus.*

Terminari autē solebant hujus suffocationes in συμπαγειν ostendebat.

nis febribus & uteri suffocationi nervorum resolutionem quandoque succedere affirment.

Quando igitur propter causam aliquam externam aliqua corporis pars resoluta fuerit parti quæ primario læsa & affecta est, & unde resolutarum partium nervi dimittuntur, præmissis generalibus si opus fuerit, topica erunt remedia adhibenda, ut Gal. I. de loc. affect. docet. modo talis sit affectio, quæ curationis spem admittat. nam ex causis externis quædam resolutiones omnino sunt incurabiles, ut à præcisione nervi^s. & sæpè, etiam à vertebrarum luxatione.

8. Imò difficilis etiam curatio si vel à duritie nervi solum fiat.

9. Si diuturna fuerit luxatio, quod si ab egressu nervorum vitium fuerit ille tantum resolvuntur ad quas partes ille dimittuntur.

Resolutis autem ab apoplexia partibus factis universalibus, observata victus idonea ratione, non prætermittis his quæ cerebrum resiccant ac roborant, localia erunt adhibenda remedia. ut sunt olea, unguenta, & adipēs nervos calfacientia, resiccantia, ac

con-

confortantia. veluti oleum
lumbricorū, ol. vulpinum,
ol. terebinthinæ, & quæ his
fortiora ac potentiora sunt
ol. de castoreo, ol. de eu-
phorbio, ol. costinum Rha-
zis, ol. laurinum, ol. junipe-
rinum, ol. ¹⁰ benedictum.
quibus addi possunt adi-
pes vel leonis, vel ursi, vel
taxi.

10. *Seu de lateribus.*

Possunt verò & ex ijs-
dem & unguenta componi
storace, vel myrrha vel, ca-
storeo, vel euphorbio, vel
pipere, vel aliquot horum
simul cum cera additis. Un-
gendæ autem sunt istis un-
guentis & oleis calentibus
partium resolutarum jun-
cturæ, & dorsi spina quæ
spinalem medullam conti-
net unde nervi oriuntur. &
initio quidem levioribus
utendum postea ad fortio-
ra veniendum.

11. *Quod ibi à muscu-
lis liberi quodammodo
nervi, quodque etiam li-
gamenta ibi sunt quæ
una afficiuntur.*

Quando autem mem-
bra corporis subitò resol-
vuntur nulla præcedente
externa causa principibus
facultatibus non læsis, neq;
ulla circa caput aut faciem

Leet. 32. Nov. 3.

parte resoluta, servata etiã
respiratione ab humoribus
ex capite in spinalis medul-
læ principium defluentibus
affectionis origo est.

In hac affectione vacua-
tio mox facienda est. vena
secanda est, si sanguinis re-
dundantis adsint indicia.
deinde purgans exhiben-
dum erit quod solum satis
erit, non redundante san-
guine. modo tale sit quod
pituitosos expurget humo-
res. qualia in apoplexiæ cu-
ratione dicta sunt.

12. *Quia sola purgatio-
ne multi curantur.*

Post vacuationes factas
ungenda, 12 si opus fuerit,
dorsi spina aliquo supradi-
ctorum oleorum observata
victus ratione, & exhibitis
caput roborantib. remed.
ut in apoplexi.

13. *Rarum.*

Quod si verò pertinacior
& istis remedijs curari ne-
queat 13 (veluti dum non so-
lū motus voluntarius amif-
sus, sed & simul tactus sen-
sifica vis abolita est) tunc
enim pluribus erit remedijs
utendum. Balneum paran-
dum erit ex rosmarino, lau-
ri fo-

ri folijs, serpillio, origano,
betonica, calamintha, pule-
gio, salvia, thymo, majora-
na, hyperico, floribus cha-
moemeli, floribus stœcha-
dos, &c. addito etiā¹⁴ ebu-
lo & feminibus calfacienti-
bus ut semine anisi, sem. se-
seleos, sem. cumini & simi-
libus, quæ in aqua deco-
quenda sunt¹⁵ ad dimidiæ,
aut ad minus 3 partis aquæ
consumptionem, quæ dein-
de calens in vase fundenda.
in quo patiens jejunos ita
sedere debet diligēter con-
tectus ut aquam decoctam
non contingat, sed vapo-
rem ejus tantummodo re-
cipiat in quo aliquo tempo-
re permanere debet. Vbi
verò satis¹⁶ corpus inca-
luerit & sudaverit in lecto
collocandus erit ac diligen-
ter contegendus, exhibita
vel theriace vel mithrida-
rio, vel aurea Alexandrina,
vel confectione Anacar-
dina 3 vel 2^{orum} ponde-
re. Postea ubi æger requie-
verit oleis aut unguentis
ingendus erit. Non semel

14. *Quod tenuium sit
partium & exsiccet.*

15. *Vt tota facultas
herbarū in aquam trans-
feratur. nam actuali hu-
miditate magis noceret.*

16. *Quia tunc facilius
ad nervos penetrat vis
medi. omnib. poris aper-
tis.*

autem hujuscemodi balneo utendum, sed sæpius & bis vel ter in hebdomade æger in balneum mittendus erit, habita virium ratione.

Quod si verò nec istis balneis paralyticus sanari queat confugiendū ad naturalia balnea calida & sulphurea, ut sunt Aquisgrani. adhibitis cautionibus quæ talia balnea postulant.

Cynicus spasmus.

17. *Non fit sine mentis aliqua perturbatione, ac sola resolutio est in quā apoplexia debilis desinit, ut fortis in hemiplegiam.*

18. *Vel insuper etiam empl. similis facultatis imponenda. quibus aliquam euphorbij partem addi quandoq; necessarium est.*

19. *Sine dolore. Contingit ex sola refrigeratione ferè in senib. nec opus evacuationibus terminetur autem lentè.*

In Cynico 17 spasmus factis generalibus ut in apoplexiæ curatione fricare cervicem & partem resolutam initio expediens est. Admovenda deinde sunt fomenta calida ex salvia, majorana, floribus stœchados, chamæmeli & similib. in sacculo confutis. Postea cervicis vertebræ, & pars resoluta oleis supra-dictis ungenda 18.

Vesicæ verò musculis resolutis & urina præter 19 voluntatem effluente admovenda erunt topica remedia pubi, imo ventri, & regioni quæ inter anum & scrotum. Paulus etiam olea in

in anum infundi jubet qualia supra dicta.

Cole autem sive pene resoluta & iisdem partibus tum & lumbis remedia adhibenda.

Recto autem intestino resoluta, & fecibus præter voluntatem excidentibus fovendus erit anus decocto calfacientium simul & astringentium, ut ex herbis supra dictis & gallis, nucibus cupressi, glandium calicibus, semine myrti, rosis rubris, balauistijs & similib. astringentibus. Oleum verò matricinum vel myrtinum etiam alijs admiscendum, quibus anus foris inungendus, immixtis etiam in ipsum intestinum per syriginem hujusmodi oleis.

Qui ex permutatione colici doloris resolutas habent manus & brachia facile & subinde absque remedijs curantur. modo cesset causa colici doloris, neque opus habent purgantibus medicamentis. à vino etiam abstinere non de-

20. *Quod Langius male per sextum par nervorum quod ad ventriculum pervenit fieri. id enim ad manus non pertingit, sed 6. par quod è vertebriis oritur. numero forte deceptus.*

21. *Quod non sint humores in causa, sed debilitas partium.*

22. *Quum colicus dolor vinum requirit.*

bent. bona victus ratio servanda. Partes resolutæ unguentis & oleis ungendæ.

Profunt verò & his balnea naturalia sulphurea.

Similis curatio adhiberi debet ijs qui ex permutatione aliorum morborum resoluti sunt.

23. Quorum talis est af-
finitas ut plumbū im-
positum argento vivo li-
quescat & simile ei fiat.
dolus agnoscitur quod
hoc evanescat igne, plū-
bum minimè.

24. Difficulter curantur
quod spiritus metallorū
tenuissimus musculis im-
pressus non extrahatur
facile.

Qui autem ex tractatio-
ne argenti vivi²³, plumbi &
aliorum²⁴ metallorum pa-
ralytici facti sunt difficile
curantur. balnea & unctio-
nes ipsis conveniunt. pur-
gantibus med. non adju-
vatur idcirco nec ipsis dan-
da, nisi corpore repleto &
ante balneorum usum, & ea
quidem admodum levia.

De Stupore.

CAP. 17.

1. Ideoque ejusdem cum
Paralyfi speciei quidē,
secundū verò magis &
minus ab illa differt.

STupor sive torpor est
Simminutio : sensus &
motus in partibus sensu
præditis. non enim in om-
nibus contingit, sed in ijs
tantum membris quæ suos
affectus sentire queunt &
pro arbitrij voluntate mo-
veri¹.

veri. Neque etiam sentiendi vis omnino amittitur, sed sensus obscurus fit & hebes, & motus redditur difficilis. mediam autem quandam inter paralyfin & sanitatem dispositionem torporem esse Gal. ait, & viam quandam ad paralyfin.

Causæ autem torporis siue stuporis quædam externæ, aliæ internæ. Externæ sunt frigus & compressio nervosorum corporum. item & marinæ torpedinis viventis contactus, & narcoticorum applicatio, & usus. Internæ sunt crassi & frigidi humores, vel consuetæ alicujus vacuationis suppressio.

Torpore autem quando cerebrum laborat si non ab externa causa vel propter narcoticorum usum acciderit successuram vel apoplexiam, vel carum, vel catochum, aut lethargum significat, nisi sibi in tempore æger providerit.

Torpor qui ab externa causa factus est solvitur fri-

2. *Privatio enim præsupponit habitum. Ossa stuporem non patiuntur (dentib. fortè exceptis) quod sensum, motumque qui imminui possit à natura non habeant.*

3. *Quod idem. nam si supprimatur biliosa vacuatio non fiet torpor. Atque hæc quidem Congestionis causa. Generationis autem talium humorum Vita deses, Efficiens: cibi verò crassi, & lenti, Materialis causa existit.*

cationib. & calidorum adhibitione. sed qui ab humore redundante natus est, vacuationem postulat, quæ instituenda veluti in apoplexia & paralyfi dictum servata simili victus ratione.

De Convulsione.

CAP. 18.

Lea. 34. Nov. 7.

Convulsio est affectio per quam voluntarij motus instrumenta ad principium suum contra voluntatem & cum dolore trahuntur. Accidit autem vel propter repletionē instrumentorum, vel propter eorundum inanitionem & siccitatem. adest & tertia causa mordicatio ab aliquo qualitate acri.

Convellitur autem quandoque universum corpus, ut in epilepsia quando cerebrum laborat, quandoque verò quædam solummodo partes. Inter convulsionum genera & is est quem rigorem nervorū Celsus vocat,
cujus

cujus 3. sunt species: modo enim caput ad scapulas, trahitur, modo mentum pectori annectitur, modo recta & immobilis cervix intenditur, sic ut nec antrosum, nec retrorsum flecti queat. priorem affectionem ὀπισθόστροφον, alterā ἐμπροσθόστροφον, teriam τέτανον græci appellant. Acutus autem morbus tetanus est. nam, ut Hipp. ait, Quicunque à tetano corripuntur in 4. diebus percunt: si verò has effugerint sani fiunt.

Ab inanitione autem fit convulsio quæ sequitur vacuationes immoderatas, ut vomitus aut purgationes vehementes, alvi fluores spontaneos modum excedentes, sanguinis profluvia immoderata sive per vulnus sive alio modo, sudores copiosos. Item & illæ quæ succedunt vigilijs diuturnis, fami ac inedia, & continuis laboribus. hæc enim omnia nervos & voluntarij motus instrumenta sicciora reddunt & contrahi faciunt.

1. Tetanū semel vidisse se, reliquas species nunquam. R. Dod. narrabat. Opistotono sepiissime recurrēte laborantē

puellam 12. annorum vidimus quam in cantationibus læsam adstantes credebāt. dorsi enim spina in arcum veluti convulsa supra ventrem prona in lectulo suoolvebatur. ac musculi faciei contracti risumentiebantur Læviorem aliquoties observavimus.

2. Magis convulsiones sequuntur spontaneos fluores, præsertim in cholera, quam arte factos. Ex usu autem helbori albi resolutiones fiunt ob malignitatem ejus.

3. Vulnus convulsionem infert vel ratione vacuationis, vel ratione inflammationis ex vulnere nate.

4. *Vocant hanc convulsionem per consensum: vel etiam convulsionem non proportionatam ad materiam morbi.*

5. *Convulsi vi potius motus, quam convulsiones sunt.*

6. *In morbillis etiam, seu Variolis, quum nondum ad cutem prorupere sævissimas convulsiones aliquando vidimus, quæ tamen materia peccante ad circumferentiam habitus expulsa statim desinunt.*

A qualitate autem acri fiunt + convulsiones quando vaporosus aliquis spiritus acrimoniam habens, vel venenosa aura, cerebrum & nervos infestat ut fit à morso phalangiorū, & canis rabidi, vel aliorum similium. Tales autem convulsiones non sunt constantes, nec membra rigida permanent, sed per exigua intervalla, veluti quiete aliqua intermedia, assiduè molestantur, quales in febribus ardentibus & phreniticis frequenter accidunt.

Acres æruginosi humores os ventriculi infestantes hujusmodi convulsiones etiam inducunt, ut Gal. testatur.

Quando verò à nulla tali causa sano alicui subito & derepente convulsio supervenit, ob repletionem hanc fieri necessarium est.

Replentur autem ac distenduntur nervi aliquando à vaporoso spiritu frigido, sed hinc facta cōvulsio non est perpetua & confestim sol-

solvitur : veluti in comitiali morbo & convulsione ab utero. sed quæ subito quidem quoque invadit non citò autem & confestim solvitur, ex humore fit nervorum meatus obstruente qui crassus ac viscidus est.

Contingit verò & nonnunquam propter inflammationem 7 alicujus partis nervosæ convulsionem fieri, quando videlicet in nervorum principio, aut prope admodum constiterit.

Hipp. autem etiam frigidum convulsiones facere scriptum reliquit.

Facta igitur convulsione ab inanitione laborandum est ut cessent causæ: corpus verò etiam mox humidis & idoneis quæ citò & facile nutrant alimentis, reficiendum, ut sunt sorbitiones ex jusculis caponū vel aliarum similium carniū, item & sorbitiones ex carnibus confusis caponum, gallinarum, perdicum, aut similium, cum amygdalis dulcibus quib. placent, vel

7. Gal. de sympt. causis lib. 2. cap. 2. ad repletionem refert.

8. Convulsiones, tetani, palpitationes, torpores, resolutiones, comitiales

morbi, attoni-

Lea. 35.
Nov. 8.

ti, frigiditatis sunt vin-

centis effectus. Gal. de palp. trem. rigore &c.

Q

9. *Ut in cholera.* Omnia enim jurulenta movent alvum. jus Gallinarum astringere dicit Gal. quod minus moveat quā jus galli veteris, sed tamen movet.

10. *In qua non fuerint incoctæ herbæ.* quod apud quosdam fit.

11. *In enemate ad colicos dolores juvat,* impotentes ob duritiem nervorum ex vulnere vel alias restituit, ac ad multa utile est.

cum nucleis nucum pinearum, cum earundem carniū jure apparatus. nisi obstet, alvus fluida. quādiu enim illa liquida permanet à carniū jure abstinendū & illius loco aqua simplici ad sorbitiones faciendas utendū. Profunt verò etiam ova sorbilia atq; ex his cum vino factæ sorbitiones. Vina etiam dulcia utilia sunt. cito .n. vires & humidū reparant. Sic & cerevisiæ potentes modo nō sint acidæ, nec inutile hydromeli est.

Partes verò cōvulsæ ungendæ sunt vel oleo amygdalarū dulcium, vel pinguedine porci, vel butyro insulso, vel simili aliquo. fovere verò & easdē convenit vel decocto malvæ, bismalvæ, sem. lini, additis florib. chamæmeli, vel cerevisia crassa recēti adhuc 10 calēte priusquam lupulus incoctus fuerit. Vel jure 11 omasorum & pedum boīū. Balnea verò aquæ dulcis etiam utilia sunt addita si placet malva aut bismalva. Extrema autem

tem sive calor sive frigus 12. *Quia valde ledunt
vitanda sunt. nec est ab his nervos.*

remedijs cessandū nam ab inanitomine convulsiones periculum minantur, & lethales eas non uno loco Hipp. pronuntiavit.

Quod si verò ab acri aliquo convulsio orta fuerit, aut à venenosa aura veluti à morfu phalangij vel 13. *Si possit inveniri
rabidi curatio adhibenda, remed. erit quod conve-
qualem affectus postulat niat hydrophobia ante-
quem comitatur. In febrib. quam convulsio jam su-
autem ardentib. & morbis pervenit ex morsucanis.
acutis hujuscemodi convul-
siones pro lethalib. & per-
nitiosis signis habentur.*

Si verò propter æruginosam bilem in ventriculo hærentem convulsio fiat mox vomitione expurganda erit, quæ aqua tepida sola, vel cum addito oxymelite, provocari poterit.

Ex plenitudine convulsione facta (si non ex vaporoso spiritu) mox corpus vacuandum est, & præcipuè purgante medicamento quod crassam pituitam expurgat, qualia 14. *Vt pillulis cochijs.*

Q 2

15. *Potius tamen utendum purgatione.*

in curatione Apoplexiæ. neque expectanda est, aut præmittenda est humorum præparatio aut concoctio propter morbi violentiam.

Venæ sectio, si^{is} sanguis cum frig. humorib. redundare videatur poterit initio admitti.

Post purgationē ad particularia veniendum qualia sunt unctiones & balnea veluti in paralyfi ex humorum in spinal. medull. defluxione facta, adhibita simili victus ratione, attenuante, & calida.

Balnea sulphurea in hujusmodi convulsione etiā prodesse possunt.

Si verò cōvulsio fiat propter inflammationem principij nervorū aut partium vicinarum, sanguine ex opposita parte detracto, curatio adhibenda est qualem inflammatio requirit.

Sic & convulsiones à vaporoso spiritu veluti in epilepsia, vel ex utero; non aliam requirunt, quam affectiones quas comitantur,
cura-

curationem.

Si tamen aliquod membrum sæpius ex aliqua¹⁶ occasione hujuscemodi convulsione corripiatur, humores etiam frigidi erunt expurgandi, sicuti in convulsione à repletionem, servata eadem victus ratione.

A frigore nata convulsio calfacientibus curari debet.

Sic & qui cōvulsione aut tetano detinentur superveniente febre liberantur.¹⁷ aph. 57. lib. 4.

que in rigore convellebatur, accedente calore restituebatur, eaque ratione per febrem liberata aliquo modo dici potuit. R. Dodon.

16. Ut ex flatu, quod tamen ex frigido humore elevatur. ideoq; purgandus ille homo.

17. Sic juvencula quadam gravida, ex utero in comitalem morbum, atque ex eo in convulsionem incidit, superveniente verò febre continua, quæ post in intermittentem mutata est, ac tandem desijt, liberata fuit. Verum puellam navi 6. annorum

De Tremore.

CAP. 19.

TRemor depravatus : Lect. 36. Nov. 10.
est motus sursum deorsumque qui fit partim à cere malueris. quæ enim facultate motiva elevante, stupor ad ἀναίσθησίαν, eandem Tremor ad ἀνίσθησίαν proportionē habere videtur.
& partim à gravitate ipsius membri deorsum trahente. Differt à rigore quod tremor non fiat nisi quum

2. *Vel immotum servare. ad hoc enim motus requiritur tonicus, qui tremorem magis quam ille per quē pars de loco in locum movetur, prodere solet.*

3. *Quia vinum crudos humores secum rapit ad hepar qui non possunt concoqui ab hepate, unde cruditates multae fiunt. Inter prœmia ebrietatis Plin. recenset, & Tremulas manus. l.*

14. C. 22.

4. *Quod colligitur si nō præcesserint aliæ causæ.*

quis membrum voluerit movere: rigor verò citra voluntatem & nolentibus nobis superveniat.

Fit autem tremor propter imbecillitatem facultatis motivæ nequeuntis membrum sic elevare quin pondere suo rursus decidat, ac deorsum trahatur.

Causæ imbecillitatis facultatis motivæ complures sunt ut nimia refrigeratio instrumentorū voluntario motui deservientium, frigida aqua intempestiva potatio, ebrietas & multa vini nigurgitatio præsertim quotidiana ac frequens. nō rarò etiam nimius timor. item morbus aliquis gravis qui præcessit, vel præsens ut in cardiacis ac stomachicis. abstinentia nimia, vel alimenti defectus. nimia vacuatio, veneris immoderatus usus, fluxus sanguinis immodicus. jam & virtutis per ætatem exolutio ut in senibus. Quandoque verò cruditas & humorum viscidorum crudorumque copia

pia vires veluti pōdere aggravans & ad officiū inutiles reddens tremoris causa existit.

Orto igitur tremore à causa externa ut à frigore partes calfaciendæ sunt. Frequens ebrietas & frequens vini potatio abstinētiā requirunt. Timor excutiendus est.

Qui verò ex morbo cōvalescentes, vel propter nimiam abstinētiā, vel alimenti inopiam, vel excedentē vacuationem, aut importunū veneris usum, aut propter sanguinis immodicam vacuationem tremore correpti sunt: omnes alimentis & optimis cibis citò ac facile nutrientibus reficiendi sunt, veluti in convulsione ab inanitione facta. Eodem modo & senes tractandi sunt quibus ovorum recentium sorbiliun ac vini potentis ac dulcis usus multum conducit.

Tremor verò qui præsentem cordis aut ventriculi affectū comitatur non

5. *Omnia aut saltem pleraq; quæ habet Ægineta in cap. de tremore sunt remedia rigoris.*

Q 4

aliam quam ipsius morbi curationem requirit.

Sed si ex copia crassorum viscidorumque humorum tremor contigerit humores attenuandi, incidendi præparandique sunt & deinde expurgandi veluti in curatione febris quotidianæ & dolore capitis ab humore pituitoso, faciendum. In hoc casu convenit quoque post purgationem uti compos. caput ac nervos calfacientibus & roborantibus, ut sunt Aurea Alexand. Conf. Anacardina vel rad. acori aut zinziberis conditæ, laudatur & elect. diacastor. Nicolai.

Partes debiles ac tremētes ungendæ sunt oleis ut vulpino, lumbricorum, costino vel simili.

Victus rationem cal. & siccam observare eos convenit qui ex cruditate laborant: Reliquos verò talem qualis ante dicta est. quos & ab acidis & acetosis abstinere convenit & frigidum omnino vitare.

De

De Palpitatione.

CAP. 20.

Palpitation est alicujus Lea. 37. Nov. II.
 partis præter naturam
 velox dilatatio & contra-
 ctio sive elevatio & de-
 pressio. Differt à tremore
 quod hic quidem non ac-
 cidit nisi quum membra
 voluntariè moventur: pal-
 pitatio verò etiam in parti-
 bus jacentibus & non mo-
 tis contingit.

Contingit autem hanc
 fieri in palpebra, supercilio,
 musculo temporali & in
 alijs corporis, musculis &
 subinde sub ipsa cute. Iam
 & partes quæ tremunt non
 dilatantur aut contrahun-
 tur.

1. *Vt in sura, in brachio.*

Causa palpitationis est:
 crassus vapor & pro captu
 spatij multus, difflatu ca-
 rens, à frigido crassoq; hu-
 more procreatus, ad cujus
 generationem conferunt
 natura corporis frigidior,
 otiosa vita, satietas, temu-
 lentia, cibi frigidi ac flatuo-
 si, & non rarò aëris con-

2. *Alioqui citò evapo-
 raret.*

Q s

stitutio frigida.

Curatio palpitationis fit partim per ea quæ frigidos humores attenuant, partim per ea quæ cutim rarefaciunt, partim per flatus discutientia.

Attenuantia sunt ut lavandula, thymus, origanum, majorana, pulegium & similes. Inter rarefacientia flores chamæmeli primatum tenent. Flatus discutiant sem. cumini, anethi, seseleos, & similia.

Ex horum aliquot sacculus impleri poterit, quo calente fovendæ sunt partes palpitantes. Prosunt verò & cucurbitulæ parti palpitanti aut vicinæ sine scarificatione admotæ. Olea & inunctiones exiguum vel nihil prosunt; Poros & meatus cutis facile occludunt, quos refert apertos & patentes esse. Victus ratio servanda qualis in alijs frigidiorib. morbis. Frequentes autem palpitationes periculum minantur vel apoplexia, vel comitialis morbi,

3. Communia. nam chymica subtilia sunt. Multi præterea ut quibus pori exigui, non ferunt unctioes oleorum.

4. Sic quandoque duos observari ex palpitatione in apoplexiam incidisse. R. Dodon.

bi, vel etiam convulsionis,
authore Avicenna.

De Ophthalmia.

CAP. 21.

Lect. 38. Nov. 14.

De morbis Oculorum,

Ophthalmia.

Ophthalmia sive lippitudo generali voce quævis oculi perturbatio dicitur, quæ cum rubore adnatæ tunicæ sive conjunctivæ accidit, & cum dolore in quo ab hypophagmate differt. nam hypophagma rubor est adnatæ tunicæ citra dolorem. Est autem ophthalmia quandoque minor, quandoque major. Minores ophthalmiæ à causis fiunt exterioribus ut à pulvere, à fumo, à vento, ab excedente

Causis externis est, ophthalmia non vera.

Oculorum
ophthalmia
vel est à

Humoribus
fluentibus

Sanguineis. tunc fit Inflammatio oculi. hac intensa, habet symptoma χήμωσιν.

Acribus pruritum excitantibus si copiosi ὀφθαλμοειδὲς dicitur si erosa cornea uvea prominet sympt. proptosis est.

Aquosis Εμφύσημα.

Pituitosis

Salsis { *Ψωρ-
ξηρ-
ραucus* } *οφθαλμία.*

2. Plurimorum oculis præcipuè perniciosus fuit rigor nivis insolitus. &c. Curt. l. 6. Xenoph. l. 4. expedit. Cyri.

3. Cayri ex septem millionibus & uno millione & sex millib. Iudeorum, vix tertia pars visum integrum habet. propter esum fructuū, aquæ potum, & sudorem ob cydari in regione calidissima ad oculos defluentem. accedēte & pulvere latearum non stratarum.

4. Neque ex alijs partibus fluunt ad oculos humores.

frigore, vel à nimio calore ut à balneo calidiore. Majores verò & molestiores ophthalmiæ à causis fiunt interioribus, ut sunt humores à capite destillantes ad oculos.

Humores autem in oculum fluentes, vel sanguinis naturam referunt, vel acres & biliosi sunt, vel pituitosi falsi.

Sanguinei humores ad oculos copiosius cōmeantes inflammationem oculorum excitant. Intenditur tunc oculorum rubor, palpebræ magis eleuantur & non nisi cum magno negotio suspicere quis potest, aut lucem intueri. dolor verò etiam magis intenditur si acres aut falsi humores simul permixti fuerint. Quod si autem & omnino maxima inflammatio fuerit palpebræ tumentes invertuntur. adeo ut oculi ab ipsis vix contegantur & adnata tunica tumet ac sublimior evadit, quod accidēs chemosis dicitur.

Chemosis,

Ab

Ab hujuscemodi autem inflammatione succedente abscessu contingit oculum videndi facultate privari.

Acres autem ac biliosi humores vel pituitosi falsi pruritus & ardores cum dolore & rubore excitant. ab his verò & quandoque inflammatio præsertim sanguineo humore admixto, imminet.

Quod si verò hi humores largiter & diutinè fluât, & præcipuè pituitosi falsi epiphora affectio dicitur, per quam corneam tunicam exulcerari quandoque contingit, qua exulcerata succedit proptosis sive uveæ tunicae procidentia.

Humores autem pituitosi aquosi si ad oculos fluant tumor succedit palpebrarum, sed mollis, laxis & citra dolorem & ruborem. palpebræ verò graviores redduntur & difficilior moventur ac aperiuntur adnata verò tunica & quandoque simul tumens supra iridem oculi elevatur, & attollitur,

5. Effusis, ac locum multantibus humoribus & tunicis. quas etiam rugari in tali casu contingit. Puerulo uterque humor crystallinus per abscessum excidit, ut vidimus. Alij aqueo solum humore profuso post consolidationem oculus minor factus, & videndi usu destitutus est. Annibalem dum per paludes

in Hetruria item faceret, gravi ophthalmia, Epiphora. quod quiescere curarique non posset, uno oculo privatum. Polyb. narrat. 3. l.

Proptosis.

6. Quæ paulum eminent myocephalon appellantur si magis staphyloma.

ἐμφύσημα. atque hæc affectio ἐμφύσημα dicitur.

ψωροφθαλμία. Si verò humores pituitosi corrupti ac falsi eo delati fuerint, sed in exigua quantitate scabies succedit palpebrarum, quæ ψωροφθαλμία dicitur, & quandoque cum rubore pruritus, quem Aëtius ait ab oculi angulo circa nasum, incipere, & plerunque senioribus accidere & frequenter in ætate.

Ξεροφθαλμία.
7. Communis palpebrarum ac oculi est affectio. Aëtius.

Lea. 39. Nov. 15.
Curatio.

8. Oculi urforum hebetantur crebrò, qua maximè causa favos expetunt, ut convulneratum ab apibus os, levet sanguine gravedinè illam. Plin. l. 8. c. 36.

Huic vicina est 7 Ξεροφθαλμία .i. arida sive sicca lippitudo pruriginosa absque humorū fluore dispositio.

Curatio omnium oculorum dolorum qui à plenitudine & cum inflammatione fiunt à venæ sectione incipienda est. secunda autem est humeraria è directo laborantis oculi, si unus tantummodo affectus est. dextri verò brachij si uterque, vel etiam utriusque, si venæ sectio iteranda est.

Alij dolores & affectus
par.

purgantibus medicamentis
 curandi sunt qui ab humo-
 rum influxu fiunt. nec ta-
 men in inflammationib. post
 sanguinis detractionē pur-
 gationes negligendæ. Pro
 conditione autem & viri-
 bus laborantis & qualitate
 humorum peccantium pur-
 gatio faciendâ. profum̃ fre-
 quenter pill. cochia, vel au-
 rea, vel aggregativæ, vel ex
 octo rebus quæ plures di-
 versosq; humores educunt.
 faciendæ verò sunt & aliæ
 diversiones. Cucurbitulæ
 dorso cum scarificatione
 affigendæ. pedes in balneo
 ponendi ex decocto ebuli,
 betonica, salvia, & florum
 chamomeli in lixivio & ad-
 dito sale.

9. Oculorum phlegmo-
 nem alvi profluvium sa-
 nat. 6. Epid.

10. Probata etiam, sine
 quibus esse nolo pill.

Pedibus autem in balneo
 positis fricanda sunt crura
 deorsum, & faciendâ hæc
 manè ventriculo jejuno,
 nec semel tantum, sed sæ-
 pius, usque dum rubor &
 dolor oculorum cessaverit.
 Perserverante autē fluxio-
 ne ac doloribus, ac istis re-
 medijs parum proficienti-

11. Alioqui pleno ven-
 triculo si fiant, humores
 ex eo attraherentur ad
 loca affecta.

12. *Torlaquis Turcæ* in cervice ulcus cau-
panno veteri temporib. terio faciendum, atque hoc
inustis humiditates ce- quam diutissimè apertum
rebri exsiccant ne ad conservandum, aut appræ-
oculos fluant. quod hensa cervicis cutis cum
Æthyopes olim etiam carne perforanda est, &
facere solebant. immittenda ¹³ cordula ex

13. *Laquei injectionem* serico aut ex cannabe, aut
hanc curationem vocat in duris corporibus ex setis
Amat. Lusitanus. alij equinis, quæ per intervalla
Setaceum, vel Setonem. movenda. sinenda verò &
Efficacissimum sanè hoc cutis hoc modo pertusa ad
auxilium, nec tã, quam aliquod tempus, donec sa-
videtur, crudele. nitatem oculi receperint.

Victus in omni vehemē-
ti cum inflammatione ac
fluxione oculorum dolore,
initio tenuis esse debet &
parcus, postea liberalior &
plenior. Cibi conveniunt
facilis concoctionis ac bo-
ni succi. A vino etiam hoc
tempore abstinendum. te-
nui cerevisia aut ptisanæ de-
cocto potius utendum.

Cessante vigore morbi
vinum tenue aut dilutum
concedi potest. lactis usus
omnino improbatur ¹⁴. ab
omnib. etiam falsis & acri-
bus abstinendum. quies uti-
lis ¹⁵. sic & mediocris som-
nus,

14. *Vt & in omni affe-*
ctione capitis.

15. *Pila lippis inimi-*
cum & ludere crudis.

nus, atque locus à fumo ac vento tutus exiguum lucis habens. Aspectus viridis aut cærulei coloris & smaragdi lapidis visus instrumentum recreat. Alvum autem respondere oportet. quod si sponte non fecerit, adjuvanda erit mollib. enematis, aut glandibus suppositis, vel ut Aëtius ait, aloë exhibenda cum brassicæ succo trita.

Vt autem ad localia veniamus si pulvis molestus fuit aqua dulci simpl. vel in qua maceratum sit semen lini oculus sæpius ablundus, vel in eum mittendus lapis ¹⁶ saphyrus tenuis & bene politus, qui sordes & pulverem ex oculo excutit, quod & facere semen scarlæ orvalæ Antonius Mizaldus scribit.

Ab alijs verò externis causis lippitudine facta, quando non omnino sicca est, sed aliquid etiam humoris ad oculum confluit utilia sunt quæ citra morsum resiccant, ut pompho-

Ex pulvere,

¹⁶. Describitur à Macro. item Valescus de Taranta refert, idemq; tribuit rubino. Quidam cui ex itinere redeunti oculi pulvere repleti omnē, v. saphyri intra horæ spatium excussit. R. Dod.

R

17. Vera tutia est pompholyx. tutia quam durum dico est spuria quæ tudiculis adheret quando æs coquitur. ligatur in nodulo & eo aquæ rosaceæ intincto illinuntur oculi.

Lea. 40. Nov. 16.
Ophthalmia
veta.

18. Vel Sief albū Rhabz. & Gummi arab. tragacanthæ, amygdani 3 i. cerusa lot. 3 i. β opij g. 7. cum ori albumine fiat collyrium. usus tempore cum lacte muliebri 3 2. dissolvantur. Mez. sarcocollam insuper habet.

19. Quamvis in magna necessitate opium, etiam admitti posset.

20. Refrigerat & dolorem sedat.

lyx lota, & 17 tutia dura præparata quæ in aqua rosacea dissolvenda; quæ aqua deinde sæpius in oculum immittenda addito vino albo tenui, si nullus in oculo calor sentiatur.

Quando verò oculi inflammatione ac χημῶσι laborant generalib. non prætermisiss admovenda erunt initio ea quæ partim dolorem sedant, partim influentem humorem reprimunt. quandiu videlicet humores profluentes copiosi ac tennes sunt. Accipiat igitur collyrium sive sieph 18 Mezes album absque 19 opio compositum, quod dissolvatur in aqua rosarum & lacte muliebri, & de ista 20 mixtura frequenter gutta una aut altera in oculum immittatur. Vtilis & mucago sem. psyllij, sem. cytoniorum & gummi tragacantha facta cum aqua rosarum cui additur lac muliebri & immittitur in oculos ut prius.

Madefiant quoque telæ
lineæ

lineæ in istis & applicentur

oculis extrinsecus, aut ex hujuscemodi muccagine &

²¹ ovi albo addito Sieph prædicto fiat ²² cataplasma,

prius tamen tela linea madafacta in ²³ lacte muliebri

oculis superposita. finendum autem cataplasma 4.

aut 5. horis, ²⁴ deinde amovendum & renovandum.

& tale cataplasma utile quoq; est in oculorum epiphoris.

Quando verò ²⁵ humores qui fluunt pauciores

fuerint & crassiores facti notam concoctionis ostenderint, fovēdi subinde oculi

erunt cum decocto seminis fœnugræci, quod & colly-

rijs & cataplasmatibus supra dictis utiliter etiā tunc ad-

miscetur ²⁶. Quando verò ²⁷ humores adeo crassi fue-

runt ut dormientium palpebræ inde agglutinentur à

primis illis collyris abstinendum; sed decocto sem.

fœnugræci & florum meliloti oculi fovēdi & abluen-

di. Commodum verò & in

²¹. Singulare in doloribus oculorum sedandis

extrinsecus admotum. Hinc Antonin. ad phi-

losophiam tanquam ad pædagogum (à quo me-

tuas) sed ut Ophthalmia laborantes ad spongiam

& orum (à quib. leniendum dolorem speres)

itandum esse. l. de Vita propria.

²². Seu Epithema potius.

²³. Seorsum admoveatur, ne molestiam pariat

dū admoveatur epithema superscriptum, quod pi-

lis sit agglutinandum.

²⁴. Ne calefactum per accidens calfaciat par-

tem. quod & in plumbo, si alicui parti admoveatur, cavendum.

²⁵. Atque tunc est augmentum morbi.

²⁶. Ut partim discutiantur, partim reprimatur

fluxus.

²⁷. In statu hæc fieri solent.

R 2

oculos guttatim tunc immittere decoctum feminis fœnugræci & sem. fœniculi in parva quantitate, cui additum sit nonnihil gummi tragacanthæ, & lac muliebri, si dolor adhuc perseveret.

28. In declinatione. ad roborandum, ut R. partes 4. aquæ rosacæ. vini unam. & paucum mastiches.

Cessante 18 autem omni fluxione & dolore oculi vino albo & aqua rosacea dieb. aliquot erunt ablundi, aut aqua fœniculi aut chelidonij.

Cōvenit verò & uti collyrio ex pompholige, aut tutia dura præparata, de quo jam ante dictum est.

Scabie verò laborantibus oculorum palpebris, quod *Pterophthalmia*, *πτεροφθαλμία* dicitur, & ex vitiosis eo confluentibus falsis humoribus fieri contingit, corpus omnino purgandum erit per aliquas ante dictarum pilularum.

Oculi verò fovendi & abluendi erunt decocto sem. fœnugræci & malvæ aut althææ. palpebræ postea illinendæ aloë dissoluta in vino

vino albo & tenui, aut in aqua fœniculi. Si autem lippitudo ista diuturna fuerit & ægrè curabilis, fumendum erit decoctum fumi terræ ex sero lactis aliquot continuis diebus, æstate quidem.

Hyeme verò ejus loco syr. de fumo terræ. & pillulæ subinde repetendæ.

Sicca verò sive arida lippitudo, qualẽ venti faciunt aquilonares, & constitutio aëris frigida & sicca, tepidis ac humentibus balneis ac fomentis etiam curatur: ut est decoctum malvæ, bifmalvæ, & seminis lini.

ξηροφθαλμία

Suffusio sive ὑπόχυμα vaporum vel humorum sub cornea tunica est collectio, pupillam obscurans. Cujus 3. sunt constitutiones. 1. Est vaporosa quædam effusio quæ spiritus visorios disgregat & obtenebrat, facitque ut muscæ, festucæ, vel alia præ oculis obversari videantur, vel alterius coloris res esse appareant quam sint.

Leet 41. Nov. 17.
ὑπόχυμα.

29. *Venas ab oculis per-
tingere ad cerebrum,
peritissimi autores tra-
dunt. ego ad stomachū
crediderim: certè nulli
sine redundatione illius,
ervitur oculus. Plin. l.
11. c. 37.*

30. *Vel ob atrophiam
nervi optici, vel sangui-
nis in illū premissosin,
vel humorū post tenuio-
rum partium dissipatio-
nem, crassitiem. Dionys.
Ægeus in Dictyacis
apud Photium in bi-
blioth.*

Atque hujuscemodi suf-
fusio quandoq; fit per con-
sensus & vitio ventriculi,²⁹
alias verò propter cerebri
plenitudinē. Quæ à ventri-
culo fit nō continua est, sed
per intervalla & circuitus
accidit, & magis vētriculo
jejuno quā post cibum sum-
ptum, & frequentius etiam
quando ventriculus malè
concoquit, quam ubi bene
concoctio cedit. Quæ au-
tem à cerebri plenitudine
procedit magis continua
est, nullo tamen adhuc ma-
nifestè apparente circa pu-
pillam vitio. Altera consti-
tutio est quum jam incref-
cente malo nubecula ali-
qua circa pupillā apparere
inceperit, & videndi acies
magis obtundi. 3. Consti-
tutio est quum pupillæ co-
lor ad albedinem conver-
sus est, & videndi facultas
abolita quæ affectio³⁰ glau-
coma dicitur. Huic vici-
na est affectio ἀμαύρωσις
dicta .i. cæcitas & absolu-
tum visus impedimentum,
nullo manifesto affectu ap-
parente

parente, & pupilla pura ac incolumi existente, in quo à glaucomate differt. Contingit autē hanc quandoque sensim & paulatim etiam fieri, subinde tamen repente & uno impetu irrui. Quæ paulatim fit priusquam confirmata & absoluta cæcitas facta fuerit ἀμβλυωπία dicitur & hebetudo siue debilitas visus.

Causa vel frigidi crassique humores, vel penuria aut imbecillitas spiritus visorij, vel tunicarū siccitas & densitas, ut post magnum morbum, vel à mœrore, vel propter senectutem fit.

Quæ subito irrui cæcitas fit à repentina nervi optici siue visorij obstructione cujus antecedentes causæ possunt esse cruditates, temulentia, & similes quæ crudos humores ingenerant.

Suffusionib. igitur à ventriculo factis exhibēda subinde est hiera picra ut Gal. suadet, ut vitiosi humores expurgentur. bona victus

31. Quare etiam barbaris Gutta serena dicta fuit. Quibusdam statim nascentibus negatus visus nullo oculorū vitio. multis repente ablati simili modo, nulla præcedente injuria. Plin. l. 11. c. 37.

Carneadi ignorant. Id oculos suffusione occæcos Diog. Laert. narrat. lucernam itaque quum afferri mandasset, & famulus allatam diceret, ut falsitatis illum, uti credebatur argueret, legere iussit.

Curatio suffusionis.

R. 4

ratio instituenda & ut ventriculus bene concoquat providendum.

Quando verò suffusio non ex vitio ventriculi, sed ex plenitudine humorum in cerebro redundantium provenit, initio & priusquam affectus invalescat corpus idoneis medicamentis vacuandum est. Vena etiam secanda si sanguis redundaverit. Cauterium quoque in cervice ponendum. Frictiones & balnea facienda ut in oculorum inflammationibus, & alvus quoque in officio continenda, ut supra dictum.

Sunt verò & hæc facienda in ἀμβλυωπία quæ non post longum morbum aut propter senectutem advenit, sed ex crudis crassisque humoribus corpore repleto vigente adhuc ætate contingerit.

Exhibenda verò etiam sunt quæ cerebrum reficere & spiritus visorios confortare valeant, quæ non modo junioribus post vacua-

cua-

uationes & diversiones factas, sed & ex gravi morbo restitutis & senescentibus. tutò dari possunt. Laudatur inter alia euphragiæ herba & fœniculi semen ex quibus in pulverem tritis addito nonnihil maceris, vel etiam cubebarum & saccaro quantum est omnium pondus fit tragema, ex quo jejunis cum exiguo albi & tenuis vini ad quantitatem cochlearis exhiberi debet. Parari verò & vinum tenue cum euphragiæ herba potest. cujus quotidianus usus oculis & visui prodest.

Collyria verò etiam initio & quum nubeculæ ante pupillam apparere incipiunt in oculos injici possunt, quæ partim discutienti ac digerendi vim habeant, partim astringendi: qualia sunt ex ³² fellibus avium ut accipitris perdicis, columbæ aut similibus, & omphacio aut succo ³³ granatorum. quibus quandoque vel ³⁴ sarcocolla in ³⁵ lacte nutrita, vel aloë ad-

Leet. 42. Nov 21.

32. Quia aliquid oportet esse quod penetret quum materia sit sub cornea tunica, sel autem tenuis substantiæ est, & magis avium sylvestrium.

33. Ad robur partis nobilis conservandum. quod commune præceptum ad omnes partes nobiles.

34. Quæ absterget & astringit.

35. Ut acrimonia leniatur & ita dolor quodammodo sedetur.

R 5

ditur. Vbi autem nubecula major facta fuerit & albugo sive glaucoma perfectū ad cumpunctionem & manus operationem veniendum, quæ ophthalmiacis committenda est.

An autem suffusi & jam glaucoma in oculis habentes per cumpunctionem restituendi sint, vel non, docet cognoscere Gal. I. de sympt. causis, ex dilatatione pupillæ³⁶ unius oculi altero clauso. nam quum uno oculo occluso alterius pupilla dilatatur recipiendi visus magna fiducia est.

36. Quia spiritus utriusque ad unum qui apertus, defertur. & tunc manifestò dilatatur pupilla. quod si non fiat obstructus
est nervus
opticus. tunc frustra cruciaretur oculus.

Amaurosis.

37. Omnia eadem die & simul facienda sunt. nam humore semel impacto, malum incurabile existimandum.

In amaurosi autem & visus obscuritate quæ subito irruit mox & sanguis, si vires ferant, mittendus est ex humeraria vena. enemata etiā acria injicienda³⁷, cucurbitulæ cum scarificatione humeris admoventur. ex cantharidib. cum fermento in acetum madefacto vesicatoriū toti cervici imponendum. crurum frictiones faciendæ. medicamenta purgantia non prætermitt-

mittenda.

Victus ratio initiò tenuis
esse debet. Posteaquam vi-
dendi facultas aliquò mo-
do reparata est, magnā sui
curam æger habere debet.
ab omni repletionē, à multi
vini usu, & ³⁸ à venere illi
abstinendum. in cœna par-
cum admodum esse oportet.
³⁹ pisces, fructos cru-
dos, legumina ⁴⁰, allium, cæ-
pas, porrum & lac vitare
etiam debet. carnes volu-
crium silvestrium non circa
aquas versantium maxime
conveniunt. Oculis nihil
admovendum ⁴¹, nisi quis
aqua fœniculi aut euphra-
giæ hos velit abluere.

Caput verò & oculos ro-
borantia utiliter dari pos-
sunt, veluti ex euphragia
tragema de quo dictū est.

Pertinet verò ad hæc
oculorum vitia nyctalops
quæ est nocturna quædam
cæcitas. hoc enim vitio la-
borantes interdum quidem
vident, sub occasum solis
obscurius, nocte verò exi-
guum aut nihil,

38. Hinc illud : Vale
charum lumen, Et illud
Martialis ; Vinū Phryx,
oculus bibit venenum.

39. Omnes enim crudos
humores, nullo excepto,
ingenerant.

40. Non crudos gignunt
humores, sed oculis no-
cent per se.

41. Ne revocentur hu-
mores ad oculos.

Nyctalops.

42. *Vt in senib. aut post magnum morbum. alias à cruditate ventriculi serè morb. non ita præceps ut in amaurosi. unde non ita festinandum.*

43. *Quia est quasi suffusio quædam.*

44. *℞ Succi chelidonij, mellis despumati ana ℥ 4. succi fœniculi ℥ 2. vini albi ℥ 1. misceantur & super calidos cineres leuiter coquantur addantur dein fellis perdicis ℥ due vel tres.*

Causa mali ⁴² vel spiritus visorij paucitas & debilitas est, vel crudorum humorum copia & redundantia.

Hæc si adsint med. purgantia subinde sumenda sunt, veluti initio suffusionis. Ratio victus & similis esse debet. cœna etiã parca. Roborantia & confortantia spiritus visorios sunt quoque utilia.

Commendantur & collyria ⁴³ non admodum ⁴⁴ acria ut ex succo chelidoniæ, succo fœniculi, & melle, & exiguo vini, quibus si addatur nonnihil fellis perdicis, erunt præstantiora.

De Angina.

CAP. 22.

169. 43. Nov. 22.

1. *Faucium dolor Angina vocatur, Festo. Synanche inflammatio vebemēs est circa Epiglossida & pharyngem, dolorifica. Iul. Poll. Hinc illud apud Plautū; Vellem me in anginam verti, quo huic anui fauces*

A Ngina ¹ dicitur affectio quæ cibi ac potus liberam deglutitionem impedit & respirandi difficultatem simul affert. hæc autem vel interior est, vel exterior & circa guttur aut cervicem apparens. Interior angina duplex est. una fit

fit cum tumore vel inflammatione circa fauces aperto ore apparentibus. altera vera citra ullum apparentem tumorem, quæ latens & occulta angina ea de causa dicitur. Tumores autem qui hiante ore apparēt sunt ut plurimum tonsillarum tumores, quandoque etiam gurgulionis. affert verò & impedimentum linguæ inflammationis tum & *Βαρεχ*. *χ* & siue ranunculus dictus affectus, sed tamen exiguum.

præoccuparē. Est autem & Angina vinaria; & Argentangina, de quib. tamen alibi dicendum. Aliquando Epidemia est, & vel Benignior, qualem nos vidimus; vel Maligna & pestilens, qualis illa de qua Cedren. testatur quod tam multos tolleret, ut superstitēs mortuis esserendis vix pares essent anno mundi 5018. anno à nato Domino 1040.

Exterior affectus est circa gutturis partes aliqua magna inflammatio, vel vertebræ colli ad interna luxatio, locum in cervice cavū relinquens; quæ gravissimum respirationis & cibi demissionis impedimentum affert. & pro deplorato malo, cui nō est remedium, habetur.

Tonsillarum autem tumores aliquando majores, quandoque minores sunt, subinde verò & una tantummodo tonsilla tumet.

Paristhymia.

2. *Bilioſi enim exulcerationem non tumorem excitarent. Melancholicorum nemo meminit.*

3. *Sed talis remanet qualis in ſanitate fuerat.*

Curatio.

Cauſa ut plurimum ſunt humores ſanguinei quandoque etiam pituitoſi.

A ſanguine ſi tonſillæ tumeant, accedit partium ad fauces & iſthum pertinentium rubor & inflammatio cum dolore, præſertim in deglutiendo: qui ad aures uſque extenditur. comitatur ſpirandi difficultas & ſæpenumero etiam febris. intenditur autem interdum tumor cum inflammatione in tantū, quod os vix aperiri queat. ſed quū à pituita tumor fit partium color non mutatur, neque inflammatio aut febris accedit. adeſt tamen in deglutiendo difficultas.

Incipiente itaque inflammatione tonſillarū ſanguis mox detrahendus eſt ex humeraria vena partis affectæ, ſi una tantummodo ſit inflammata. ſi utraque & ſanguis redundet iteranda erit detractio ex altero brachio, præſertim ſi tumores non ſubfederint.

Deinde purgans aliquod
med.

med. propinandum vel enema injiciendum.

Cucurbitulas circa humeros ac cervicem cum scarificatione admoveri utile etiam est.

4. *Quæ in debilibus quique sanguine non abundant, solæ sufficiunt.*

Gargarisinis autē & oris collutionibus utendum primum est reprimentibus & astringentibus, ut ex decocto foliorū rubi, aut summatum, fol. ligultri, cort. malorum punicorum, calicibus glandium, rosas rubris aridis cui addendum est diamorum vel ex corticibus nucum compositum quod Officinæ dianucum vocant, & nonnihil aceti. nisi qui laborant extenuato sint corpore & pectore angusto, quibus acetum addi gargarismis non convenit. Possunt verò, & gargarisini fieri ex aquis destillatis ut plantaginis, polygoni, equiseti, & similium, addito diamorum vel dianucum & similib. & sufficiunt quandoque hujusmodi gargarismi soli quando una sola consilia citra inflammatio-

5. *Quæ quandoq; manserunt in parvis inflammationibus solæ prosunt.*

Lect. 44. Nov. 24.

nem & magnum dolorem non valde tumet.

6. *℞ Fol. bismalvæ, scabiosæ ana m. j. ficus arida. N. 10. uvarum pass. glycyrrhizæ mundatæ ana ℥ β sem. lini. ℥ 2. vel ejus loco seminis fœnugraci. nucleorū ex bulbis liliorum ℥ 2. fiat decoctio ad ℥ 1. β. sepe aliquid in ore teneatur. Lac cum semine lini coctum quamvis non ita utile, in necessitate tamen illo uti possemus.*

Quando verò tonsillarum cum inflammatione tumores adeo increverint ut os aperiri nequeat & dentes ferè cohereant, neq; per alstringentia & reprimētia tumores remissi sint: proximum erit ut inflammationes ad suppuracionem perducantur. quod fiet per gargarismos maturantes ut ex decocto foliorum bismalvæ, scabiosæ, caricarum, uvarum passarum & rad. glycyrrhizæ. addito sem. lini vel fœnugraci & si fortius desideretur aliquot nucleis ex bulbis liliorum additis, quæ in aqua decoquenda sunt ad cōsumptionem ad minus tertiæ partis, atque ex hoc decocto tepido sæpius in ore aliquid detinendum & gargarizandum est. Potest verò & gargarismus fieri ex rad. bismalvæ cum caricis & uvis passis decoctis in aqua, cui ut fortior fiat, potest addi mel scylliticum.

Cata-

Cataplasma verò & foris ad collum sub mento & circa mandibulas admovendum est ex farina hordei, sem. lini, & fœnugræci, & rad. althææ decoctis & fermento veteri; quando fortius desideratur, vel etiâ nucleis radicum liliorum, quæ coquenda & miscenda sunt cum aqua decoctionis rad. althææ, deinde addenda vel pinguedo porcina, vel oleum amygdalarum dulcium, & simul aliquid. ung. dialthææ.

Abscessu autem per hæc remedia rupto, pure effluente & ore libere patente, tunc gargarismus faciendus ex decocto hordei communis non mundati: cui addendum aliquid mellis rosati, quo frequenter fauces abluendæ erunt.

Quod si verò ulcera difficulter sanescant, addi conveniet gargarismo aliquid succi vulgaris apij, vel ejus compositionis, quam vocant mundificativum ex apio. sic enim facilius ul-

7. *Ut & Rad. althææ decoctarum ad mollitiem, farina hordei, sem. lini, fœnugræci ana ℥ β. fermenti veteris ℥ 2. vel si fortius cupimus ℥ β. aut nucleorū liliorum ℥ β. miscentur & decoquantur cum aqua decoctionis althææ. quib. deinde addantur rad. althææ contuse, & pinguedinis porcine ℥ 1. vel ol. amygd. dulcium ℥ 1. vel ung. dialthæas ℥ β.*

8. *Quod fit ex succo cleoselini & melle.*

S

cera coalescent & sanabuntur.

9. Quando humor partim frigidus, partim sanguineus.

Quod si vero tonsillæ per astringentium usum & factis vacuationibus non subsideant, neque augeantur sed cessante magna ex parte rubore ac inflammatione in eodem statu tumores consistant; gargarismi parandi erunt ex digerentibus. & discutientibus, ut ex decocto scabiosæ & præcipuè ex herbæ morsus diaboli dictæ. cui si aliquid mellis rosati additum fuerit erunt gratiores. Quod si verò & majore resolutione opus sit gargarismo convenienter addetur cinis¹⁰ hirundinum ustarū, vel deficiente illo, radicis cavæ pulvis. Possunt verò & pulveres horum gutturi insufflari.

10. Tertij generis ripas incolentium quæ nidos non habent. Plin. l. 10. c. 33.

Foris verò & cataplasma imponi utile erit ex farina hordei, seminis lini, fcenugræci, floribus chamæmeli & meliloti & stercore¹¹ ex nido hirundinum, vel canino stercore albido, cū oleo & aqua

11. Ipse nidos, ut quidā putant materia magis impingeret.

& aqua decoctis. Vel potest fieri cataplasma ex stercore canino, vel ex stercore hirundinum, vel ex ipsis hirundinib. uſtis, mixtis cum melle, quod circa mādibulas collo erit applicandum.

Sed ſi humores frigidi ac pituitoſi ad tonſillas ac partes ad iſthmum pertinentes confluant tumentes citra ruborem, mox purgans med. exhibendum. inter quæ quod diaturbith cum rhabarb. dicitur utile ac commodum eſt, cujus ſpecies 3 1. aut ad ſummū 4. pondere cum tenui cereviſia, aut juſculo aliquo, addito ſaccharo exhiberi poſſunt. Et ſi opus fuerit gargarismo, uti licebit decocto folius morſus diaboli cum melle roſato. vel potest addi pulvis rad. cavæ & cinis hirundinum ut ſupra dictum 13.

Inflammato autem gurgulione atque cum dolore & rubore tumente, & cum difficultate deglutitionis, adhibendi ſunt gargarismi

Lect. 45. Nov. 256

12. Quod Arabes pro correctorio turbith. quod non pulveri qui ſitum contraheret ex humiditate ſacchari, ſed quum exhibetur, addi dicitur.

13. Tumores iſti aliquando in Schirrhū; imō materia ipſorum in lapillū abit, quales inſtar nucleos olivarum ſemel atque iterum ſcalptu unguium prorupiſſe vidimus.

S 2

14. Qualib. Columnam, ut Aretæus vocat. h.e. tumentem à radice ad extremum columellam digiti crassitiem æqualem, & ad principium Oesophagi jam descendente, curavimus. rejecta sectione ab alijs proposita.

15. Quod tamen raro contingit.

Vva.

16. Tum ad naturam illa pars livens redire non potest. sed tollendam esse certum est. In Norrvegia frequentissime columellam excindunt, magno, ni fallor, ægrorū malo, ferè enim in tabem incidere necessum est.

Gurgulio.
nis laxatio
seu colu-
mella.

astringentes & reprimen-
tes ut in principio inflam-
mationis tonsillarum ¹⁴. Et
liquidem corpus repletum
ac humorum multitudine
gravatū, sanguis etiam ex
humeraria detrahendus erit.
Sin minus, & vitiosi humo-
res redundarint, purgans
etiam med. exhibendum. Si
verò & inflammatio hujus
ad suppurationem ¹⁵ ten-
dat, maturantibus supra di-
ctis gargarismis quoq; erit
utendum.

Quod si verò longior
propenderit, & inferius
crassior ac livens ¹⁶, supe-
rius vero extenuatus, neque
ad suppurationem perducī
potuerit, & non proficien-
tibus quoque quæ ad laxa-
tam columellā conveniunt:
tunc adhibendam ait Hipp.
3. prædict. manus curatio-
nem, quæ antea non absque
periculo fieri potuit.

Laxato autem gurgulio-
ne & absque rubore, tumo-
re, ac inflammatione lon-
gius propendit, adhibere
convenit non modo astringen-

gentia, sed præcipuè resic-
cantia & discutientia. Pul-
vis hirundinū ustarum utilis
est, siue per se, vel cum mel-
le mixtus admoveatur, sic
& radix cava cum sale per-
mixta & admota. Potest
verò & multum gargarif-
mus ex 17 posca cum sale &
sinapeos semine, vel ejus lo-
co condimento ex sinapi,
quo citò laxatus gurgulio
contrahitur.

Lingua si inflammetur &
cum dolore & rubore tu-
meat: eadem sunt adhiben-
da, quæ tonsillis laboranti-
bus. & siquidem inflamma-
tio ad suppurationem per-
venerit, neq; 18 queat sponte
erūpere: scalpello aperi-
endus erit abscessus. dein re-
liqua facienda quæ in ab-
scessu tonsillarum.

Ranunculus tumor est in
ea oris parte, quæ sub lin-
gua & cui veluti vinculo
ipsa annectitur, mollis, la-
xus, citra dolorem, rubo-
rem & inflammationem,
qui supra dentes eminet, si-
militudinem referens po-

17. Vel cererisia tenui:
si quis nolit acetum. est
autem valde singulare
in affectu hoc: quæ vulgo
den buych nominant.

Lingux
inflam-
matio.

18. Quod sit quia mem-
brana involvens linguā
dura admodum est.

Ranunculus.
seu ranula
barbaris.

19. *Non in medio. ob membranam quæ alligat linguam. si ab una tantum parte, ab una tantum efflueret.*

20. *Quia uno die non possunt exhauriri humores. prohibet hæc agglutinationem.*

21. *Hæc glutinant.*

22. *Vt in illo qui ranunculo & inflammatione tonsillarum laborabat.*

23. *Qui alioqui rarissimus affectus.*

Leq. 46. Nov. 24.
Angina latens.

24. *Hanc horrendissimam Hipp. appellat.*

25. *Quod deorsum trahatur distensione arterie, in deglutitione quæ tum laesa, movetur sursum larynx.*

sterioris partis ranæ, unde nomen habet.

Curatio hujus citissimè & perfectissimè manu perficitur, scalpello¹⁹ utrinque tumorem aperiri oportet, quo aperto effluit humor mucosus, lentus, & ovi albo similis. os deinde abluendum²⁰ posca cum sale donec humor omnis effluxerit. quo expurgato aqua hordei²¹ cum melle rosato os colluendum.

Quod si quid impediat quo²² minus in ore tumor aperiri queat; sub mēto facienda sectio est. Præcedit hunc²³ affectum frequenter dentium inferioris mandibulæ dolor.

Latens ac occulta angina dicitur²⁴ quando nullo in faucib. apparente tumore, aut inflammatione cibi ac potus via præcluditur & respirationis adest magna difficultas. dolet per hanc anginam larynx sic ut citra dolorem contingi nequeat, & nec fursum aut deorsum²⁵ moveri queat nisi cum summa

summa difficultate ac labore. Causa mali est copiosus ²⁶ humor ex capite in pulmonem & asperam arteriam defluens, & ramos ejus implens atque distendens. unde fit ut distentis arteriæ ramis larynx moveri nequeat.

Curationis initium à sanguinis ²⁷ detractiōe faciendum. quæ etiam si necessitas urgeat & vires ferant, reiteranda erit. Enemata quoque injicienda & quam primum integrum fuerit medicamentum aliquod purgans exhibendum. Cucurbitulas etiā dorso ²⁸ applicari convenit. Gargarismi autem non reprimentes neq; astringentes ²⁹ esse

malo eum victum esse. l. 4. c. 4. Cæl. verò Aurelian. ex venæ sectione sub lingua tantum boni fieri non potest, quantum mali ex strictione colli; quæ fit mappa ut venæ appareant: nam strictio non fit sine maximo dolore, qui fluxionem concit. & magis. & revera quàm destillent humores non convenit sectio.

²⁹ Ita enim retento humore strangulantur ægri. utuntur omnes astringentibus. excepto uno Cælio Aureliano, idque pessimè. Archigenes etiā quamvis astringentia adhibeat; in occulta tamē angina garg. ex sinapi probat. sic & Aræta.

30. *Quo solum usus sum.*
R.D.

31. *Rarò tamē sine febre est. ac tum fieri potest ut sit sine febre quādo sanguis in tempore detractus fuit.*

32. *Non tamen adeo necessaria hæc sunt.*

Lea. 47. Nov. 29.

debent, sed dulces & expectorantes, ut est decoctum 3^o uvarum passarum vel glychyrrizæ. hydromeli, vel aqua cum saccharo decocta. Laudatur & decoctum radicum althææ & myxarum seu jujubarum, palmularum pinguium. Et si non adsit 3^a febris, admittitur & vinum mulsum, vel vinum cum saccharo; sed absque aromatis paratum. Foris collum unguendum 3^a erit oleo amygdalarum dulcium, vel oleo ex sem. lini recenti, butyro recenti absque sale, pinguedine caponis, aut gallinæ, aut aliquo horum simili: quod habeat vim leniendi & molliendi, & circumponēda lana succida.

Anginæ autem occultæ sive latēti superveniens dolor lateris, cessante magna ex parte circa collum & fauces dolore & difficultate deglutiendi & respirandi, anginā in peripneumoniam conversam esse ostēdit. Conversio autem hæc fit

fit, non quod purulenti humores rupto jam circa laryngem ³³ abscessu in pulmonem destillaverint, sed alia de causa, ex transitu videlicet humorum ad alias pulmonis partes, prius male affectas, quæ affluente humorum copia distentæ dolorem excitant, ³⁴ qui in latere sentitur. Periculosa autem & perniciofa admodum est hujusmodi permutatio. nam quibus contingit, vel citò moriuntur, vel suppurantur, ut Hipp. scriptum reliquit 10. aph. 5. particulæ.

Remedium autem ad hujusmodi lateris dolorē non aliud est, quā fomentum ex flor. chamæmeli, meliloti, anethi, folijs bismalvæ, sem. lini in sacculo cōsutis. qui in aqua decoctus expressus calidè loco dolenti admovendus est, & unctio cum ol. amygd. dulcium vel solo, vel addito ung. dialthæas, vel alio simili dolorem leniente.

Ad anginas referri po-

33. Qui magnus esse non potest, dein pus tam citò non corruperet pulmonē, nam qui ex pleuriticis empyici fiunt, quamvis maxima sit humorum copia, tamen Hipp. ait per 40. dies pulmonem adhuc manere integrum.

34. Pulmonis πᾶγὲν χυμὰ non dolet, sed membrana tensa, quam vomica rumpi periclitatur. quam semper in dolente inveni latere. Pauci autem perveniunt ad 7. diem, quod Hipp. ait. unam vetulam, quæ supervixerit lateris dolori, novi.

35. Quod non sepe prodest tamen ut satisfiat egro, aliquid faciendū, ac prohibendi ab omni frigidorum usu, ut in omni laterum dolore.

36. *Vel acicula, qualem per triginta quasi dies circa hæc loca hæsisse animadvertimus.*

37. *Quum aliquid non infixum est difficulter transit, ut cuidam qui medium dalerum deglutierat. exhibenda lubricantia ut cerevisia omnis crassa ut Gedana, decoctum extremitatum animalium, malve, altheæ, omnia jufcula pinguia. Ex frustra carnis bubulæ nervoso & crudiore suffocari quādam vidimus.*

Externa
angina.

test & œsophagi inflāmatio. quæ ab officulo aliquo veluti piscis ipsi inhærente ac pungente ³⁶ excitatur. per hujus enim inflammationem cibi & potus via impeditur, sic ut potus per nares resiliat respiratione tamen satis libera.

In hoc casu tutissimum est gargarismum in ore detinere & quantum fieri potest etiam demittere, qui inflammationem citissimè ad suppurationem perducatur. & talem quidē qualem dictum est adhibendum inflammatione tonsillarū ad suppurationē tendēte. Abscessu rupto aqua hordei cū melle rosato utendum ³⁷.

In tumore autem cum rubore & inflammatione foris circa guttur apparente, quæ παρὰ τοὺς αἰσθητὴς dicitur generales quoq; vacuationes faciendæ sunt pro conditione & viribus ægrotantis. Tumori verò cataplasmata adhibenda, non quæ reprimāt aut reperiunt, ut in inflammationū principio

cipio fieri solet, sed maturantia tantum, & humores evocantia, & inflammationem ad suppurationē perducantia admovenda sunt. nam ut Hipp. ait, tumorem in angina & ruborem foris verti bonum est.

De Destillatione ac Tussi.

CAP. 23.

DEstillatio sive κατάρρος Lect. 48. Decemb. I.
generaliter dicitur humorū ex capite in aliquam inferiorem partē influxio. quæ pro partium diversitate fluxionē recipientium nomēclaturas differentes accipit, ad oculo epiphora, ad nares coryza, sive gravedo; ad fauces & asperam arteriam, branchos, sive raucedo; ad pectus & pulmonem catarrhi ac destillationis nomen retinent, quæ multarum pectoris & pulmonis affectionum causa est, ut tussis, orthopnæa, asthmatis, phthisis & aliarum.

1. *Dianam* Χελύπδα Spartani colebant. tussire enim ipsis χελύπειν dicebatur. Clem. Alexandr. in protreptico. Huc etiam κέρυς, quam nos orillam tussim vocamus, referendus.

Contingit tamen has affectiones non semper à destillatione, sed quandoque & ab alijs causis pervenire ut suo loco dicendum.

Causæ.

2. Tum quod cerebrum instar spongiæ madentis compressum, humorem, quem continet, elidat: Tum quod ut potentia frigidum, à frigido aëre ledatur, & alimēto destinatos humores, crudos relinquat.

Causa autem catarrhi sive destillationis procathartica quidem sive primitiva, frequentissimè est externum frigus: ut à vëto Aquilonari, aut alia occasione, præsertim si præcesserit australis humida & pluviosa constitutio, ut ostenditur aph. 1 2. lib. 3. Sic & omnia quæ caput calfaciunt ut balneum, exercitium vehementius, tegumentum calidius, destillationē faciunt: si frigus postea admittatur. Antecedens verò causa catarrhi est frigidum & humidum cerebri excrementum. quandoque verò & tenuis mordax ac salsus humor.

Signa.

Frigidos autem esse humores qui destillant ostendit ipsorum copia, & sapor dulcis aut insipidus. ad hæc faciei tumor & color pallidus, corporis temperam.

frigi-

frigidum, ætas senilis, locus habitationis humidus, aëris constitutio similis, & plenior ac humidior victus ratio. Caliditatem autem humorum ostendit acris, aut falsus sapor, narium pruritus, faciei rubor, temperamentū calidum, ætas, anni tempus, aëris constitutio similiter calida.

In omni autem destillatione ad quamcunque corporis partē humores fluant, evacuatio facienda est & purgantia med. exhibenda: pro cōditione peccantium humorum, habita ratione virium agrotantis.

Curatio,

Capiti verò, quod membrum est mandans, providendum est. in mediocritate caloris conservandum, hoc est, & ab omni externo frigore diligenter defendendum.

Prodest verò & pulverem thuris, vernicis, mastiches, styracis, rosarum rubrarum seminis myrti, santalorum & similiorum resiccantium capati inspergi

3. *Vt Rosarum rubrarum Santalorum citrinorum ana ʒ 2. Mastiches, thuris ana ʒ 1. ʒ. Cubebarum, Cardam. ana ʒ 1. Misr. ʒi. omnium pulvis, qui cū gossypio q. s. in sacculo gestando in capite consuetur. Majorana stachas & similia odorata nocent odore: quamvis specie ut siccantia profint. itaq; non immiscenda. Quidam addunt corallum ut siccat.*

Lect. 49. Decemb. 2.

4. *Quia implet caput. qualitate enim promovet concoctionem humorum posset.*

circa futuram coronalem. Possunt verò & pulveres isti cum gossypio in sacculo consui qui capiti erit imponendus. Utile verò & fumum istorum gossypio aut lana excipi; quæ capiti similiter imponenda. Valet & suffitus istorum naribus exceptus, præsertim quādo humores per nares copiosi destillant. quo casu & odor feminis nigellæ in nodulo ligati utilis est. sic & pilæ factæ ex ladano, styrace, thure, mastiche, ac nonnullis aromatis addito moscho & ambra, utiles quoque esse possunt si sæpius naribus admoveantur.

Victus ratio in universum qualiscunque sit humor qui destillat ac defluat sobria & parca esse debet, & cœna etiam parcior, & tunc quidē præcipuè quando crudi ac pituitosi redundant humores. A vino abstinendū + quamdiu humores fluunt & destillatio perseveret. illa cessante licebit uti in exigua quantitate vino

vino dulci, quale est Creticum, vel alio tenui addito saccharo. modo febris absit. Potus verò defluentibus salis & mordacibus humoribus, sit decoctum glycyrrhizæ cum uvis passis, vel ptisanæ decoctum cum glycyrrhiza, vel tenuissima cerevisia. Destillantibus verò frigidis humoribus hydro-meli vel apomeli cum cinnamomo, vel gingibere decoctum, magis convenit, vel potus quem Medonem vocant. Cibus sit facilis concoctionis & boni succi, ut sunt carnes vervecinæ, vitulorum, caponum, gallinarum & similium. sorbitiones ex amygdalis dulcibus, ex pini nucleis, ex ovis conveniunt. Mediocre exercitium jejuno corpori utile esse potest. reliquo tempore quies. Subitanea æris impensè calidi aut valdè frigidi mutatio fugienda est. A cœna aut mox cibo sumpto studere scribere, & seridè in litteris occupari, nocet.

5. Non tamē nisi in exigua quantitate, alioqui siccitate nimia pectori nocet.

6. Quia humores ad circumferentiam ducit.

7. Alioqui crudi humores in corpus delati facile implerent caput.

8. Quia occupato cerebro adducuntur humores & impeditur concoctio humorum.

9. Nam quaecunque sal-
sa vel acria, mali sunt
succī.

10. Ut pillulæ ex hiera
quæ omnium utilissima.

Abstinendum est à cru-
dis fructibus ab oleribus à
piscibus, potissimum non
duræ carnis. ab omnibus
salsis & acribus, ut sunt al-
lia, cæpe, eruca, sinapi, & si-
militer ab aceto & acetosis
omnibus. Alvum lubricam
& facilem esse refert. quod
si talis spontè non fuerit ut
glandibus suppositis, vel
enematis, vel etiam pillula-
rum^{io} assumptione erit ad-
juvanda.

De Raucedine.

Raucedo.

1. Erosio gurgulionis ac
tonsillis quæ etiam ad
efformationem vocis fa-
ciunt. Talis autem rau-
cedo incurabilis est.

INTER affectiones autem
lex destillatione humo-
rum ad pectus, raucedo
una est, quæ vocis est præ-
ter naturam mutatio & de-
pravatio. Non solum autem
ex destillatione hæc fit, sed
& ex alijs causis accidere
eam cōtingit. nam vulnera
& præsertim maligna ulce-
ra, ut ex lue venerea, circa
gurgulionem & partes ad
isthmum pertinentes sæpe
numerò raucedinis & vi-
tiatæ vocis causa sunt. de
qua nunc non agimus, sed
de ea

de ea quæ ex destillatione facta est.

Ad cuius curationē factis generalib. si opus fuerit, & observata victus ratione dicta, initio offerenda sunt eclegmata non calida, sed temperata. ut ex serapio de capillis Veneris, cui si addatur syr. de papavere, citius humorum destillatio cessabit. Hac cessante, offerenda sunt quæ humores expurgent, ut syr. de glycyrrhiza & ex hyssopo. Potest verò & initio dari diatragacanthas in tabellis, deinde pill. albæ, sub lingua; quarum in officinis usus est, & diapenidion. Laudatur verò & sanum & expertum loch.

Vngere verò & superiorem pectoris partem cum oleo amygd. dulcium utile est, butyro insulso, pinguedine caponis, vel vituli vel simili aliquo.

Et si magna refrigeratio pectoris causa fuerit raudedinis, non multo humore destillante, vel destillatione cessante, poten-

2. Ne incitemus fluxum humorum.

Quidam diacodion vesperi dormituris seorsim dant. veteres sequi placet, qui interdum exhibere arteriacas compositiones, quæ omnes habent capita papaveris, & bene cessit.

3. Constant amydo mastiche, rad. iridis. unde calidiores paulo.

T

4. Qui plus potest quam
vel diacodion vel syr. de
papavere.

tis vini + haustus vesperi ad
ingressum lecti sumptus
multam ad concoctionem
humorū & eorundem ex-
purgationem facit.

LECT. 50. Decemb. 5.

De Tussi.

De Tussi.

CAP. 24.

1. Motus alij à natura:
alij à morbosa causa, ut
palpitatio, alij partim
à morbosa causa, partim
à natura: ut tussis.

2. Adeo ut quandoque
vena rumpatur & se-
quatur sputū sanguinis.

3. Humiditas tussim non
excitat quum naturalis
pulmoni humiditas. un-
de & consille institute.
neque calor nisi. siccitas
adsit.

Tussis est: motus præ-
ter naturam facultatis
expultricis pulmonis &
partium respirationi deser-
vientiū, conantiū expel-
lere quod ipsis molestiam
facit & impedimentum af-
fert. Est autē tussis aliquan-
do: vehementior & cum
multa spiritus ad exteriora
motione: aliquando exigua
& sine violentia. Ut sunt ut
plurimū quæ ex causis fiunt
externis. nam & tussis cau-
sæ quædam externæ sunt:
aliæ verò internæ sive ante-
cedentes. Externæ, pulvis,
fumus, vel aliquid casu in
asperā arteriam incidens.
acetosa, salsa, vel acria edu-
lia: & quandoque intempe-
ries aëris frigida vel cali-
da. Internæ causæ tripli-
ces

ces sunt 1. humores ex capite in pulmones & thoracem destillantes. 2. Morbus & affectio circa pulmonē & respirationis instrumenta consistens, ut pleuritis, peripneumonia, empyema, phthisis & similes. 3. Inferioris alicujus visceris tumor septum transversum comprimens + cujusmodi tussis per consensum fit, ac sicca & non vehemens est.

Humor. a. ex capite destillans vel salsus & mordax est; vel dulcis aut insipidus: & quandoque tenuis, quandoque verò lētus ac viscidus.

1. Si igitur ex quapiā causa externa excitata fuerit tussis veluti à pulvere, vel re quapiam in asperam arteriam illapsa: exhibenda erunt eclegmata quæ asperā arteriam leniant & expurgationem adjuvent, ut sunt syr. de capillis Veneris, & de glycyrrhiza, tum & ipsa glycyrrhiza manducata.

2. Eadē quoque exhibēda sūt si ab acetoso aliquo, aut acris assumpto, tussis provenierit.

4. Ut plurimum jecur quandoque etiam lien, vel ventriculus. Fit etiam lumbricis ventr. instantib. acris præterea humor in stomacho irritativam qualitatem ad fauces emittens imaginariam tussim præbet: ut fit in cardiogmo tentatis. Aëtius.

5. Præsertim qui salsus & acris, dulcis & insipidus ut plurimum lenis. quandoque tamen tenuis.

6. Atque hi syr. quandoque profuerunt puellæ, cui phaseolus in asperam arteriam inciderat.

7. Quod deprehenditur si frequenti inspiratione irritetur. Aëtius.

8. Quia calor in instrumentis respirationis ita intenditur & per totum pulmonem penetrat.

9. Atque hic diligentius agendum ne rupta vena sputum sanguinis excutetur.

10. Quod magis convenit quam piper, aut cinnamomum, quia non ita ficcum, sed magis temperatum.

11. Vel quod exsiccet, vel quod inflammationi similem affectum excutet.

3. A frigido autem aëre facta, si quidem exigua ac non violenta & sicca sit, sic ut tussiendo nihil expuatur: facile calidis aliquibus pectori admotis curatur, vel etiam sola spiritus cohibitione, ut Gal. ait. Si verò vehemens tussis fuerit, & cum magna violentia fiat, confert cumini aut fceniculi semen, 10 gingiber, nuxmoschata, crocus & similia in cibo aut sorbitione sumi, utile quoque est vinum potens vesperi potū, ut in curatione raucedinis à simili causa. Calida verò actu & pectori admovēda. deinde & unctiones ex oleis & ung. calfacientibus ut ol. liliorum, anethino, rutaceo; & si refrigeratio fuerit maxima, ex ol. de euphorbio.

4. Quod si verò aëris excens calor tussis causa fuerit; refriger. & humectantia conveniunt: ut syr. ex jujubis, & de zyzzyphis & similibus: subinde solius ptisanæ decoctum, vel tenuis cerevisia cum saccharo sufficit.

ficat. Sic & unctio pectoris cum butyro insulso, aut pinguedine caponis, vel gallinæ in aqua simplici aut rosarum lotis. Quomodo autem occurrendum sit tussi ex causa calida in acutis febribus, prius dictum est.

5. Ex destillatione autem quando originem tussis habet, si magna & vehemens fuerit; generalia nullo modo sunt prætermittenda, & servanda bona victus ratio, præsertim ubi humores qui defluunt falsi & acres fuerint.

Lea. 51. Dec 6.

12. Quod ostendit partium, ab utraque palati parte, titillatio. Aëtius.

Eclegmata verò & exhibenda refrigerantia & incrassantia, ut syr. de violis de jujubis, quibus ad reprimendum fluxum addendum nonnihil syr. de papavere, aut diacodiū Galeni, quod ex melle & capitibus papaveris fit, & quidē tamdiu quam materia falsa & acris fluxerit. Conducit verò eodem tempore syr. ex farfara: cujus hæc est compositio. & Farfaræ cum rad. Syr. de farfara. m. 2. rad. rusci, glycyrrhizæ ana ʒ. β. passularum ʒ. i.

13. Prodest hic compo-
sitio Pauli. ꝛ. Styracis,
myrrhæ, galbani, opij
cum passo fi. pillulæ.
ꝛ Sem. hyosciami, ꝛ 12
nucleorum pineorum ꝛ
6. croci. ꝛ 2. cum pas-
so vel sapa. f. pillulæ.

jubas. N. 20. nucleorum
nucum pinearum ꝛ 1. capi-
tum papaveris ꝛ 1. sem.
cyton ꝛ 1. sem. malvæ ꝛ 2.
Decoquantur in aqua. q. s.
ad ꝛ. 1. cōlentur & addan-
tur sacchari ꝛ 12. & f. sy-
rupus. Dandum & subin-
de saccharū violaceum &
diatragacanthēs frigidum.

Quod si verò tam co-
piosa destillatio ꝛ fuerit ut
& somnū impediat: tūc syr.
de papavere, aut diacodij
ꝛ β. aut ꝛ 1. ad summum,
mensurâ, hora somni vtili-
ter exhiberi possunt. vel
pill. de cynogloss. ꝛ β.

Pectus verò ungendum
est ol. violaceo, vel butyro
insulso & loto, vt supradi-
ctum. Procedente tempore,
& tussi aliquantum inve-
terata, & præsertim destil-
latione cessante, syr. expur-
gantes vel soli vel cum alijs
permixti exhibendi, vt syr.
de glycyrrhiza, de hyssopo,
vel capillis veneris.

Quod si verò humor de-
stillans dulcis, aut insipidus
fuerit & ad hæc viscidus,
ecleg-

eclegmata etiā initio quæ expurgent exhibenda sunt, vt syr. de glycyrrh. vel de hyssopo: quibus destillante humore diacodium, vel syr. de papavere admiscere utile est.

Tussi verò jam inveterata etiam syr. de prassio exhibendus, & præsertim ille qui à Paulo describitur diammarrhubij nomine. Convenit autē & diapenidion & pill. sub lingua usuales, loch sanum & expertum, & similia.

Pectus verò ungendum ol. amygd. dulci, pinguedine gallinæ, aut caponis addito croco, & muccagine vel semine lini, vel sem. malvæ.

6. Tusses verò quæ morbos & affectiones pulmonis & thoracis consequuntur non aliam quā ipsius morbi curationem requirunt.

7. Sic & quæ per cōsensum fiunt propter hepatis aut lienis tumorem: & illæ solent ut plurimum esse prænuntiæ hydropis,

14. *Profunt verò & his
rad. enulæ campanæ cō-
dita vesperi sumpta.*

15. *Theodorus Priscia-
nus, & Trotyla maxi-
mè laudant grana juni-
peri; præsertim in tussi
puerorum frigida. gra-
na autem decoquenda in
vino ad dimidium. Bo-
hemi etiam ex granis ju-
niperi cum aqua potio-
nē conficiūt, quam pau-
peres pro potu bibunt.*

8. Tusses quæ senibus ac-
cidunt, quum illorum ætati
sint familiares, non aliam
curationem requirūt, quam
bonam victus rationem
& 14 linctus sive eclegmata.
quæ expurgationem adju-
vant. Quod si tum vehe-
mens aliqua tussis senibus
molesta sit, poterit ipsis dari
decoctum tale, quale pueris
gravi ac molesta tussi labo-
rātibus. cōtingit enim pue-
ros adeo molesta & gravi
tussi aliquando laborare, ut
simul cum sputo sanguinē
quoq; excernant. ad hujus-
modi tussim talis potio cō-
venit. Bacc. juniperi ʒ β.
enulæ campanæ, glycyrrhi-
zæ ana ʒ 3. aut 4. capitum
papav. ʒ 2. vel 3. hyssopi,
marrhubij ana. M. β. uva-
rum passarum ʒ 1. f. deco-
ctio ad ʒ. 1. Ex qua dentur
puero dormituro ʒ 1. β. vel
ʒ 2. feni verò ʒ 3. vel 4. &
si necessitas major, etiam
mane tantum est exhiben-
dum.

De

De Difficultate Respirationis.

CAP. 25.

Respirandi difficultas quæ absque febre evenit triplex est magnitudine differens, vel enim non admodum magna est, vel major, vel omnino maxima. Non admodum magna Dyspnœa dicitur respirationis difficultas, per quam spiritus densior ac crebrior quam secundum naturam efficitur, non tamen valde, veluti jis contingit qui currerunt, vel montem aliquem conscenderunt. Altera respirandi difficultas quæ major est, Asthma sive anhelatio dicitur, & in hac non solum cum difficultate, sed & cum stertore & strepitu fit respiratio. & sæpenumero non nisi cervice & corpore erectis fieri potest: cujusmodi affectus orthopnœa etiam dicitur.

Tertia omnium gravissima & maxima cum ster-

Lect. 52. Decemb. 12.

1. Gal. sæpe confundit asthma & orthopnœā, lib. tamen 7. de med. secund. loca videtur distinguere.

T 5

2. *Pausanias medicus*
distante Empedocle πo-
εἰ δὲ Ἀπύρῳ scripsisse
refert ex Heracito
Diog. Laert. 30. autem
dies corpus harum abq;
respiratione & putredi-
ne (vel ut Suydas, nec
malè forsan habet, ci-
bo) servari: Spiratione
autem tales potius non
indigent, quam quod il-
lam impeditam habeāt.
Vide Gal. de loc. affect.
l. 6. c. 6.

3. *Aph. 55. lib. 7. Qui-*
bus hepar aqua reser-
tum eruperit in omen-
tum, his venter aqua re-
pletur & moriuntur. ait
Gal. vesiculis ruptis ad-
herentibus jecur, hoc fie-
ri, verum cæ ventrem
non implerent. Dum au-
tem jecur ita tumet dif-
ficultas spirandi oritur.
Adipis nimis copiosi im-
mobile onus, difficilem

spirationem, præsertim in senibus, facere solet. L. Apro-
ny consularis filio detractos narrat Plin. l. 11. c. 37.

tore & tāta difficultate fit,
 ut quasi nulla esse videatur.
 qualem in Apoplexia fortis-
 sima fieri contingit: tum &
 quandoque mulieribus ex
 utero suffocatis. * Apnœa
 autem hæc dicitur non ta-
 men quod nulla supersit, sed
 quia difficillima.

Contingit autem respira-
 tionis difficultatem citra
 febrē, fieri vel pulmone pri-
 mario laborante, vel per
 cōsensum tantomodo affe-
 cto. Per consensum autem
 afficitur pulmo, quādo he-
 par tumidum septum: trās-
 versum comprimit & liber-
 tatem respirationis impe-
 dit, ut frequenter fit in inci-
 piente hydrope. sic quoque
 & in ascite. Ita & virgini-
 bus deficientibus menibus
 dyspnœa quædam per cō-
 sensum accidit, sed non dif-
 ficilis horū affectuum dig-
 notio. tumor enim jecino-
 ris in hypochondrio senti-
 tur & alia ejus apparent

signa,

signa, + hydrops diu latere non potest. Mensium sup-
pressionē, & alia signa co-
mitantur & ipsius laboran-
tis relatione dignosci po-
test. Primario autem affi-
citur pulmo quando crudi,
lenti, ac visceri humores
pituitosi in pulmonis bron-
chia infarcti spiritus itinera
obsident; vel crudum ali-
quod tuberculum in pul-
mone asperā arteriam co-
arctans, enatū fuerit. quæ
per præterita accidētia dis-
cernenda sunt, ac cognos-
cenda, nam si cui per bo-
nam valetudinem respiran-
di difficultas supervenit. de-
inde paulatim increverit,
nihilque interim expuatur,
neque inter respirandum
stertor aut sonitus aliquis
audiatur: crudum aliquod
tuberculum, in pulmone
circa asperā arteriam ena-
tum suspicari oportebit.
præsertim si aliqua etiam
gravitas, aut ponderis ali-
quis sensus circa pulmonē à
laborante sentiatur.

*4. Vt tumor pedum &
faciei color qualis in
hydrope.*

*5. Quod, nisi circa arte-
riam asperam fuerit, sine
asthmate esse potest. ut
in Antipatro Medico,
de quo Gal. 4. de loc.
aff. c. ult.*

*6. Hinc aph. 46. lib. 6.
Qui gibbi ex asthmate
aut tussi fiunt, ante pu-
bertatem moriuntur. po-
tius legēdum cum asth-
mate. nam ex asthmate
vix gibbus quis fieret;
tuberculum enim quod
gibbū efficit in vertebra
est, quum asthma prope
asperam arteriam. Cum
asthmate autem gibbus
comprimi thoracem sig-
nificat, neque pulmoni-
bus sat loci superesse:
unde crescentes suffoca-
ti pereunt.*

*7. Aët. non magnam ab
egris gravitatem sen-
tiri ait.*

Si verò stertor aut sonitus

una cum difficili respiratione fiat, præsertim quando æger decumbere conatur, lentorum crassorumq; humorum multitudinem vijs pulmonū pertinaciter impactorum & ejus bronchia occupantium, indicium est. Contingere verò & quandoq; potest ut crassus, vaporibus infectus hybernus aër, maximè nocturnus, asthmatis & difficilis respirationis causa sit, quem non modo asthmatis, sed & peripneumoniæ causam fuisse observatum.

Lea. 53. Decemb. 13.

Curatio autem asthmatis ex crassis viscidisq; humoribus fit per ea, quæ hos ad concoctionem perducere & attenuare valeant. deinde & per ea quæ per inferiora queant expurgare. tum & per eclegmata expurgantia, incidentia, moderatè calida, substantia liquida & humida, accedente bona victus ratione.

Ad concoctionem humorum bene faciunt rad. enulæ campanæ, & fœniculi,

culi, ac petroselini. Ex herbis hyssop. scabiosa, marrubium, adianthum quod vulgo capillus veneris dicitur, tum & quorundam sententia & calamentum. Ex seminibus semen anisi & semē apij. quibus dulcia quædam sunt admiscenda ut expectorationem adjuvēt: ut glycyrrhiza, uvæ passæ, ficus. quæ in aqua decoqui possunt. decocto additur oxymeli aut syr. acetosus, vel etiam oxymeli scylliticum, si fortior, opus est. Ad expurgationem per alvum faciendam in primis utilis est agaricus, deinde & turbith, & quæcunq; pituitam ducunt. Ex compos. med. pill. de hiera cū agarico, vel his fortiores, ex agarico appellatæ, conveniunt verò & diaphœnicō, elect. indum & hujuscemodi compos. turbith recipientes. Possunt verò & decocto incoqui folia senæ, & agaricus cum modico Zingiberis, & etiā turbith, aut eidem admisceri dia-

8. & Rad. fœnic. petros.
enulæ cāpanæ, glycyrrhizæ ana ℥ β hyssopi, capilli veneris, scabiosæ. m. i. marrubij. p. i. sem. anisi, sem. apij. ℥ 2. uvarum pass. ℥ i. β. ficus. N. 6. f. decoctio ad ℥. i. Colaturæ adde oxymeli simpl. ℥ 3. f. potio pro 3. aut 4. vicibus.

Topica.

9. Hic uti possumus
Mezue syr. de prassio,
ob humida, alias Pauli
præstantior est.

10. Ego nunquã eo per-
veni ut scylliticis ute-
rer & ab ijs abstinен-
dum censeo. R. Dodon.

11. 1°. Facit compos.
amaram & ingratham.
2°. Adest opocalpasum
ut Gal. ait. quod venenũ
est. substituit Gal. pi-
per. hic non est opus.

phœnicon vel el. Indum.
Eclegmata utilia sunt syr.
ex hyssopo, ex capillis vene-
ris, ex succo scabiosæ, vel
his fortior syr. 9 de prassio.
quibus addi refert ad hu-
morum viscidorum incisio-
nem, syr. acet. vel oxymeli,
vel si major sit necessitas
oxymeli scylliticum. 10 Qui-
bus mixtura non placet ali-
quãdo syr. aliquo: aliquãdo
oxymelite vel, syr. acet. al-
ternatim uti debent. His
verò non sufficientibus
utẽdum erit eclegmate sive
loch. ad asthma inscripto
Mesuæ. quod recipit scyl-
lam assatam, rad. iridis re-
siccatas, hyss. prassium, cro-
cum & 11 myrrham, (quam
tum præstat omittere) &
mellis. q. s. ad compositio-
nem. Quo fortius est ex
sola scylla cum melle com-
positum.

Pectus verò ungendum
est cum ol. liliorum, ruta-
ceo, chamœmelino addita
cera & croco.

Victus ratio calida & sic-
ca & attenuans esse debet
qualis

qualis in dolore cap. ex causa frigida. Potus sit hydromeli, vel vinum tenue cum hydromelite permixtum. Alvus si sponte non respondeat enematis, aut glandibus adjuvanda erit.

Quod si verò à crassis & vaporibus infecto aëre asthma factum fuerit, ab externo aëre, quamdiu impurus fuerit, abstinendum. Domesticus verò ad cal. & siccum mutandus, accenso ex lignis foco querno, vel juniperino. quando haberi poterit. Utendum verò ecleg. expurgantibus & lenientibus ut ex glycyrrhiza, capillis veneris, aut ex hyssopo si febris non affuerit. Illa præsentē vena secanda erit & curatio adhibenda qualem peripneumonia requirit.

Quando autem tuberculi alicujus crudi, Phyma hippos. dicti, aut duri in pulmone enati, aut itinera spiritus obsidentis, suspitio adest, & difficultas respirationis urget, vires verò

Lea. 54. Decemb. 15.

12. Quandoq; non tuberculum sed callus est ut observatum in sectis, nullum habent rem. sed lenimenta tantum.

13. *Quæ non tollet tuberculum, sed ne inflammetur prohibebit.*

14. *Alia enim tussi molestiam tantum exhibebunt, nec quicquam proderunt.*

15. *Fit quandoq; in vena arteriali, qualem in Antipatro Gal. nos in exitu arterialis venæ è corde invenimus. R. Dod. Aliq. In lobis pulmonum fiunt, suntque nonnūquam valde magna.*

ægotantis validæ sint, & sanguinis redundantis indicia, annique tempus idoneum, non incōmodè sanguis ¹³ detrahetur. Ecleg. verò exhibenda sunt dulcia ¹⁴ & lenientia ut syr. de capill. veneris, de glycyrrh. & similes. Ab acidis autem & acetosis incisivis erit abstinentium.

Nascuntur verò & in pulmone & alijs locis ¹⁵ tubercula ab Hipp. *Φύματα*. Latinis vomicæ, dicta: non juxta asperam arteriam, aut spiritus itinera. quæ idcirco & nullam respirationi difficultatem afferunt. & multo etiam tempore occulta latent, donec vel angina, vel pleuritis vel febris etiā quandoque supervenerit. quorum occasione quum ad suppurationem tendant & erumpere conentur, dolorem excitant, qui in latere aliquo pectoris frequenter sentitur, rarius in dorso aut circa spatulas. tali dolore post anginam aut pleuritidem superveniēte angina

295

aut pleuritis in peripneumoniam ab Hipp. conversa dicitur.

Differt autem dolor iste à pleuritico, quod punctorius non sit, & subinde loco moveatur pro ratione. vid. situs ipsius pulmonis. Accidit autem non raro quando hujuscemodi vomicæ eruptionem minantur, ut & difficilis respiratio & orthopnoea accedat. Hujuscemodi autem vomicæ erumpentes mortem frequenter afferunt, aut si mors non consequatur; phthisis succedit, ut satis ostendit Hipp. aph. 10. sect. 5.

Venæ sectionem in hujuscemodi lateris dolore ex vomica eruptione minante, non videtur tutum facere, neq; etiam à veteribus, quando vel angina vel pleuritis in peripneumoniam cōversa fuit, unquam facta legitur. nam vires ex præcedente morbo fractæ sunt, & suppuratio jam facta per venæ sectionem curari nequit, fomenta potius adhi-

16. *Ut vino madefactum
lintheum patellæ, qua le-
sti calfiunt, imponatur
& sacculus vertendo
super illum calfiat.*

benda ex floribus chamæ-
meli, meliloti, anethi, & fo-
lijs althææ. addito quando-
que semine lini, quæ in sac-
culo sunt consuenda. qui
deinde in aqua coctus &
expressus loco dolenti cali-
dus adplicandus erit. Vn-
gere verò & locum dolen-
tem utile est oleo chamæ-
melino, amygd. dulcium
pinguedine caponis & si-
milibus. Quod si verò su-
spicio sit flatus quoq; simul
molestos esse, sicuti in hu-
juscemodi doloribus post
febres accidere potest: su-
pradiçtis floribus addenda
erunt sem. anisi, cumini, &
similia: & sacculus in quo
consuta rore vini 16 cale-
factus loco erit applicandus.
Prodest verò & in hoc casu
cucurbitulâ loco dolenti ci-
tra scarificationem adhibe-
re. quæ sæpenumero magnū
affert doloris lenimentum.

Quod si verò dolor per-
severet, & non intendatur,
exhibere quoq; haud inuti-
le erit ea, quæ resiccant hu-
mores in vomica contentos
quale

quale est farzæ perillæ decoctum 17. cujus 4. 5. aut 6. 3 mane & totidem ante coenam exhibendæ sunt. Utile verò fuerit & simul cum ipsis coqui farfaram, vel si morbus frigidior hyssopum aut marrhubium.

De altera orthopnœa.

Lea. 55. Decemb. 13.

Præter orthopnoeam 18 18. *Unimorbo adsignatus sum, inquit Seneca, quem quare Græco nomine appellem nescio, satis enim aptè suspirium dici potest. brevis autē valdè. & procella similis impetus est, intra horam ferè desinit. quis enim diu expirat? omnia corporis aut incommoda, aut pericula per me transierunt: nullum mihi videtur molestius, quid ni? aliud enim quicquid est egrotare est: hoc est animam agere. itaque medici hanc meditationem mortis vocant, &c. Paulatim Suspirium illud, quod esse jam Anhelitus ceperat, intervalla majora fecit, & retardatum est, ac remansit. (an. remisit.) nec adhuc quamvis desierit, ex natura fuit spiritus. sentio hæsitacionem & moram. Epist. 55.*

19. Aded ut vel ex minimo motu, vel in latus, pronum, supinumve inclinatione jamjam suffocandi videantur. hinc si restiti paroxysmo corripiantur vestiri; aut si issem exutos invadant, illis indui non possunt; sed latera pulvinaribus, caput fascia suffulti, in eodem situ permanere coguntur.

20. Æstate magis quam hyeme.

21. Ad triduum, aut ultra.

22. Paroxysmi vero causa, quod ab illis adhuc patet bronchiorum, porro obtinens humor de novo accedens humor catarrhalis, &c.

23. Ego in quadam ultra 25. annos durasse vidi. post annum vero ætatis 50. paulatim & frequentia, & vehementia paroxysmorum remittere cepisse. Athuris suffitu, quem virgo adhuc esset, hoc malum primum senserat.

mentes hæ sunt: ut etiam erecti & stantes angustia
 19 & magna difficultate respirandi premantur. In certis autem temporibus hæ recurrunt. subinde singulis mensibus, quandoq; ter aut 4. in anno, & per humidam aëris constitutionē, & 20 austro flante potius quam alio tempore. Durat autem accessio subinde diem totum, vel diutius effluēte interea ex ore crudo viscidoq; humore, quo expurgato cessat accessio & iterum libera relinquitur respiratio stanti, sedenti ut prius: sed haud quaquā decumbenti. Causam hujus orthopnœæ lentum & viscidum admodum humorem esse manifestum est, qui in remotioribus & abditis vijs latet, nec copiosus est. atque idcirco non stantibus (cum liberè explicari pulmo potest) sed decumbentibus tantummodo molestiam affert 21. Affectus longus ac diuturnus est 23 qui toto vitæ tempore ut plurimum perseverat.

quan-

quandoq; progressu ætatis
desinit, vel in alium mor-
bum, veluti in renum calcu-
lum commutatur.

Curatio admodum diffi-
cilis est ²⁴. prodest tamen
purgatio ex agarico. quæ
veris & autumnî tempore
opportunè fieri potest. Vel
aliqua alia hujus loco, quæ
puitam expurget. Sangui-
nis missio temperamento,
ætate & viribus responden-
tibus admitti potest. Ecleg.
tempore accessionis expur-
gantia & incidentia, qualia
in asthmate ex viscidis
humoribus cõveniunt. reli-
quo tempore bona victus
ratio servanda ²⁵ & exces-
sus omnes vitandi.

*24. Scopis duobus intē-
dendum. 1. ut infarcti,
lenti humores expediā-
tur. 2. Ut catarrhus ac-
cessionem faciens arcea-
tur.*

*25. Iactationem in le-
ctica profuisse sibi testa-
tur Seneca. In declina-
tione, aut intervallo
fuisse necessum est.*

De sanguinis sputo. ^{Leq. 56. Januarij 9.}

CAP. 26.

Sanguis varijs modis per
S os excernitur: ex gula: <sup>1. Propter ulcus vulnus-
quidē & ventriculo, vomiti-
one; ex faucibus & gur-
gulione, screatu: ex ore <sup>2. Gal. de loc. aff. 4.
simplici expuitione: Sed c. 6. ex cerebro & gur-
gulione tussi rejici scri-
bit quem vide.</sup>
ex instrumentis respiratio-
nis per tussim expuitur, ut</sup>

Gal. 4. de locis affect. c. 6.
Contingit autem hoc etiam
fieri, cū aliqua pars respira-
tioni dicata inflammatione
laborat: ut in peripneumo-
nia & pleuritide. sed de hu-
juscemodi sanguinis sputo
in præsentia non agemus.

Eruptio autem sanguinis
tripliciter accidit. 1°. per
anastomosin .i. apertionem
osculorum vasorū sangui-
nem continentium. 2°. pro-
pter unitatis solutionē ipso-
rum. 3°. per diapedesim
sive transcolationem, aut
desudationem.

3. Sic quasdam gravi-
das sanguinem exspuisse
vidimus, & curatas
fuisse.

Propter .a. apertionē os-
culorū rarissimè contingit
sanguinis cum tussi sputum,
& non nisi corpore valde
repleto, & præcipuè cessan-
tibus consuetis purgationi-
bus: ut per menses 3 aut
hæmorrhoides. tunc enim
sanguinem una cum tussi
excerni quandoq; contin-
git, frequētius tamen tunc
sanguis per nares erūpit, aut
per alias partes: ut per gin-
givas, &c. & ex latere ut
Benivenius exemplū habet,

Hic

Hic neq; propter diapedesin, sive trāscolationem, sanguis frequenter ex pectore ejicitur. in vehemēti tamen & molestissima puerorum illa + tussi sanguis tenuis, qui lentæ pituitæ permiscetur, per violētiam tussis trāscolatus videtur: aut ex osculis vasorū debilitatis excidisse. quēadmodum & tabescentibus quandoq; (sed tamen rarò) accidit, à quibus lenta pituita sanguineo rubore tūcta expuitur, ex sanguine tenui & acri permixto, qui per oscula vasorū acrimonia sua viam sibi patefecit. sputum autem tale falsuginem vel acrimoniam aliquā refert, & ulcus pulmonis vel nunc factum ac præsens, vel citò futurum ostendit.

Frequentissimè autem sanguinis cum tussi sputum propter unitatis solutionē cōtingit: solvitur verò unitas propter vulnerationem, contusionem, rupturam, vel erosionem: & quandoque etiam in pulmone propter

4. *Quam tinnientem vulgo, de Kinckhoeft; seu clangorosam malis dicere, vocamus.*

5. Qualem in navarcho illo fuisse necessum. qui post sanguinis sputum, vas in multos ramos divisum; dein aliud palmam longitudinē adæquans extussit, ac paulo post mortuus est.

6. Adrianus Imperator quum in venatione constam & jugulum fregisset, sanguine copiose reiecto in phthisin & hydropem incidit. quæ ipsum, & non turbæ medicorum, proculdubio perdidit. Dion. & Æl. Spartian.

7. L. Sylla animi concitatione nimia, atq; immoderate vocis impetu, convulso pectore, spiritum, cruore, ac mris mistum evomit. Val. Maxim. l. 9. c. 2. Idem in prælio dum altiore voce suos hortaretur Antigono Macedonum regi. Polyb. l. 2. in fine. Et Valentiniano Imperatori ex ira & clamore. Synd. accidisse testantur.

sphacelum⁵, sive syderationem alicujus ejus partis.

Ex pectore autem rarissime contingit propter vulnus aut contusionem sanguinem expui: nam vulnere etiam aliquo extrinsecus illato, quod ad interiores partes penetret, citius sanguis in cavitatem pectoris effundatur, quam cum tussi procedat.

Sed propter alicujus vasis, veluti venæ, rupturā, vel propter exulcerationē, vel sphacelū pulmonis sanguis cum tussi præcipuè expuitur. Rumpi autem venā in pulmone accidit, vel propter casum⁶ ex alto, vel à forti percussione, aut luctatione, vel propter vehementem⁷ clamorem, aut nimiam sanguinis plenitudinem: sed frequentius propter magnam aut validam tussim, præsertim siccam, cujus causa esse potest vel externum frigus excedens: vel quædam bronchijs pulmonis

monis inhærentia, ut calculi. Exulceratur .a. pulmo, vel propter humorē acrem aut salum ex capite destillantē, vel ab huiusmodi humoribus sanguine aliunde infecto accedente. Sphacellus autem fit, quum aliqua pulmonis pars intermori-
tur ac nigrescit.

Quando igitur cum tussi ex pectore sanguis rejicitur, & adsunt aliquæ lassitudines spontaneæ, quæ plenitudinem adesse testentur, & mensis suo tempore non responderint, nec hæmorrhoides fluere solitæ aperiantur ac fluxerint, sanguis verò qui expuitur initio paucus sit & floridus, neq; ulla præcesserit aut adsit vehemens tussis, aut destillatio falsi aut acris humoris, neque etiam casus ab alto, percussio, luctatio, vehemens vociferatio: existimandum sanguinis sputum factum propter anastomosis, sive apertionem osculorum vasorum, ac venarum sanguinem continentium.

8. Iuvenem vidimus qui lapillos tophaceos hordei grani magnitudine & forma, aliquandiu exspueret.

Lect. 57. Ianuar. 10.
Signa.

præsertim si balnei usus præcesserit. quia balneum rarefacit sanguinem, & vias aperit, ac laxat.

Aphor. 13.5.

9. Qui sanguinem multum excreat spumofum, ijs ex pulmone educitur. Vide comm. Gal.

Spumofum à spiritu pulmonis educitur, ut satis ostendit Gal. 4. de loc. affect. cap. 6.

Ex pulmone spuma sanguinea .i. plus spumæ parum sang. ex thorace sanguis spumofus. I. Huernius.

Si autem sanguis multus confertim cum tussi expuatur, præcesseritq; vel casus ab alto, vel percussio, vel in palæstra luctatio, vel vehemens vociferatio, vel valida & magna tussis, existimadum est sanguinis sputū factum propter ruptā magnam aliquam venā, præsertim si destillatio nulla falsa, aut acris præcesserit, & neque spumofum vel purulentum aliquod exspuatur, vel aliqua bronchia sputo sint admixta.

Quod si verò sanguini pus admixtum fuerit, vel spumofum quid, vel bronchij pars, vel venæ aut arteriæ tunica pars, evidentissimum est indicium ulceris in pulmone existentis. Cōsuevit autem sanguis ab ulcere pulmonis non affatim sed ex intervallis & non multus simul exspui : interdum tamen & copiosus & multus

multus erumpit. quod si non propter vehementem tussim aut aliquē casum fiat, vel similē causam fiat, magnæ alicujus erosionis, aut non exigui ulceris signum est. Sanguis verò niger, & cum eo spumosa quoque nigra, quæ adeò tenacia quandoque sunt ut in aqua non dissolvantur & spongiam quandam referre videantur, aliquam partem pulmonis sphacelo sive syderatione corruptam esse ostendit.

De sputo autem sanguinis quod erumpente accidit aneurismate, quod circa aliquam pectoris partem hæsit, non refert verba facere. illo enim erumpente mox æger deficiens ¹⁰ moritur. si aliquis sanguis defertur ad os; ille quidem paucus est. plurimus enim in vacuū pectoris spatium effunditur, ubi mortui corpore aperto reperitur.

Sanguinis sputum propter anastomosin si exiguum sit; nullam curationem requirit

10. Quod à vasis cordi proximis, & confertim in vias spirationi dicatas, irruat.

Lea, 58. Ianuarij 16.

Curatio,

mox enim cessat, succedentibus vacuationibus solitis. quæ suppressæ fuerant. sed illis diutius cessantibus, si copiosius fiat sanguinis sputum, diversiones faciendæ versus partem, unde sanguis fluere debuerat.

Veluti menstruis, aut hæmorrhoidibus cessantibus: ad partes inferiores. faciendæ autem hæ sunt per frictions, ligaturas & cucurbitulas. erit & venæ sectio faciendæ, si nec factis diversionibus sputum sanguinis cessarit. Abstinendum verò & ab omnibus quæ solitas vacuationes impedire possent, ut est usus astringentium ac frigidorum. Si autem sputum sanguinis diutius perseveraverit, & saluginem, vel similem malam qualitatem gustu referat: timor est ne pulmo exulceretur: & tunc quidem eclegm. erunt exhibenda non solum dulcia, sed & quæ lentorem aliquem habeant, ut facilius humorum acrimonia obtundi queat.

II. *Ut humores incrascentur, & meatus obliuantur.*

queat, ut est syr. de jujubis :
& syr. de symphyto. & reli-
qua facienda; quæ in ulcere
pulmonis requiruntur, suo
loco dicenda.

Si autem propter unitatis
solutionem & venæ alicu-
jus rupturam sanguis cum
tusſi expuatur: statim & ab
initio venæ sectio faciēda,
si vires ferant. & quidem
non vacuationis ¹¹, sed di-
versionis tātomodo causa:
atque ideo etiam non co-
piosa facienda, & si opus
fuerit etiam reiterāda. Ad-
hibēda verò sunt & frictio-
nes ac ligaturæ diversivæ,
etiam primo die, ac dein-
ceps frequentius faciendæ,
donec cessarit sāguinis spu-
ratio. Eclegm. quoq; ex-
hibenda sanguinem suppri-
mentia: ut est syr. de roſis
aridis cui sit admixtus bo-
lus armenus ¹³ lotus cum
aqua plantag. aut equiseti:
vel lapis hæmatitis tenuissi-
mè tritus boli loco. Pro-
dest etiam conserva rosarū
rubrarū addito lapide hæ-
matite & syr. de roſis ari-

*12. Non refert quo lo-
co, potest modo in dex-
tro, modo in sinistro
brachio secari.*

*13. Qui leniter astringit
& emplasticus est:
qua ratione magis pro-
dest, quam astrictione.*

14. *Philonij mentio non fit à Gal. forte quia calida nimis habet ut piper.*

15. *Tunc enim catarrhi & sanguis quiescunt.*

16. *Quales sunt potiones vulnerariae dictæ.*

17. *Astringunt, obli-
nunt, consolidant.*

dis. Vesperis verò ex Gal. consilio exhibendum aliquod med. opiatum veluti diaspermatum ¹⁴ quod ab ipso commendatur, utpote somnum concilians, ¹⁵ dolorem sedans, & resiccandivim habens. Hujus loco recentiores exhibent pill. de cynoglossò Nicolai, quæ similiter somnum conciliant ac resiccant.

Habenda verò & ratio efficientis causæ: nam si propter lapsum ab alto, percussionem, vel similem rupta fuerit vena, utile etiã fuerit dari potiones partim ex ijs quæ astringunt, & partim ex consolidantibus ¹⁶ quibus addenda sunt quædam lentorem habentia ut melius queant partes uniri ac consolidari, ac etiam dulcia quædam ut concoctionem sputi adjuvent, & ne aliorum acerbitas pectori noceat. Confici igitur potio poterit ex rad. tormentillæ, rubeæ, ¹⁷ consolidæ majoris, glycyrrhizæ, & ex fanicula, alchymilla,

milla, pyrola, uvis passis, Zyzyphis seu jujubis, & sem. malvæ. in aqua decoctis. quorum decocto etiā addi potest syr. de jujubis, aut de symphyto aut uterq; ex quo mane propinandus haustus erit & ante cœnam.

Si autem ex excedente & magno frigore exorta tussis, causa fuerit rupturæ, ipsius venæ, admovenda & pectori erunt extrinsecus calfacientia talia, qualia in curatione tussis à frigore dicta sunt.

Debet autem is cui vena in pectore rupta est in quiete, tranquillitate, & quantum fieri potest in silentio se continere¹⁸, & cavere omnem occasionem tussis. Aer eligatur temperatus & ad siccum¹⁹ inclinans, & citius ad frigiditatem vergens, quam ad calorem. Cibus sit facilis concoctionis aliquantum lenti succi,²⁰ ut sunt carnes musculosæ præsertim vitulorum. quorum & extrema veluti pedes & per se conveniunt

18. Quia nemo sine motu pulmonis loqui potest.

19. Quia humiditas sanguinis fluxum magis irritat.

20. Hinc Domnino Æsculapius in vestibulo templi, quod ipsi apud Athenienses dicatum, erat ad captandum oraculum dormienti, ut carnibus suillis vesceretur, consuluit. Suydas.

21. *Ex quo vena aperiri
& sanguis fluere potest.*

Lecl. 59. Ianuar. 19.

22. *Cujus indicium da-
re potest febris adjun-
cta.*

23. *Quod facit ad glu-
tinationem vulneris, &
reparationem virium.*

24. *Ne quid sit quod
lac in ventriculo cor-
rumpat.*

25. *Quod tenuius &
magis ad humanum ac-
cedis.*

vel cum capone vel galli-
na decocta. Potus sit ini-
tio aqua hordei passulis &
glycyrrhiza additis, vel jus
caponis cum ptisana deco-
cti, quæ & cibi loco esse
potest. Alvum mollem &
facilem esse convenit: ne
conatu ²¹ aliquo opus sit.
quod si talis non sponte
fuerit enematis mollibus
adjuvanda erit.

Sanguinis spuito utcunq;
cessante, & corpore ab om-
nibus vitiosis & excremen-
tis per elemens aliquod
med. vacuato, nulla inflam-
mationis ²² circa ruptam
venam aut pulmonem exi-
stente suspitione, ad lactis
²³ caprini usum erit deve-
niendum. quod mane jeju-
no ²⁴ stomacho exhiben-
dum erit: vel quod nonnul-
lis magis placet, ad usum ²⁵
lactis asinæ. Syr. etiam hoc
tempore exhibendi sunt le-
viter expurgantes, & conso-
lidantes: ut est syr. ex sym-
phyto, cui quandoque
admisceri potest ad mayo-
rem expurgationem syr. de
glycyrr-

glycyrrhiza ¹⁶ Mesues. Con-
ducit verò & vesperi sume-
re conservā ros. rubrarum
¹⁷ cum syr. de papavere, aut
sem. hyoscyami, si tussis
molesta, aut somnus diffici-
lis est.

26. Qui expurgat ma-
gis quam reliqui: quia
cum melle componitur.
quavis & alij cum
melle componantur. ve-
rum nimis vehementes
sunt.

Periculosum autem ad-
modum est sanguinis spu-
tum à vasis alicujus ruptu-
ra, vel enim in ipsa sangui-
nis effusione deficit æger,
vel in phthisin incidit; nisi
primo tēpore diligens ad-
hibeatur curatio. In phthi-
sin. incidisse ægrotū osten-
dit puris sputum sanguinis
spuito succedens, atq; idcir-
co Hipp. A sanguinis spu-
to puris sputum malum
esse, ait. aph. 15. lib. 7. sub-
sequens enim puris sputum
ulceris in pulmone existen-
tis signum est certissimum.
minus etenim periculi est à
vasis sive venæ ruptura, quā
ab ulcere pulmonis. Qua-
liter autem curādi sint qui-
bus ab ulcere pulmonis
sanguinis sputum procedit,
inferius dicendum, ubi de
phthisi curatione,

27. Quibus nōnulli mag-
no cum successu utuntur.

28. *His pulmo totus niger ac corruptus est. intectus alba membrana. totq; in eo foramina quot vicibus sanguinem expuit ager.*

29. *Quod alijs alioqui noxium foret. ad recreandas cordis vires.*

30. *Non magnum in eo periculum. nisi fortè ibi putrescens noxam daret.*

Quod autem propter pulmonis ²⁸ sphacelū accidit sanguinis sputum ut plurimum ægrum mox è vita tollit. & si id nō prima vice fiat, altera aut tertia cōtingit. nulla autem spes est vitæ, sanguinē propter sphacelum expuentibus. si verò vita aliquanto tempore intermedio producat, cibis bonis & facilis concoctionis erūt nutriendi, potestque ²⁹ ipsis vinum dulce concedi.

De sanguinis spūto ex faucibus, gurgulione ac partibus oris.

Quod si autem è faucibus, aut gurgulione sanguis expuatur, atque is sit concretus ³⁰ & ex capite delapsus veluti suppresso sãguine è naribus quandoque contingit, abstergente aliquo gargarismo uti licebit. veluti aqua hordei cum melle rosato.

Si autem propter vulnus aut ulcus sanguis fluat, gargarismis utendum astringenti-

gentibus: ut ex decocto plantaginis, equiseti, rubi, polygoni, calicū glandium, corticum granatorum, gallarum, rosarum rubr. ba-
laustiorum, sem. myrti & similium. cui addi potest syr. de ros. aridis vel myrtinus, & si sanguis his non sistatur: poterit simul cum supradictis, vel aliquibus eorum, aliquid aluminis incoqui. Utendum autem est istis gargarismis actu frigidis, non³¹ calidis.

Si autem à partibus oris sanguis fluat, vel à lingua, aut ex gingivis, posca os abluendum erit, vel vinum rubrum austerū in ore continendum, vel portulaca manducanda ut Celsus suadet. Si verò per hæc sanguis non sistatur, in ore cōtinendum erit decoctum ex astringentibus quale supra dictum est. Potest verò & locus si contingi queat, inspergi pulvere thuris, mastiches, sanguinis draconis, aut hypocystide, bolo Armeno, lapide hæma-

31. Calidum enim hæc morrhagias lædit: 5.
Aph. 16.

32. Debet ad aliquot horas relinqui, nam crustam facit, qua ablata major fieret sanguinis fluxus.

33. Natura enim donec ordinate agit non est refrenanda. sin contra, inhiberi potest.

LeA. 69. Ianuar. 20.

34. Si astantes stupidi non possint indicare num spumens, vel vomendo sit ejectus: ex fecibus animadvertetur. nam si fuerint nigra: ex ventriculo exomuit.

thite; rosis rubris, balau-
stijs, vel aliquibus horum,
addito alumine usto, vel si
major necessitas vitriolo
usto. Si verò etiam adeo
copiosus è faucibus aut
oris partibus erumpat, ut
agrè filti queat, diversio-
nes etiam faciendæ erunt
per ligaturas & frictiones
brachiorum, & per cucur-
bitulas spatulis ac collo ad-
motas. Abstinendum ab
omnibus acris ac mor-
dacibus.

Considerandū verò etiam
est an huiusmodi sanguinis
fluores in aliquo morbo
accidant febrili. nam qui in
morbo aliquo, qui febrem
habet conjunctam, contin-
gunt, & in die superveniant
critico ³³, non sunt temerè
reprimendi.

De Vomitu sanguinis.

Ex ventriculo, ut dictum
est, sanguis vomitione ³⁴ re-

jicitur, rarissimè autem ab
num spumens, vel vo-
mendo sit ejectus: ex fecibus animadvertetur. nam si fue-
rint nigra: ex ventriculo exomuit.

ipso

ipso ventriculo aut ejus aliqua parte læsa. frequentissimè enim, qui vomitione profūdatur, in ipsum aliunde prius influxit. & talis niger ac crassus esse solet, & admodum copiosus ³⁵ &

35. Vnde & aliunde influere colligi potest. ipse enim ventriculus exanguis.

cum magna vehementia vires valde dejiciens vomitur adeo: ut & multi in ipsa sanguinis vomitione deficient ac moriantur.

Influit autem sanguis in ventriculum: vel ex jecinore: vel ex liene malè affectis. aliquando ex venis, mulieribus quidem quando menses non respondent. A jecinore sanguinè effusum ³⁶ ostendunt præcedentia: ut faciei color ad luteū vergens, hypochondrij dextri tumor aut dolor, frequens sitis & calor præter naturam, præsertim si multa frequensque vini potatio accesserit. Deficiunt autem ut plurimum in ipsa vomitione qui sanguinem ab hepate profundūt, quod & in Coacis scriptum reperitur his verbis: Qui san-

36. Hunc aliquando minus nigricantem, vel potius ichorosum dum circa ventriculum haberet gravissimas angustias intulisse vidimus; à quibus, illo copiosissime Vomitu profuso, statim æger liberabatur.

37. Ob crassitudinem guinē³⁷ spumofum³⁸ spuunt spumofus quodammodo hypochondrium dextrum videtur. dolentes ab hepate spuunt,

38. Abufivè, pro Vomunt. sic quum de educatione sanguinis è pulmone ageret, dixit Vomunt, pro tussiendo ejiciunt.

39. Ex liene prodijſſe, ſi tumor ſiniſtri hypochōdrij vomitione ſubſideat, conſtabit. Archig. apud Aët. cap. de ſang. ſputo.

40. Lien enim non eſt pars vitæ tam neceſſaria quam hepar.

41. Videtur hoc tempore Hipp. eveniſſe quod inteſtina non eluerent. fieri enim non poteſt ut ſanguis in inteſtinis putreſcat & febris non excitetur.

42. Mulier quædā, quæ ex vomitu ſanguinis in Aſcitem incidifſet & poſtea ſibi ab eo liberata videretur, in vomitum rurfus incidit, ac defecit. R. Dodon.

& moriuntur.

2. A liene autem ſanguinem per vomitum ejectum proveniſſe, indicat color faciei multo tempore pallens ac lividus, & in ſiniſtro hypochondrio tumor³⁹, aut durities. Deficiunt & quandoq; hi, ſed rarius in⁴⁰ prima, in altera verò, vel tertia, vel poſt ſequente alia, frequentius. in quarum aliqua ſi non deficiant: tandem in aſcitem incidunt, quod videtur & Hipp. prothetic. lib. 2. obſervatum habuiſſe: Cui multus, inquit, ſanguis furſum ac deorſum eruperit, & febris⁴¹ inſuper acceſſerit, eum multa aqua repletum iri timor eſt. atque hic hydrops breviffimi temporis eſt, & ex⁴² quo pauciſſimi evadunt. Additur ab Hipp. ſi febris acceſſerit; ſed ex liene ſanguine profuſo etiam abſq; præcedenti febre frequenter accidit Aſcitē ſubſequi.

qui. cui nō esse remediū sæpius memini observatum.

Recurrunt autem sanguinis ex liene vomitiones incertis temporibus⁴³, subinde paucis, subinde multis mensibus intermedijs.

3. Si autem propter menstruum suppressionem⁴⁴ sanguinis vomitus mulieribus accidat, non hypochondrij alicujus dolor aut tumor præcessit, sed quandoque faciei color pallidus & difficilis in ascendendo respiratio, & alia retentorum mensium signa. Contingit verò & quandoq; hujusmodi vomitum cum magno impetu ac violentia fieri & vires dejicere & lipothymiam ac periculum inducere. In Coacis tamen legitur. sterilibus & non parientibus sanguinis vomitum⁴⁵ ad conceptionem prodesse.

Curatio.

Quod si igitur sanguis ex vulnerato⁴⁶ aut læso ventriculo efferatur exhibenda sunt familiaria ac

43. Prout nimirum bono vel malo regimine utuntur.

44. Hipp. in epid. non videtur aliam in mulieribus causam agnovisse: Mulieri sanguinem vomenti menses substituisse necesse est. lib. tamen 1. de morb. mul. ex partu etiam fieri agnoscit.

45. Quia natura onere liberata, ad menses protrudendos est expeditior. ijs exclusis ad conceptum aptiores.

46. Vt cuidam, qui vulnus ad xiphoidem cartilaginem acceperat & tamen sanatus fuit licet. Hipp. hoc lethale pronuntiet. 6. Aph. 19. R. Dodon.

X 4

grata, quæ vomitum supprimant, cura vulneris interim non neglecta.

Sed quando is, qui aliunde influxit, vomitione refunditur: frictiones, ligaturæ crurum, brachiorum faciendæ sunt. & viribus consulendum odore aromaticum, & generosi vini exhibitione, veluti vini aromatit, si haberi potuerit.

Ventriculi ostium ol. masticino, cydon. vel myrtino inungendum. syr. ex rosis aridis, aut myrtinus exhiberi quoq; poterit. Abstinere autem ab ijs oportet, quæ ori ingrata nauseam & vomitū⁴⁷ excitare possent. tutissimū est jusculis astringentia quædam admiscere: veluti rosas aridas. quæ cum capo, aut pullo gallinaceo coqui poterūt, primis diebus cibi ac potus loco futura. Postridie, aut ad longissimum tertio die, si alvus non spontè respōderit, enemate aliquo facili expurganda erit, ne sanguis concretus in intestinis putrescens,

47. Præstat enim istum ventriculo cōcludi, quā evomi. fluxus enim magis cōcitaretur. sanguis verò thesaurus vitæ est. descendunt tamen ad intestina cum fecibus.

cens, febrem excitet. in hujusmodi enim profusione non omnis sanguis sursum evomitur, sed pars ejus quædam ad intestina descendit.

Si autem æger enema sibi iniici non patiatur; poterit dilutum rhabarb. exhiberi. quod non solū, quod vitiosum est, expurgat, sed & roborat partes debiles astrictionem relinquēs, & præferendum est mannæ & cassiæ, quæ vomitum & nauseam excitant.

Sedato vomitu, ac repurgatis intestinis, ac viribus reparatis, si ex ⁴⁸ liene profusio facta fuerit: huic erit providendum & victus ratione idonea, tum & unctionibus, aut emplastris foris admotis: ut ol. capparorum, ung. aut empl. ex ammoniaco. Vtilissimus autem in hoc ⁴⁹ casu absinthij vulgaris usus est, quocumq; assumatur modo: vel in vino aut in cerevisia maceratum, vel in forma syr. aut conservæ,

⁴⁸. Nam qui ex jecore vomunt, plerumque moriuntur.

⁴⁹. Quo etiam servati quotcunque evasere. roborat autem viscera ac nonnihil absterget.

Si autem propter menses retentos mulieri aut virgini sanguinis vomitio facta fuerit, represso vomitu viribusq; reparatis, observata bona victus ratione, erit vena pedis interior juxta talum aperienda & abstinendum ab ijs quæ menses remorari possent. Mensibus verò suo tempore succedentibus sperandum est ab omni periculo vomitionis sanguinis deinceps tutas futuras. Contingit tamē & non suppressis mensibus mulieres quandoque sanguinem evomere. quod ipsis vel à jocinore, vel à lie-ne quoq; accidit, & ex signis supradictis, tamen ex non suppressis mensibus cognosci potest. adhibenda tunc & istis remedia prius dicta.

De Hæmorrhagia.

CAP. 27.

Lea. 61. Januar. 23.

DE sanguinis è naribus fluore, qui in febribus supervenerit, ante dictum.
nunc

nunc de eo qui ex alia causa mediocritatem excedit.

Causæ autem hujus fluxus vel externæ vel internæ sunt. Externæ ut casus, percussio, vehemens exercitium, diutina sub sole mora. Internæ, nimia sanguinis redundantia, vel ejusdem vitium. Refert autem non parum an continuus sit sanguinis fluxus, an intermittens & per vices recurrens.

Continuus ex quacunque causa, periculum evidens mortis affert: nisi sistatur. Vena media aut interna secunda erit, si vires ferant ægri, brachij quod è directo est naris sanguinẽ fundentis. Ligaturæ etiam faciendæ sunt ac frictiones brachiorum, femorum, & crurum. Cucurbitula etiam hypochondrio, si non cesset fluxus, quod è directo est, erit admovenda. utiles quoque collo sunt ac spatulis appositæ cucurbitulæ, cum scarificatione etiam, si vires ferant.

1. *Attila ob Honorie Valentiniani sororis nuptias convivia exercens, dum tantum vini quantum nunquam antea in simul bibisset, cum supinus quiesceret, eruptione sanguinis, qui ei de naribus solitus erat effluere, per fauces quod impediretur illapsi, suffocatus & extinctus est. Paul. Diacon. l. 15. Iornand. dereb. Gothicis.*

2. *Septuagenarium, triginta libris sanguinis per nares effluxis, convaluisse tamen, & decem annis superstitem fuisse referebat Niger med. Patavin. anno 1587.*

Fronti imponenda spon-
gia frigida, posca madefa-
cta; vel calaplasma ex bolo
cum ovi albo, & aceto ro-
faceo, si haberi potuerit.
quod quam citò incaluerit
amovendum, substitutò al-
tero frigido. cui si addatur
succus plantag. polygoni
aut bursæ pastoritiæ, aut
herbæ ipsæ contusæ, effica-
cius erit.

Quod si nec sic sanguis
fluere desinat: linamentum
sive turunda narib. imponi
debet imbuta pulveribus
astringentibus cum ovi al-
bo permixtis: ut pul. thuris,
boli, sang. draconis, hypo-
cistidos, lap. hæmathit. cui
si addatur alumen ustum
efficacius erit, ac magis
astringet. Debet autem tu-
runda adeò longa esse ut
ad ostium venæ sangui-
nē profundentis pertingat.
deinde & fasciola liganda
ne excidat. Quod si pul-
veres supradicti non suffe-
cerint; addendū vitriolum
rubefactum. quod & ipsius
turundæ cacumini illini po-
terit.

terit, instar cauterij autem hoc crustam facit, atq; idcirco hoc admoto turunda citò eximi non debet; sed sinenda ad 3. usq; diem. si prius eximatur, periculum erit ne crusta ablata iterum sanguinis profusio major sequatur, quā antea, osculis venarum magis patentibus 3. Quæcunq; autem fluente è naribus sanguine adhibentur, siue cibi siue potus: omnia actu frigida esse debent. expedit & locum esse frigidiorum in quo æger decumbit. Caput etiam erectum hunc tenere convenit. Fugiendæ sunt omnia calidiora & excalfactia. Vinum etiam non dandum nisi dejectæ vires postulent.

Sanguinis autem per nares fluxu per vices recurrente, si adsint sanguinis redundantis signa, optimum ac præstantissimū: sanguinem detrahare. etiam sæpius, si fluere non desinat. Adhibita victus ratione quæ nec excalfaciat nec

3. Propterea quod crusta ex partium illarum adustione fiat, quæ vasis incumbunt.

multum sanguinem generet, ut sunt vinum, ova, carnes teneriores. à quibus idcirco abstinendum.

Quod si autem non copia in causa fuerit, sed ejusdem vitium & tenuitas, & signa adsint superabundantis bilis: corpus med. purgante bilem, expurgandum. Abstinendum verò & à vino ac omnibus calfacientibus: ut aromatis & quibuscumq; acrimoniam habentibus. Non præsentibus signis bilis, sanguine tenui & aquoso existente: mediocriter calidorum usus, & vini dulcis ut Cretici, aut rubri nō est inutilis. Cōveniunt in utroq; casu cibi lenti succi: ut pedes & carnes musculosæ animalium, & similia his.

Perseverante autem hujusmodi fluxu, metuendum ne Lienteria aut Hydrops succedat, quod & Hipp. 1^o. proret. ostendit: Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alvi malè afficiuntur: si non urinæ concoctæ fuerint.

De

De Pleuritide.

De Pleuritide.

CAP. 28.

Lect. 62. Januarij 24.

Lateralis dolor, de quo
Lagimus, ille est qui cir-
ca partes thoracis, quæ ipsis
costis circūscribuntur, con-
sistit. Causæ circa has par-
tes doloris quædam exter-
næ esse possunt ut casus,
percussio, & similes. sed ex
talibus causis dolores ad
præsentem tractationem
non pertinent. de eo enim
lateris dolore, qui citra ta-
les causas, & potissimum ab
internis causis natus est
nunc dicendum. quem La-
tini veteres medici propriè
lateralem dolorem: Græci
verò & hæc ætas Pleuriti-
dem vocat.

Est autem Pleuritis vel
legitima sive exquisita, vel
notha sive spuria. Exqui-
sita pleuritis inflammatio
est intra 2 membranam in-
trinsecus costas & latera
succingentem nata.

Signa hujus sunt dolor
vehementer pungens, re-

1. *Telum lateris dolor
est, dictum, quod corpus
dolore instar gladij
transverberat. Isidor.
l. 4. c. 6.*

2. *Quæ tamen ab exter-
nis quandoque irritant.
Sic Agron Illyriorum,
quum devictis Æealis
perpotationibus & con-
vivij indulgeret, in
Pleuritidem sibi fune-
stam incurrit. Polyb.
l. 2. Athen. l. 2. Ælian.
l. 10. variæ histor. 2.
Non ipsius membranæ.*

3. *Non tamen in nostris corporibus hoc veritatem habet.*

4. *Quandoq; vigesimo primo die, ut in Anaxione. cujus meminit Hipp.*

5. *Non simpliciter nigrum. neq; enim ex syn-cera melancholia.*

spirandi difficultas, tussis aliquando initio sicca, verum non diu talis, sed cum sputo eoque etiam sæpe & citò cruento: febris acuta non intermittens: pulsus durior quam pro natura, in duris etiam corporibus: ferratilis.

Oritur autem hæc inflammatio à sanguine & ut plurimum à bono, aliquando verò & ex bilioso, rarius ex pituitoso, rarissimè autem ex melancholico sanguine. Ex sanguineo humore pleuritide facta sputum citò cruentum redditur. si ex bilioso, flavuum aut sublu-teum expuitur. tardè verò & minus sanguine tinctum * procedit: si ex pituitoso sanguine nata fuerit pleuritis. tardissimè autem succedit, quando ex sanguine melancholico pleuritis originem habet, atque hoc ipsum atro ac nigricante sanguine tinctum. Refer-tur autē pleuritis ab Hipp. inter morbos qui hyeme potissimum oriuntur. non tamen

tamen incipiente hyeme,
nec vigente, sed desinente
& circa veris initium ferè
supervenit. Propensi ad
hanc sunt juvenes & mediæ
ætates multo sanguine abun-
dantes. Hi enim si post la-
bores & exercitia calfacti
se se frigido aëri exposue-
rint, facile pleuritide corri-
piuntur. qui verò natura
sunt frigidiores minus huic
morbo obnoxij sunt: veluti
acidum ructantes. quos
Hipp. in aph. 36. lib. 6. non
valde morbo laterali corri-
pi, reliquit scriptum.

Affinis autem & quo-
dammodo similis pleuritidi
jocinoris apparet esse in-
flammatiō, sed discrimen
ex eo percipi potest: quod
dolor inferius hæreat, nec
supra spurias costas exten-
datur, & non punctorius
sit, sed magis 7 gravativus,
neque respiratio multum
læditur, & tussis si quæ adsit
sicca sit & arida, absq; spu-
to. pulsus verò & minus du-
rus, faciei autem color pal-
lidior, & quandoque ex-

6. Quod forte ventus
ad thoracis cava pene-
trans cogat sanguinem
in grumos: unde inflam-
matio.

Inflammatiō Hepatis.

7. Ob partis stupidum
sensum.

8. Omnes verò thoracis
affectus benè coloratam
reddunt faciem.

Y

crementa alvi liquida ac subcruenta, ac loturæ carniū similia, quod tamen non semper accidit.

A legitima autem ac exquisita pleuritide non parum etiam Notha differt. dolor quidem circa thoracis partes consistit, sed in musculis intercostalibus externis inflammatio est, quæ & admotis digitis dolore intenso percipi ac sentiri potest. quæ ubi da supurationem venerit, inciditur ac aperitur, si non sponte eruperit. febris hanc nulla, vel parva comitatur. respirationi exiguum accedit impedimentum. tussis nulla nisi fortè exigua, arida, pauca: pulsus neque tensionem, neque duritiem habet.

9. Quod nervosæ partes, ut Pleura, minus afficiantur.

10. Nam sæpenumerò afferunt dyspnœam, non dolorem: nisi repenti influant.

Ad pleuritidem notham refertur & ab Aëtio excrudatibus, & cibis crassos ac pituitosos humores ingenerantibus originem habens affectus. quando enim tales humores repente in vacuum spatium pectoris, atque in ipsum pulmonem sese

fese ingesserint, multitudi-
ne sua subcingentem latera
intrinsecus mēbranam di-
stendentes dolorem inte-
runt, talem quidem ut inex-
pertis pleuritidis imagina-
tio exhibeatur, & spiritus
vias intercipientes vehe-
mentem spirandi difficul-
tatē inducant. supini autem
sic affecti ferè decumbunt:
ut plurimum quoq; non fe-
bricitant " & frequenter
frigidius solito eorum cor-
pus reperitur. si feбри affi-
ciātur, debilissima hæc est,
minimè siticulosi sunt, ac
pulsus eorū parvi ac tardi.

Huc referri potest & ille
lateris dolor, qui quandoq;
phthificis omnino extenua-
tis molestus est: febrem hic
etiā nō intendit & propter
conceptum aliquem flatum
frigidū oritur, " ac pulmo-
nis, subcingenti membra-
næ, adhærentis, signum est.

Exquisitæ pleuritidis cu-
ratio à sanguinis " missione
auspicanda, detrahendus

11. *Quia materia fri-
gida est.*

12. *Vt in D. de l'aube-
spine cui pulmones pu-
tres costis adherentes
cum ulcerib. varijs. in
cons. Fern. consil. 20.*

Leç. 63. Ianuarij 26.

Curatio.

13. *Enema 1º. immitti,
ut quidam volunt, non
debet, neq; enim tamdiu
cessandum in mittendo sanguine, potest tamen post injici.*

Y 2

14. *Quam tanti fecit ut etiam naturalē fluxionem neget prodesse nisi è directo fiat. sic Ledi etiam quibus tumente liene è dextra nare fluit.*

15. *Vt plurimum autem initio niger est.*

autem est ex vena interna aut media brachij: quod è directo¹⁷ est lateris dolentis, ut Hipp. fecit, in quo & Gal. consentit, qui pleuritici, ut ait, quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio clarissimam sæpe utilitatem attulit. quæ verò ex brachio opposito: aut omnino obscuram: aut certè post temporis intervallum.

Copiosè autem detrahendus est sanguis, & eoque auferendus, si vires patiantur, donec color ejus mutetur & rubicundior¹⁸ fluxerit: aut ut Hipp. donec pro rubicundo & puro, lividior vel nigrior factus sit.

Missio sanguine, si alvus dura non responderit, leniens aliquod enema injici ex re erit.

Quod si vires copiosam sanguinis detractionē non sustinuerint, & dolor se non remiserit, reiteranda erit venæ sectio & ex eadem vena, vel ex vena ejusdem manus, quod & faciendum etiam

etiam, si post largam sanguinis missionem non multò minor sit factus dolor. Reiterari autem & venæ sectio in magna necessitate eodem potest die. secus unam aut alteram diem intermittere præstat.

Post sanguinis missionem locus dolens sæpius ungendus erit oleo amygdal. dulcium, vel pinguedine recenti caponis, aut gallinæ, vel butyro recenti insulso, aut si illud non est præsens butyro loto cum aqua simplici, vel cum aqua decoctionis hordei, vel cum aliquibus horum permixtis; addita exigua cera, aut pinguedine vituli, ut sit instar linimenti.

Quod si causa doloris frigidior fuerit, addi poterit oleum chamæmelinum, vel anethinum, vel ung. dialthæas. addi etiam potest muccago sém. lini & fœnugræci, aut muccago rad. althææ. Quod si verò tales unctiones non succerint, utiliter lateri dolenti

16. *Atque hæc tutissima via. non epithematis, neque fomentis, usus autem ijs Hipp. non ut curret, sed ut cognoscat. præterea quod fit per fomenta & epithemata: violentè fit. non fert hic morbus.*

17. *Rad. alth. decoct. in aqua ad mollitiẽ ℥ 2. farina hordei ℥ β. flor. chamem. & meliloti ana. M. β. cum aqua decoctionis rad. althææ misceantur & f. cataplas. addito ol. amygd. dulc. & chamemel. ana ℥ 1. cui adduntur in causa frig. sem. lini & fœnugr. ana ℥ β. & tantundem dialthæas.*

admovebitur ¹⁶ cataplasma, præsertim morbo in vetustatem abeunte: ut ex rad. ¹⁷ althææ in aqua decoctis addita farina hordei, & nonnihil florum chamemeli ac meliloti, & postquam coctum fuerit; ol. amygd. dulc. & chamemel. admixtis. Si causa morbi frigidior fuerit & sputum ægrè procedat: addi potest cataplasmati sem. lini & fœnugr. & ung. dialthæas.

Exhibenda quoque sunt eclegm. sputi concoctionem promoventia: ut initio syr. de violis addito syr. de capillis veneris, vel si materia omnino tenuis fuerit, syr. de jujubis. Procedente tempore syr. de glycyrrhiz. Mesue, vel solus vel cum alijs permixtus dandus. Sub finem verò syr. de hyssopo. Posset verò sputum & adeo crudum & contumax esse, ut difficulter & cū labore procederet. quo casu supradictis syrupis, vel syr. de succo limonum vel acetos.

tes. simplex, aut oxymeli
simplex admiscendum.

Vtilia quoque eclegm.
diatragacanthæ & diape-
nidion.

Purgans verò & aliquod
med. intermedio tempore
exhibere convenit, non ta-
men potens, sed familiare
ac non ¹⁸ vehemens. quod
videlicet humores circa in-
testina & primas venas hæ-
rentes tantummodo expur-
get. ut sunt manna, cassia
fistula, syr. ex frequenti in-
fusione rosarum, diacathol.
& quæ similia: quæ vel per
se dari, vel cum decocto
violarum, uvarum passar.
glycyrrhizæ, hordei, sem.
melonum misceri possint.
in quo decocto si non nihil
rhabarb. fuerit infusum,
med. futurum erit utilius.

Victus ratio initio tenuis
esse debet, ut ex cremore
ptisanæ, vel lacte amygd.
dulcium, vel pane loto .i.

¹⁹ pane cum aqua & sacca-
ro hordei. Procedēte tem-
pore paulò plenior conce-
ditur: ut pullus coctus cum

¹⁸. Non enim possibile
ut per alvum vel vom-
itum, quod in pectore
est, expurgetur.

¹⁹. Vel etiam pane cum
tenui cerevisia addito
saccharo: quod nostri
bierenbroodt appellant.

ptisana . Potus sit ptisanæ decoctum cum uvis passis & glycyrrhiza.

Abstinendum ab omni frigido non modo aëre, sed & cibo ac potu, & alio quocunque, donec omnis fuerit sedatus dolor, & pectus plene expurgatum. Somnus si non successerit syr. de papavere vel diacotion dormituris exhiberi poterit.

Leſt. 64. Ianuar. 27.
Prognosis.

20. Quia in morbis acutis materia turgēt; & alias alio transfertur. ut in cor Trajecto lateris miseri, capitisque dolore. Horat.

21. Aph. 7. aph. 11. quia major morbus & vicinior cordi. deinde quod debilitato supervenit.

22. In omni affectu pulmonis magis rubet facies quam in laterum, & in laterum affectu magis quam in iocinoris.

Pleuritis morb. est acutus cujus incertus est exitus. non raro mortē terminatur: præsertim accedente errore aliquo. quandoq; cum crisi ad salutē desinit. permutatur & aliquando in peripneumoniam. succedit ei nonnunquam empyema .i. puris in thorace collectio. Pleuritidem autē in peripneumoniam transire malum esse Hipp. ait. cujus sunt signa febris, quæ remiserat, major facta, calor quā antea intensior, faciei color rubicundior, respiratio quæ fuerat liberior iterum difficilior redita,

pita, sputi retentio, & lateris doloris intensio, non tamen punctorij & sæpius alio quã antea fuerat loco. Expectandum. a. fuerit empyema, si in 14. diebus pleuritide laborans non fuerit per sputũ expurgatus. quod tamen non ²³ semper, sed quandoque pleuritidi supervenit, & non prius quam post 14. diem. cessat tunc dolor ²⁵ lateris, desinet & febris, sed non in universum. exigua enim quædam remanet, & pus expuitur aliquando purum, aliquando faculentum. Bonum autem in omni pleuritide sputum citò ac facile expui. quo enim citius prodierit: eo morbus brevior futurus est. si tardius appareat: in longius morbus protrahitur. Sputum autẽ optimum est, quod cruentũ & valde permixtum ²⁶ apparet: deterius quod non valde permixtum, quodque flavum aut ruffum, albũ, viscidum & * rotundum, ut Hipp. ait, inutile est. malum autem

²³. Si enim potuisset exire liberè; non facta fuisset permutatio.

²⁴. Vt 3^o. epid. in Anaxione. qui non est suppuratus factus.

²⁵. Quia nulla tensio membrana, abscessu jam rupto, superest. Atq; ex hoc ægri quandoq; spem bonam, sed fallacem, concipiunt.

²⁶. Non enim fieri potest ut non una exspuatur pituita. quod si non permista sint; imperfectæ concoctionis signum est.

* Significat enim humores frigidos & calorem magnum.

Y 5

27. *Ratione expurgationis criticæ. quæ per alvum etiam fieri potest à natura.*

valdè viridè; atq; hoc etiam deterius, quod nigrū. Iam & malum est pleuritide aut peripneumonia laboranti adveniens alvi profluvium ut Hipp. ait. significat enim, ut Gal. interpretatur, hepar per consensum ita malè affici, ut præ imbecillitate non queat ad se attrahere altimentum, neq; id in sanguinem convertere. Potest tamen prodesse alvi profluvium ²⁷ ratione vacuationis, apparentibus signis concoctionis, & morbo non vehementissimo.

Spuria Pleuritis.

Spuria pleuritis sanguinis missionē non necessario requirit. sed tamen si adsit repletio, & vires ætasq; cōsentiant; utiliter etiā vena secatur, veluti & in omni lateris dolore ex casu, aut percussione, aut simili externa causa: præsertim si febris qualiscunq. accesserit. Eclegm. in spuria pleuritide non est opus, sed leni medicamento corpus utiliter quoq; expurgatur. Locus dolens
oleis

oleis supradictis ungen-
dus. cataplasma & eidem
simile imponi potest. quod
si verò ad suppurationem
inflammatio tendat: adju-
vanda erit suppuratio cari-
cis rad. liliorum, & fer-
mento cataplasmati addi-
tis. Vbi ad suppurationem
venerit, si non sponte erupe-
rit, abscessus incidendus &
aperiendus erit. reliqua de-
inde curatio facienda, qua-
lem abscessus requirit.

Sed si à casu, aut percus-
sione dolor factus fuerit:
initio ungenda pars læsa
ol. rosato, vel myrtino; aut
utrisque simul permixtis,
addito exiguo aceti.

Si dolor magnus sit, di-
ctis ol. addendus pulvis ro-
sarum rubrarum, sem. myr-
ti, sang. draconis, acaciæ,
hypocystidos & similia, &
ceræ .q. s. ad formandum
ung. solidum instar empla-
stri. quod deinde linteo
panno inductum, loco do-
lenti calidum admoven-
dum. Procedente tempore
oleis addi poterit ol. cha-

mæmel. vel etiam nonnihil laurini.

28. *Nihil aliud quam asthma cum dolore.*

In lateris autem dolore ¹⁸ de quo Aëtius scribit, non expedit sanguinem detrachere; sed calfacientia incisiva & repurgantia intrinsecus & extrinsecus offerenda. alvus enematis subducenda, aut si vires ferant med. aliquod quod pituitam expurget exhibendum: quale in asthma ex crudis humoribus. Eclegm. etiam qualia in tali asthma sunt offerenda. Pectus & latera ungi refert ung. aliquo calfaciente, & dolorem leniente, ut ex ol. anethino, liliorum, rutaceo, & si maiore calfactione opus sit, laurino oleo etiam permixto. Requiritur victus ratio qualis in asthma. Vtilissimus potus est ¹⁹ hydromeli; præsertim si nonnihil hyssopi in eo sit incoctum.

29. *Ut & in omni morbo frigido pectoris.*

30. *Flos anodynus. sem. cymini discutit flatus. multum profeci his. Remb. Dod.*

Lateris dolor phthisicis superveniens nullo modo sanguinis detractionem admittit. fomentis solvitur. ut ex floribus ³⁰ chamæmel. & sem.

fem. cymini permixtis & in sacculo confutis. qui rore vini calfactus dolenti loco admovetur. Vtiles quoque unctiones ex ol. liliorum & anethino. observata victus ratione, qualem phthisis requirit.

De Peripneumonia.

Leet. 65. Ianuar. 30.

CAP. 29.

Peripneumonia : quandoque ab initio & per se oritur nullo præcedente aliquo alio evidenti morbo : quandoque ex permutatione alterius morbi fit, ut quâdo anginæ, aut pleuritidis succedit. Quæ per se oritur, inflammatio est pulmonis, ac modo ex sanguine puriore, modo ex tenuiore & biliosiore gignitur. ex pituitoso, quod plerisque placet, peripneumoniam oriri rationi repugnâs apparet. nam ex familiari pulmonis sanguine promptissime gignitur. purus autem tenuis & vaporosus hic est, qui in dextro cordis sinu

1. Πνευμονίς, Hipp. Pulmonaria dici posset, ut colum. Pulmonarios appellat.

2. Est tunc phlegmone erysipelatodes. nec obest quod fuit, ut ait ab Althomari Anton. accedit enim obstructio ex aëre, &c. A pituita non tam ardens febris, sed potius asthma, aut similis effectus excitatur.

Causæ.

3. *Meatus pulmonis coarctando.**Aph. 23. lib. 3.*4. *Qualis, præcedente aëre fervido & superreniente subito aquilonari vento, mense Octobri cōtiguit. anno 1557.*

elaboratus per arteriam venalem in eum dimittitur. ex quo deinde alimentum sumit. Occasionem præbere potest humorum multitudo, maximè si aliqua extrinsecus causa accesserit veluti aër hybernus frigidus. nam ut in aph. hyeme pleuritides & peripneumonix accidunt.

Maximè autem nocivus est hybernus aër crassus, & vaporibus infectus pulmonis meatus obstruens. unde inspiratione minus libera, calore oborto, inflammatio excitatur. Destillatio autem tenuis & acris, confertim in pulmonem illapsa, ardorem inferens, inflammationis pulmonis quandoque & causa est.

Signum autem peripneumonix primum est: difficilis admodum respiratio. aded ut laborantes præ angustia suffocari videantur & erecti sedere conentur. adest & febris acuta. dolor verò non vehemens, ut Gal. 4°. de loc. affect. sed gravi-

gravitatis sensus. qui ad pectoris sternon & dorsi spinam non raro extenditur, ubi videlicet membranæ pulmonem ambientes suspenduntur. Hipp. autem in lib. de morb. & in lib. de dieb. decret. sentiri quidem gravitatem confitetur: sed simul adesse dolorē refert circa spatulas, claviculā, & mammam. In lib. verò de loc. in homine dolorē sese ad laterum mollitudinem extendere scribitur. Et frequenter sanè, non tamen semper in peripneumonia dolor aliquis lateris sentitur, non quidem pungens, sed mitior; nihilominus tamen molestus. At Gal. pulmonem rectè ait dolorem non sentire, sed membrana quæ ipsum ambit, ac cōvertit; sensus non est expers, & dolorem distenta infert. itaque si humor non modo venas & arterias, sed corpus pulmonis totum implens, putrescat atque inflammationem interius accendat, gravitas illa tantum-

modo sentitur, quæ ad ster-
non & spinam dorsi sese
extendit. Quando verò ad
unam aliquam pulmonis
partem, ut exteriorem, in-
flammatiō consistit, dolor
in latere distēta membrana
sentitur, differt à pleuri-
tide: quod non sit puncto-
rius, & arteriarum pulsus
haud durus, sed mollis,
quandoq; magnus. Maxil-
læ sive genæ in peripneu-
monia magis rubentes sunt
quam in pleuritide.

Signa causarum.

A sanguine autem purio-
re ortam peripneumoniam
sputum ostendit rubrum,
cruentum, & febris mitior.
à bilioso verò sanguine spu-
tum prodit flavum, non
multo sanguini permixtū,
& febris ardentior est ma-
gisque acuta, ac lingua
asperior.

Lect. 66, Ianuar. 31.
Curatio.
I. Primaria.

Sanguinis autem detra-
ctio in peripneumonia ne-
cessario requiritur, quæ &
statim ac mox initio fa-
cienda est, & ex dextri qui-
dem brachij interna vena.
ex altero brachio iterari
poterit

poterit necessitate urgente. Dolore verò in aliquo latere existente, è directo lateris dolentis sectio facienda erit: veluti in pleuritide. Pectus, verò & latera ungenda ol. amygd. dulcium, pinguedine caponis, & butyro insulso, aut loto, addita muccagine rad. althææ; & si febris valde acuta, ol. violaceo. Si dolor adsit alicujus lateris, cataplasma etiã ad moveri utile erit, quale in pleuritide. Eclegmata in hoc morbo omnino sunt offerenda; habita tamē ratione efficientis causæ. si enim tenuis & acris destillatio peripneumoniã excitarit; exhibendi erunt syr. qui tenues humores inspissare & acrimoniam eorum obtundere queant: ut est syr. de jujubis, præsertim syr. de papavere admixto, qui non modo defluentem humorem inspissare, sed & ejusdem destillationes reprimere valet. quib. & utiliter additur syr. de violis, quando sputum biliosius &

5. *Non sint frigida, licet morbus calidus, neeductio sputi impediat: sed humida, mollientia, expectorantia.*

6. *Eadem ratione, quâ Veteres omni compositioni ad pectus, addiderunt papaver.*

Z

7. Remittente se calore,
& concoctionis signis
apparentibus.

8. Potus ex ptisane decocto cum glycyrrhiza.

9. Periculosior quam
pleuritis: mēbrum enim
nobilius afficit.

10. Rarū quod 7. epid.
de caupone, cujus peri-
pneumonia ad 14. diem
duravit, nar-
ratur.

Prognosis.

11. Non cruori permix-
tum, ut in pleuritide,
sed cruor prorsus: ex
ipso enim pulmone pro-
ducitur. Quibus flavum,
rarissimè, imo nunquam
curatos vidi. R. Dod.

flavum apparet. Quod si
verò propter meatuum pul-
monis obstructions, veluti
à frigore hyberno, aut ab
aëre crasso & vaporib. in-
fecto, nata fuerit peripneu-
monia, exhibendi syr. qui
citra evidentem calorem
aperiendi vim habent: uti
est syr. ex adiantho, cui ini-
tio nonnihil syr. de violis,
procedente verò tempore
aliquid syr. de glycyrrhiza
admisceri utile fuerit.

Alvus quoque leniente
ac clementi aliquo medi-
camento subducenda est.
veluti in pleuritide: aut
similibus enematis expur-
gandus.

Victus ratio, qualis in
pleuritide requiritur². Om-
nia actu frig. fugienda sunt.

Morbus autem iste pe-
racutus & admodum peri-
culosus³ est. qui non raro⁴.
7. die vel prius terminatur.
Sputum citò prodire in hoc
morbo bonum est. Opti-
mum: autem sputum, quod
cruentum. proximum, fla-
vum cruore admixtum. fla-

VURI
/

vum ac omnino biliosum, deterius. Viride aut nigrum, deterrimum. Solvitur autem hic morbus ad salutem frequētius per sanguinis è naribus copiosam eruptionem, quandoq; per alvi fluorem: quum spumosa & biliosa expurgantur, & apparentibus signis concoctionis & in die decretorio. aliter alvi fluorem in peripneumonia supervenire malum, ut aph. 16. lib. 6. apparet.

Aëtius verò & quandoque inflammationem in pus converti ait, & per vëtre, aut per urinam pus excerni, atq; tunc statim ab omni molestia laborantem liberari. Si verò sic pus non expurgetur: acervatim in pulmonem irruere, & laborantem suffocare, aut in phthisin morbum permu-
tari.

Peripneumoniæ autem phrenitis superveniens, malum aph. 12. lib. 7.

Mala etiam vigiliæ sunt & imaginationes men-

12. *Quia indicio sunt
rapi materiã ad caput.
quod malum, nisi sequatur hæmorrhagia.*

Z 2

tem perturbantes, & extremarum partium frigiditates. quibus enim hæc accidunt: quarto, aut septimo moriuntur, ut Aët. testatur.

Lect. 67. Februar. 2.

II. Ex permutatione.

In peripneumonia quæ non ab initio invadit, sed vel anginae, vel pleuritidi succedit, sanguis non est mittendus: maximè si, ut Paulus ait, diu laborantes in hoc statu fuerint, & sanguis per initia detractus sit. ex priore siquidem morbo, & sanguinis detractio, vires infirmiores factæ, sanguinis detractio non sufficiunt. Eclegmata utiliter exhibentur ex ijs, quæ pulmonem & pectus expurgare possint: ut sunt syr. de capill. veneris: & de glycyrrhiza.

Alvum quoq; enemate aliquo expurgari convenit. Si dolor latus aliquod premat, fomentis & unguëtis uti licebit: ut supra dictum, ubi de anginae in peripneumoniam permutatione. Periculosam autem, & ibidem dictum, peripneumoniã anginae

Prognosis.

ginæ succedentem. Pleuritidi autem supervenientes securiores esse peripneumonias ijs, quæ ab initio fiunt, in Coacis legitur.

Succedit autem lateris 1.

dolori peripneumonia¹³ ut Aët. ex Archigene refert: quando ad animi usque deliquium sanguis detrahitur. nam refrigerato corpore, pulmo rarus & calidus, laterique vicinus promptè & facile morbum, ait Aëtius, suscipit; atque idcirco sanguinem in pleuritide non ad animi defectionem ducendum esse ait: sed repetita sectione illum potius auferendum. & propter hanc eandem causam non è directo lateris dolentis, sed ab opposito sanguinem detrahi vult, in quo ab Hipp. & Galeni doctrina recedit.

Sive autem ab eodem, sive ab opposito latere sanguis detrahatur, æquè corpus refrigeratur, & pulmo rarus & calidus humorem suscipere potest, ac promptius quidem quando ex

13. *Duplex modus quo peripneumonia succedit pleuritidi. nos secundo modo semper fieri vidimus. ratio tamen priori non repugnat. Videtur autè Hipp. contra quem agit Archig. non ad defectionem animi, sed mutationem sanguinis voluisse detrahi.*

14. Quod satis confitentur, qui in eadem cum Arhigene sententia sunt, nam materia venenata si pleuritica sit, nolunt oppositam fieri sectionem, ne rapiatur ad cor, vel pulmones,

opposito sanguis + detrahatur, quam quum ab eodem. nam quæ ab opposito fit latere, minus cito doloris levamentum affert, quâ quæ è directo. levamentum autem doloris fit vacuato humore inflammationem faciente, propter quam rationem Aëtio, aut Archigeni hac in parte nihil deferendum, sed Hipp. & Galeni doctrinæ insistendum.

Quod autem peripneumoniæ ex pleuritide in Coacis securiores scribantur, quam ab initio factæ, id quoque sanè interpretari debet. contrariari enim ijs videtur, quæ in aph. habentur. ubi legitur: à morbo laterali inflammatio pulmonis mala. aph. 11. lib. 7. Non est siquidem de ijs peripneumonijs accipiendum: quæ eo modo, quo Aëtius refert, oriuntur: sed de ijs, quæ propter affectū aliquem prius in pulmone cōsistentē, velut phyma seu abscessum succedunt. quod fit, quando humor ex inflammatione

flammatione lateris in pulmonem transfertur, & per sputum expurgari nequit. tunc enim humore in pulmone hærente partes prius malè affectæ gravius affliguntur. nam & hoc modo peripneumonia pleuritidi non minus, quam angina succedere potest. & tales minus malignæ, ac magis salutare apparent: quâ per initio ac per se invadentes. possunt siquidem hac laborantes, purulenti facti, ad temporis successum expurgari, atque sic liberari. non minus quam qui ab angina peripneumonici facti sunt.

Cōtingit vero & quandoque ut post febrem aliquam dolor unum aliquod latus, vel dorsum vel aliquam pectoris partē occupet: difficili ac rectæ cervicis spiratione accedente. & talis supervenit; quando in pulmone phyma, sive abscessus multo ante(citra tamen dolorum aut molestiæ sensum) constiterit, qui per febrem acriore factō, quod

III. Ex abscessu.

15. Nam quamdiu ab abscessu eruptionē moliente membrana non tenditur, dolor non fit.

in eo continetur, pure inflammatus, quum erumpere conatur dolorem affert. & talis quidem affectus ad peripneumoniam ex permutatione factam referendus est. Differt verò hic non parum magnitudine. quandoq; enim dolor major est, & respiratio difficilior: aliquando mitior & respiratio quidem impedita, sed minus. Major dolor fit propter abscessus magnitudinem, vel morbi, cui successit, vehementiam. & talis ut plurimum citò interficit. Minor dolor mitioribus febribus succedit, & minores abscessus comitatur.

Lea. 68. Febr. 3.

Adversus hujuscemodi dolores non alia remedia adhibenda, quàm unctiones, ecleg. fomenta, & si alvus requirit, enemata, velut in peripneumonia ab angina supra dictum. Mitiores dolores si febribus cessantibus adhuc perseverent, & per fomenta, aut unctiones non sedentur; exhiberi utile erit

erit, quæ purulentos humores aliquo discutere modo, ac resiccare queant: quale decoctū sarzæ perillæ: cui pro conditione ægrotantis addi poterunt, vel farfaræ rad. vel folia, vel hyssopus, vel, si non obsit calor, marubium. ex hoc decocto manè ʒ ʒ. aut 6. deinde sumat & totidē à prandio. In cœna, aut prandio hydromeli conceditur, aut vinum cum hydromelite, aut saccharo. Quando autem peripneumonia ex permutatione facta, sive pulmonis abscessus ad suppurationem venerit, curandi tunc erunt laborantes: veluti suppurati.

De Empyemate.

CAP. 30.

SVppuratio, de qua agimus, seu empyema, collectio est humoris purulenti inter membranam costas ac latera subcingentem, ac pulmonem .i. in vacuo thoracis. comitatur hanc

Z 5

1. Nam hoc generale
theorema. Dum fit pus
febris magis fit, quam
facto.

2. Ut omnes hectici &
phthisi laborantes, no-
ctu magis affligi viden-
tur.

3. Affligitur enim tunc
sepimentum pulmonum.
unde & respiratio diffi-
cilior.

Curatio.

4. Pus enim pharmaco
expurgari non potest.
licet natura fortis ali-
quando eò depellat, ut
per alrum excernantur.

5. [Contrarium Gal.
simpl. facult. 5. c. 13.
asserit de fœniculo om-

doloris & febris vehe-
mentiae remissio. manet ta-
men aliqua febris hecticae
similis, noctu : vehemen-
tior, interdiu remissior: do-
nec integrè expurgata fue-
rit suppuratio. sputū, quod
cum tussi procedit, est pu-
rulentum. Colligitur autem
istud frequentissimè in uno
thoracis laterè. in quo nem-
pe inflammatio fuit. senti-
tur autem in hoc gravitas,
& melius in illo laborans
decumbit, quam in altero.
sentit verò & ipse, quando
ab uno latere in alterum se
convertit, subinde aliquid
diffluere: præsertim copio-
so humore purulento exi-
stente illic. atq; tunc quan-
doque latus affectum tu-
midius etiam apparet.

Sanguinis missio in sup-
puratione utilitatem nul-
lam, sed nocumentum, af-
ferre potest. nec ventrem
expurgantia + conveniunt.
Diuretica + leviora utiliter
exhibentur. nam præter
quod urinā movent etiam
ad facilem expectoratio-
nem

nem conducunt : ut sunt rad. fœniculi, rad. asparagi, brusci, hyssop. scabiosa, adianth. capill. veneris, sem. anisi, apij, fœniculi & similia. ex quibus decoctis potiones parari possunt, ad expectorandum, & urinas movendas utiles. per urinas etenim & pus in pectore contentum quandoque excerni contingit : ut Gal. 6. de loc. aff. testatur.

Eclegm. in suppuratione omnino necessaria : inter quæ diamarrhubium Pauli facile principatum tenet. quod in officinis quibusdam syr. de prassio descriptionis Pauli, nomine extat. cui addi potest syr. de glycyrrhiza, vel hyssopo : & si aliqua adsit destillatio è capite syr. de papaverē. Pectus ungi refert aliquo sputi exitum promovente : ut sunt dicta in curatione pleuritidis; præsertim addito ol. irino aut pulv. rad. iridis, & aliquantulo croci.

Cibus sit concoctu facilis, ex optimis carnibus, vel

nibusq; diureticis. quod puris è thorace expuitioni adversentur. rationem addit. quod serosiorrem partem sanguinis ad renes deducunt. quod autem crassum, non ita facile expuitur.] & cap. 22. ejusdem] ob extenuandi tamen facultatem communem sub idem genus convenire ait, cap. 23.]

1. Lib. 7.

recentibus ovis. Conducunt & amygd. dulcia, nuclei nucum pinearū, & pistaciorum, & quæcunq; ex his fiunt tragemata. Potus sit aqua mulsa, vel decoctio ptisanæ, glycyrrhiza, vel saccaro addito. vinum non detur nisi tenue, & saccharo vel aqua mulsa dulcoratum.

Prognosis.

6. Multi ad annum usque supersunt. verum isti sunt jam tabidi.

7. Hipp. secari voluit aut uri. Atque etiamnum hodiè in Ægypto utrumque faciunt. & nos pus à sanguine ex vulnere in cavum pectoris defluente factum, Diatresi evacuantur curavimus. verum empyemate vero pulmonem semper corruptum invenisse testabatur. R. Dodon. Itaque nihil sperandum esse.

Perdurare autem supurationem ultra 40. dies malum. nam, ut Hipp. ait. Nisi suppuratus in 40. diebus repurgetur à die qua fit malum: ad phthisin transit. Malum quoque est pus faeculentem, flavum, viride, & valdè foetidum. Tumor quoque apparere latus perniciosum est: multitudinem enim humorum in pectoris spatium collectorum ostendit.

De Phthisi.

CAP. 31.

Lea. 69. Febr. 20.

PHthisis, quæ latinè etiā tabès dicitur, pulmonis est exulceratio. quam committatur

mitatur lenta, & non magna febris; nō intermittens, sed tamen quæcitō ab assumpto cibo, & sub noctem magis invalescit: & intensior est, quam interdiu. accedit & universi corporis consumptio & extenuatio, sensim, paulatimq; cum virium defectione ingravescent.

1. Quia tum alimentum in corpus distribuitur.

Oritur phthisis tribus maximè de causis: vel enim propter vitiosam pulmonis constitutionem: vel propter acrem, mordacem, exedentemque humorem: quandoque etiam propter venæ alicujus non curatam rupturam.

Pulmonis mala est constitutio: quando mollis, tennella, & corruptioni parata ejus est substantia. qualem plerique ab ipso primo ortu, ac à natura à parentibus acceptam obtinent.

Nam tabida stirpe geniti plurimi phthisi: quasi hæreditario jure marcescunt.

Altera causa acris, salsus, mordaxq; humor, qui sub-

2. Hic avum, patrem, ac omnes liberos phthisi perijisse vidimus. Ut istud averterent pagani, illorum qui tabe, vel hydrope obijissent liberos, pedes aquæ immergere jubebant, dum ureretur cadaver. Plutarch. 2. de sera minimis vindicta.

3. *Vt in muliere, quæ ex icterica phthisica evaserat. cujus sputum flavum. Expurgat autem se quandoq; per pulmones natura. sic in nobili quodam melancholia laborante, ac illi sputum nigrum erat, verum non malum. quum enim non esset acre, pulmones non erodebat. cōtra, ex lie-ne ad pulmones delatis humoribus adustis, nau-tam moriētem observa-vimus. Et scudilo de-stillatione jocinoris (nisi leg. sit Ichoris) pulmo-nes vomitans, interiit. Amman. lib. 14. Signa.*

4. *Minor si à propria pulmonis imbecillitate.*

inde à capite in pulmonem fertur : quandoque à corde aut à jocinore ad pulmonē rejicitur : vel pus quod est in cavitate pectoris diutius conclusum.

Venæ autem rupturam, quæ 3. est causa, phthisis. consequitur : quando san-guis, à vena rupta non con-glutinata in substantiam pulmonis dimanās, putres-cit, & substantiam pulmo-nis inficit ac corrumpit. Et hæ quidem præcipuæ sunt exulcerationis pulmonis causæ. quibus annumerari possunt, quæcunque laten-te ac occulta proprietate idem faciunt : ut lepus ma-rinus, & si quæ sunt alia.

Tussis initiò molesta est. + major verò etiā si destil-latio adsit. cum qua cruen-ta quædam quandoque ci-tra dolorem exspuuntur. se-quitur deinde sputum pu-rulentum. quod aquæ inje-ctum minimè alterius sputi ritu innatat, sed in fundum descendit ac subsidet, quod etiam quandoque carbo-nibus

nibus injectum graveolet. aliquando verò & membranarum una, Vel bronchiorum particulæ expuuntur. quæ ipsius exulcerationis magnitudinem, & curationis difficultatem majorem ostendunt. & siquidem pus, quod exspuitur non syncerum fuerit; sed ei pituita permisceratur, adest tunc & ex capite destillatio.

Proni autem ad phthisin sunt, qui angusto sunt pectore, scapulasque alarum modo à tergo prominentes habent; & quibus defluxiones multæ à capite deferuntur, præsertim salsæ pituitæ.

Contingit autem phthisin frequentissimè fieri à 18. ætatis anno ad 35. ut Hipp. scribit. hoc est eo ætatis tempore, quo calor naturalis fortissimus, & bilis redundat.

Anni .a. tempus phthisicis maximè noxium autumnus est. deinde & ver. quum (ut inquit Hipp.) fici folia erumpunt,

5. *Quia signum debilis pulmonis. alioqui fuisset extensus thorax.*

6. *Intemperies aëris. manè frigus, post calor dominatur. autūno deficiunt humores: itaque nutriri corpus non potest.*

Le&.70. Februarij 21.

Curatio.

Phthisis curatio partim in bona vivendi ac victus ratione, partim in usu lactis, partim etiā in eclegmatum, & aliorum paucorum remediorum usu consistit.

4. Dieta.

7. Hinc usus principalis navigandi phthisi affectis. ideoque in Ægyptum navigatio. Plin. l. 31. c. 6. Sylvarum item resimiferarū. l. 24. c. 6. Averrh. in Æthyopiam, Arabiamque ablegari tabidos dicit 3. Collig. c. 17. Cels. contra, densitate prodesse Alexandrinum aërem dicit. l. 3. cap. 4.

8. Extenuat enim corpus, quod illis satis emaciatum.

9. Quia facultas debilis, & multa refectio indigent.

10. Sic neque liba aromatica. quia non fermentantur.

Aëris omnis excessus fugiendus, caloris, frigoris, & humiditatis: tum & ventosa constitutio. aër siccus, serenus, utilis est. Corpus frequenter, aut multum exercere non expedit. Abstinere in cibo & potu ab omnibus acribus, salis, & acidis oportet, & ab omnibus ijs, quæ difficulter concoquuntur, & parum alimenti afferunt. difficulter concoquuntur carnes hædinæ, bovinæ, cervinæ & similes, & aviū palustrium. panis non benè fermentatus. caseus vetus, castaneæ, nuces juglandes & avellanæ: & similes alij fructus. parum alunt pisces, qualescunque sunt. panis furfuraceus, poma, pira, cerasa, & similes fructus.

Bonæ sunt carnes hædorum

rum lactantium¹¹, vitulorum, pullorum gallinarum, tum & gallinarum ac caponū juvenum, pedes ac capita¹² vitulorum, ova recentia: ex fructibus, ¹³ uvæ passæ, amygdala dulcia, nuclei nucum ¹⁴ pinearū & pistaciorum, & quæcunq; ex his confiunt bellaria, utilia sunt. Si febris vehementior fuerit, sic ut urinæ color ¹⁵ intendatur, ptisana cum cibo coquenda erit, atque ex ipsa quoque sobrietates dandæ. decoctum verò hujus & pro potu exhibendum: in quo, si calor excesserit, incoqui poterunt refrigerantes herbæ aut flores: ut violaria, cichorium, lactuca, vel etiam ¹⁶ plantago, flores rosarum, flores violarum, aut istis deficientibus conserva rosarum, vel violarū. & conf. quidem rosar. rubrarum si alvus liquidior, vel albarum vel dilutè purpurearum, aut conf. violarum si alvus durior. Vehementia febris remissa ac urina sanorum

11. Carnes agninae excrementitia superfluitate abundante in hædinis minimè est.

12. Omnium animalium extrema quum succum lentū habeant, multum nutriunt. aliorum tamen animalium difficulter coquuntur.

13. Carica ob humiditatem putrefactioni obnoxia.

14. In quibus plus præsidij quam in pistachijs.

15. Quod non fit donec sola hæctica laborant, sed accedente putrida.

16. Quæ à strictione sua prodest ulceribus.

17. Cujus solè usu, qui incipiēte phthisi laborarent, restitutos memini.

simili, pro potu utile erit¹⁷ hydromeli, sed dilutius, quod ad expurgationem ulcerum pulmonis multum conducit, & ad alimenti distributionem non parum facit.

II. Lactis usus.

18. Huic lacti herbidos per montium aestiva potus veteres Medici commendabant. Plin. l. 24. c. 6.

Eodem tempore etiam lac commodè probetur. eligendum asininum, si haberi potuerit, quod humano lacti, quam reliquorum animalium, similis est. & quia tenue & serosum, non facile in vètriculo coagulatur, illud si haberi nequeat, caprinum dandum erit: & præsertim earum, quæ in siccioribus locis¹⁸ pascuntur. Ante tamen usum lactis levi aliquo medicamento corpus expurgari convenit: ut si qui sint in ventriculo vitiosi humores, vel circa primas venas hæreant, ij prius evacuentur, ne ab his adveniens lac corrumpatur.

19. Vel diaprunum non laxativum, vel sola pruna.

Ad hujusmodi autem expurgationem, utile¹⁹ est infusum rhabarbari cū manna; aut medulla cassiæ fistulæ,

læ, vel simile aliquod.

Exhibendum autem lac est mane jejuno vētriculo, recens mulctum, & adhuc tepidum, si fieri potuerit, 3. 5. aut 6. mensura, aut amplius, si concoqui queat. cui admiscendū nonnihil sacchari, ne in ventriculo coaguletur: vel etiam aqua pura²⁰ cū saccharo decocta, quando vel lac crassius, vel febrim intendi ab usu lactis posse, metuitur. Lacte assumpto, quiescendum & ab omni alio cibo abstinendum: donec concoctū fuerit. quod 3. aut 4. horis fieri poterit. neque etiam ullus potus interea exhibendus, minimè vini. in prandio & cœna à lacte abstinendum. Quod si verò & manè ab eo aliqua de causa abstinere contingat, ejus loco exhiberi poterunt ova recentia forbilia, vel ex carnibus contusū: cui addi vel amygdala dulcia, vel nucleos nucum pinearum, vel pistachia, utile fuerit. Sæpius phthificis offerendus cibus

20. Aut etiam aqua cithorij, vel intybi.

non minus quam ter in die.
medio tempore bellaria
etiam dari possunt; veluti
ex pincis & pistachijs mor-
sum, vel similia alia.

Leq. 71. Februar. 23.

21. Quod ut plurimum
evenit. quæ si non re-
primantur, ulcera con-
solidari nequeunt.

22. Quæ tota substan-
tia pectori utilis.

23. Quæ in omnibus ar-
theriacis adhibet Gal.
aut opium. sic quidam
ad multos annos troch.
de astere servati.

Eclegmata in phthisi re-
quiruntur, quæ ulcera ex-
purgare queunt & simul
consolidandi facultatem
conjunctam habeant. & si
destillationes adsint²¹: quæ
eas sistant ac reprimant,
qualis est syr. ex symphyto.
cujus hæc est compositio.
Rad. symphyti .i. consoli-
dæ majoris, ℥. 2. rad. brus-
ci aut asparagi, glycyrrhizæ
ana ℥ β.²² farfaræ cum rad.
manip. i. β. scabiosæ, mar-
rubij ana M. i.²³ cap. papa-
veris ℥ i. β. vel ℥ 2. uvarum
passar. mundatur. nucleo-
rum nucum pinearum ana
℥ i. f. omnium decoctio in
aqua .q. f. ad ℥ i. colato
adde sacchari ℥ 8. mellis
℥ 4. f. syrupus. de quo sæ-
pius in die erit lambendū.
Expurgat ulcera pulmonis,
eadem consolidat, ac de-
stillationes sistit.

Quod si verò humores
destil-

destillantes adeò frequen-
tes sint, ut hic syr. ad reprimendum & sistendum fluorem non videatur sufficere: tunc eidem admiscendus erit syr. de papavere. Si verò & acrimonia non satis isto syr. retundatur; admisceri poterit ei syr. de jujubis, aut de violis. Si autem & non satis videatur expurgare; addi potest syr. de hyssopo, vel diamarrhodium, sive syr. de prassio Pauli: præsertim si febris exigua sit & nulla, aut minima adsit destillatio.

24. *Quam augent vehementer expectorantia.*

Sunt verò & alia quædam eclegm. quæ phthisicis offerri possunt: ut quod appellatur loch de pino, quod nucleos recipit nucum pinearum; & loch de pulmone vulpis, quod à plerisque valde commendatur. sed istis tamen præstat syr. de symph. supradictus.

25. *Qui tota substantia utilis habeatur: quamvis nil eximium præstare videatur.*

Pectus oleo aut ung. aliquo non est ungendum: nisi contingat sputum cum difficultate procedere, quo

26. *Frigida enim morbus postularet, quæ expectorationem impediens, molestiam augent.*

A a 3

27. Alioqui calidius, dum ætate rancescit, efficitur.

28. Reprimit enim sensum sudores, & vires corroborat.

29. Potius papaveris quod vim somnificam habet, ut hyoscyami, nec ita noxium est.

30. Ad tertiam partem, adeo ut decoctionis aqua lentorem contrahat.

31. Hinc Nero, quum Senecam interficere statuisset, à muliere cum qua consuecebat Tabellam laborantem brevi aliquoquin etiam interiturum, dimisit. Xiphilin.

32. Si frigido sint corde. nam illis sana pulmonis pars ad refrigerium sufficit.

casu temperato aliquo ungu. illiniri poterit: ut ex butyro loto, pinguedine vituli, ol. amygd. dulcium recentissimo²⁷ simul mixtis. quibus etiam, si calor major adsit, addi poterit nonnihil ol. violacei.

Vesperis hora somni sumenda est confer.²⁸ rosarum rubrarum circiter 3 β. pondere. cui, si destillatio vel vigiliæ molestæ sint, addi potest nonnihil sem.²⁹ hyoscyami, vel syr. de papavere.

Poterunt verò & tabellæ ex saccharo parari cum decocto capitum papaveris³⁰. quæ sæpius sumi, & in ore contineri, per noctem possunt. sistunt istæ destillationem, tussim sedant, & ad somnum conciliandum profunt.

Difficilis autem morbus phthisis est, qui ut plurimum paucis mēsis³¹ hominem absumit. quandoq; tamen bona victus vivendique ratione, & remediorū usu, vita ad multos³² producit

ducitur annos. sed ad integram sanitatem ægrum perducere, vel impossibile, vel difficillimum. Quum enim pulmo in continuo sit motu, ægerrimè ulcera ejus curationem admittunt. accedit, quod eadem citra tussim expurgari nequeât: qua & ipsa rursus offenduntur. Superveniens autem phthisicis alvi profluvium, lethale est, ut inquit Hipp. 14. aph. 5. partis. præsertim capillis à capite simul defluentibus. ut 12. ejusd.

Malum quoque pedes tumidos fieri: veluti hydro-picis accidit. Iam & lethale esse, Hipp. refert, si spiritum injectum carbonibus graveoleat, capillis à capite defluentibus 11. quintæ particulæ.

33. Quia non solum vitalem, sed & naturalem facultatem debilem significat.

34. Fit enim ex debilitate hepatis.

35. Quia & summa putredo, & summa virium dejectio significatur.

De Palpitatione Cordis.

Lea. 72. Februar. 24.

CAP. 32.

Palpitatione cordis est motus ejus depravatus, tremori quodammodo similis,

1. Palpitatione est nervorum, cordis, & renarum agrotantium, motus.

A a 4

Nicandri scholiast. h. e. musculorum, qui nervos recipiunt; aut, Cordis, atque Arteria- Causæ. rum. Palpitatio porro ægri; Pulsus, sani validiq; corporis motus est. Id. Differt à Tremore, quod per magna fiat intervalla. Gal. 2. de caus. sympt. c. 2., & affectio contra naturam, per quam diastole, seu dilatatio cordis impeditur. Causa palpitationis quandoque sanguis est crassus & multus, circa cor cōsistens & ipsum coarctans: quandoque verò & vapores, ac fumi crassi, melancholici. Potest verò & palpitationis causa esse humor mul-

2. Humorem & callum
vidimus. tumorem nun-
quam. R. Dodon. In
Maximil. 2. Imperato-
re, præter hydropē pul-
monis, palpitationis
causa fuit aqua in Peri-
cardio aucta. Epist. me-
dic. 136. Craton.

3. Aëris enim attractionem impediens, quominus attollatur efficit.

berè attollatur impediens :
Vel etiam tumor aliquis in
eo consistens, ut Gal. ait.

Sic & callum in ipsa ar-
teria juxta cor innatum,
palpitationis fuisse causam
compertum. Oris ventri-
culi dolor, & morsus; cor-
dis præter naturam motum
quendam quandoq; etiam
concitat. sed hic non pro-
priè palpitatio est, & nec
cordis, sed oris vètriculi af-
fectus: qui cardiogmos &
cardiaca passio dicitur, de
quo post agemus. Accedit
his omnibus causis cordis
quædam naturalis debilitas

ac imbecillis facultas, absque qua nulla fit palpitationis cordis.

4. Hinc fit quod omnes ferè intra 40. aut 50. annum moriantur. Gal. de loc. affect. l. 5. c. 1. Signa.

Sanguis autem multus & crassus palpitationis cordis causa in adultis, ac mediæ ætatis hominibus esse potest: præsertim quando liberalius vivunt, & multis vescuntur alimentis crassiorem sanguinem ingenerantibus, & copioso utuntur vino, & præsertim rubente vel admodum dulci. Sanitate isti fruuntur, sola cordis palpitatione ipsis quandoque molesta est.

5. Illud enim copiosum crassumq; ingenerat sanguinem.

A crassis autem, ac melancholicis vaporibus, ac fumis palpitatione cordis quandoque succedit, ijs qui melancholia, & præsertim hypochondriaca laborant: tum & his, qui splenis obstructionibus obnoxij sunt. Flatuosi autem spiritus palpitationem cordis ingenerant in senioribus. & tunc quidem præcipuè, quando crudiores ac flatulentos cibos ingesserunt; vel alioqui ventriculi cruditate laborant.

Aa 5

6. *Quia gula non longè
cor transiens impleta,
explicationem impedit.*

7. *Contra, quam in car-
diogmo fieri solet.*

8. *Quia nec humor, qui
in pericardio minui,
nec callus tolli potest.
pulsus autem adeo exi-
guus est; ut quandoq; in
una manu non sentia-
tur.*

ex hac causa quæ oriuntur
cordis palpitaciones, subin-
de levissima aliqua, vel cor-
dis, vel corporis immotio-
ne suscitantur. & non raro
simul accedit in ⁶ respiran-
do quædam difficultas, sic
ut & erecta cervice labo-
rantes spirare cogantur. in
cibo etiam ac potu deglu-
tiendo impedimentū etiam
quandoque comitatur. pul-
sus ⁷ parvus, rarus, tardus
& inæqualis est. Humo-
rem autem in pericardio,
urinæ colore & substantia
non admodum absimilem,
supra naturalem quantita-
tem augeri, ac colligi con-
tingit: quando affectus
sæpius per intervalla recur-
rere solitus inveterascit, &
vigor ætatis perit, corpusq;
extenuatur. Eodem tem-
pore & callum in arteriæ
principio nasci accidit. quo
præsente, vel humore co-
pioso ac multo in pericar-
dio contento, palpitatio ac-
cedens non amplius remit-
titur, sed ad vitæ finem ⁸ us-
que perseverat. Adest &
tunc

tunc non modo respiratio-
nis, sed & cibi potusque in
deglutiēdo difficultas. pul-
sus omnino parvus, valde
debilis, tardissimus ac rarif-
simus, ac simul inæqualis,
& quandoque etiam inter-
mittens. & si laborans diu
in hujuscemodi constitu-
tione permanferit: tandem
& pedes intumescunt, & in
pectoris spatio aquosi hu-
mores colliguntur.

Curatio palpitacionis cor-
dis pro conditione labo-
rantium variat. adolescen-
tibus, & adultis sanitate
fruentibus sanguinis detra-
ctio utilis est: ut Gal. ait. &
quidē ex dextro brachio, si
plenitudo adsit. ex sinistro
verò, si sanguis non supera-
bundarit. ex quo etiam bra-
chio facienda est, quando
effumationes & vapores
melancholici palpitacionem
cordis efficiunt. præsertim
si consuetæ sanguinis va-
cuationes, veluti mensium,
aut per hamorrhoides, sup-
pressæ sunt.

Accedere verò debet &

Lect. 73. Februar. 27.

Curatio.

9. Quia magis prodest, si
καθ' ἑξὶν fiat, ubi mag-
na plenitudo non adest.

10. Quas Gal. prævum habere succū, ait. quod forte verum in Italia: in Belgia minimè. inditium quod non crassum habent succum: quod jus non cito concreseat in gelatinam.

11. Etiam gallinæ indicæ.

12. Sic quidam leviter hoc morbo laborantes, melissa oleribus injecta, liberati sunt.

13. Potius semine quam ipso ocymo utantur. offendit enim odore caput.

idonea victus ratio, ac quidem ut Gal. ait, attenuans: & similis facultatis medicamenta. Abstinentum igitur ab omnibus crassum & frigidum succum ingenerantibus. laudantur carnes

vervecinæ, perdices, phasiani, capones & aves omnes in montibus & locis ab aquis remotis versantes. Vinum album, vetus, & pauciferum. ex herbis origanum, majorana, rosinarinus, thymus, hyssopus, calamintha; & quæ reliquis præferuntur melissa ac ocymum. & flores dicti cordiales: ut borrag. bugl. & violæ, qui tamen magis frigidi sunt quam calidi. quæ sive cum cibis coquantur, sive aliter sumantur utilia sunt.

Quod si verò flatuosi frigidi spiritus palpitationis cordis causa fuerint: ut in senioribus ac ijs, qui cruditate laborant, sanguis non erit detrahendus; sed exhibenda, quæ flatus discutere ac concoctionem promovero

vere queant, victus ratione,
qualis ante dicta, observa-
ta. Si opus videatur pur-
gante med. sive ex flatuoso
spiritu, sive alia de causa cor
palpitet: dandum erit ali-
quod, quod ventriculo pro-
fit, nec cordi obsit, qualis
hierapicra vel pill. alephan-
ginæ.

Purgatio.

Offerenda verò, ex qua-
cunque tandem causa cor
laboret, quæ ipsum con-
fortare ac roborare pos-
sunt: ut sunt cinnamomum,
nux moschata, garyophylli,
macis, ¹⁴ crocus, & similia
aromata, & quæcunq; cum
his & ex his componuntur.
item ¹⁵ agallochum, ambra,
moschus. Iam & marga-
ritæ sive uniones, ac pleriq;
alii lapides pretiosi. lapis ¹⁶
bezoar, ac ¹⁷ unicornu
etiam cōmendantur, & os
de corde cervi. Cōveniunt
quoque galanga, ¹⁸ Zedo-
aria, cardamomum, cube-
bæ, præsertim quum ven-
triculus cruditate laborat.
sic & semina anisi, ammios,
carios, fœniculi ad flatum

14. Maximè prodesse
cordi fertur ab Ara-
bibus. unde subitò qui-
busdam vita quasi resti-
tuta.

15. Lignum Rhodi ap-
pellant officinæ, etiam
lignum aloës, verum non
est agallochum. Copio-
sum nunc ex India ha-
bemus Agallochum.

16. Valde resistit vene-
nis. talia omnia profunt
cordi.

17. Ramenta unicornu
non sœbent combusta,
ut eboris: neque corti-
cem habet ebur ut uni-
cornu. valde prodest,
sive autem ebur, sive me-
dulla unicornu suma-
tur inutilis est.

18. Quæ est Zerumbet.
vera Zedoaria alias an-
tithora dicitur.

discutiendos. Inter compos. principatum habent elect. de gemmis, diambra, de mosco, diamargariton cal. descriptione Nicolai, diamargar. cal. Avicennæ, si absque thapsia paretur. letificans Rhasis, gallia moschata. laudatur & à multis el. alcermes. quod quidem utile esse potuerit, si absque lapide lazuli præparatum fuerit. aliter aduersus cordis palpitacionem dari absque nocumeto non potest. nisi detur ad humoris melancholici expurgationem: quo casu, iusto pōdere exhiberi debet. quod est à ζ i. ad ζ i. β . ut Mezues scribit. Ex elect. autem supradictis formari poterunt tabellæ cum saccharo, aut addito aliquo syr. & simul conf. alicujus floris, conditum componi: ut pro ætate vigētibus, cum syr. de violis, aut de buglossa, & conservis eorundem florum. pro senioribus verò ac cruditate laborantibus, cum syr. de corticibus

bus

bus cytri. & conf. florum
rosinarini, vel majoranæ,
aut cum rad. enulæ campa-
næ conditis. Commendan-
tur verò & theriace An-
dromahi, & Mithridatium:
præsertim quando propter
uteri consensum cor pal-
pitat.

Lea. 74. Febr. 28.

Topica.

Adhibenda autem sunt
cordi palpitanti localia ex-
trinsecus: veluti sacculi, epi-
themata & similia. Sacculi
componi possunt ex her-
bis, floribus, & seminibus
antè dictis, additis specie-
bus alicujus ex suprâ allatis
electuarijs; quæ cum gos-
sypio in tela linea, aut po-
tius ex serico eoq; rubente,
ac cocco tincto, consuen-
di, atque ad regionem cor-
dis adinoveâdi, ac gestandi
sunt. Absq; gossypio & ex
his quoque sacculi fiunt: qui
in vino & aqua melissæ, vel
simili, aut vino solo deco-
cti fomenti usum præbent.

19. Si ætas major. vel
in hac decoctione pan-
num intinctum cocco
tinctum, vel sericum, vel
spongiam, applicant.

Fomentum verò etiam
ex aqua vitæ sola, quando
laborans ætate provecior,
temperamento frigidior,

20. *More chymico. sunt enim tenuiorum ea partium, quæ si non adsint: utendū ol. de spica lar.*

& causa similis, multum subinde profuit. Sic & theriace foris emplastri modo cordis regioni admota. Prodest verò & inunctio ex ol. cinnamomi, maceris, nucis moschatæ, arteficiosè extractis. & si majoris refrigerationis signa adsint: ex ol. de spica lavendulæ. Conveniunt verò & odores grati: ut pilarum, quæ ex ladano & alijs odoratis cum ambra & moscho componuntur. quas sæpius naribus admoveere convenit. Sic & suffitus suaveolentes, veluti ex alipta moschata, & similibus cōpositionibus, conducunt. Ventriculo etiam cruditate laboranti providendum, ut posterius dicetur.

Prognosis.

21. *Quia qui cor natura habent debile rix recreari possunt. qui autem palpitatione laborant, cor tale habent.*

Difficulter autem ista affectio integrè curatur. nam ubi semel quem invaserit, facilè sæpius recurrit. quiq; hac laborant ad magnam ætatem non proveniunt. magna sic affectorum pars ætatē agit, ut inquit

quit Gal. inferiorem 50.

annis: sed quæ 40. annos excederet, rarissimum sanè aliquem ex his 50. annos superare. non omnes verò etiam ad 40. perveniunt.

Moriuntur nonnulli quum sibi sani esse videntur subito, 33 syncope intercepti, alij per acutas febres, quidam longo & diuturno morbo conficiuntur.

22. Imperator Maximilianus 2. 50. anno ætatis mortuus est hoc morbo.

23. Sic Regina Maria subito interijt.

De Syncope & lipothymia.

CAP. 33.

Syncope & lipothymia scordis sūt affectus magnitudine differentes. major ac vehementior syncope est; minor verò minusque vehemens lipothymia. quæ & lipopsychia dicitur, & ut Gal. ait, syncopen præcedit.

Syncope autem est præceps & subitaneus virium facultatumq; vitalium lapsus, quem comitatur sensuum privatio, faciei pallor, & sudor frigidus.

1. Quia nulli adsint spiritus.

Bb

In lipothymia verò neq; sensus omnino cessant, neque sudor frigidus erumpit. In syncope autem, cor quandoque primario proprioque affectu laborat: quandoq; verò per consensum tantummodo. Veluti quando propter ventriculi affectum, aut uteri strangulationem, vel vehementem alicujus partis dolorem, afficitur.

Quando verò nullus alicujus partis vehemens dolor adest, neque ullius partis affectus præcessit, neque signa alicujus insigniter affectæ partis appareant, cor primario affectu laborare, ac deficere existimandum.

Leç. 75. Martij I.

Causæ.

Contingit autem fieri syncopen, sive animi deliquium, quandoque propter vehementem animi emotionem: veluti à subitaneo magno gaudio, vel repentino metu, aut ab ira & ex-candescētia immodica. sic & ab inspiratione corrupti ac venenosi aëris syncope fit

fit: veluti ab aëre ex fodinis nonnullis metallorum, ex barathris, aut alijs similibus locis. Quandoque & à venenis assumptis, aut ab ictu venenatorum animalium. Immodicæ etiam sanguinis vacuationes, tum & aliorum subinde humorū, siue per purgantia medicamenta, siue aliter, frequenter animi deliquium inducunt. Sic & abscessus prope cor: veluti in pulmone subito erumpentes. Ingens verò & alicujus partis dolor deliquij non rarò causa est. Quando verò & cor ab aliqua occupatur inflàmatione, aut exysipelate, priusquàm affectus augeri queat, vita, ut Gal. ait, deficit. Vultus etiam cordis ad ventriculum pertingens syncope, & subitanæ mortem subito infert. A ventriculo autem per consensum syncope, siue deliquium accidit; quando vitiosi humores in corpore redundantes ventriculo, ac præcipuo ejus osculo mole-

2. *In sinistra partē. in dextra tamen augeri posse testantur hodiè doctiores.*

stiam inferunt. Ex utero verò & mulieribus fumi, ac vapores subindè afferuntur: qui animi deliquium inferunt.

Curatio.

In omni autem syncope sive animi deliquio (si non fiat ab utero) mox naribus admovēda sunt odorata, quæ spiritus reficere queant: ut sunt aqua rosacea, cinnamomi, acetum, vinum generosum, præsertim aromatis conditum: sic & aromata, ut garyophylli & similia. Prodest verò subinde aquæ frigida³, maxime in facie, aspersio. ⁴ sic & digitorum & extremarum partium frictiones.

3. *Idque per antiperistasin. quia excitat calorem naturalem.*

4. *Quia spiritus ac vapores malos à corde revocat.*

5. *Ratione symptomaticis, non causæ. Hic enim symptoma magis urget.*

Laborante utcunque restituto, exhibendum mox erit: vinum generosissimum, ætate vetus, substantia tenue, colore fulvum, ac boni odoris. quod omnibus, ut Gal. 12. meth. ait, quos syncope male habet, utilissimum: etiamsi à flabile os vetriculi infestetur.

Tali autem vino deficiente, substitui poterit vinum
sac-

saccharo & aromatis conditum: quod vulgò hippocraticum nominant. Danda verò & electuaria, ac Condita cordialia, similiaque fomenta, aut sacculi cordis regioni admoventur: veluti in palpitatione.

Si à venenis assumptis syncope exorta fuit, reparatis utcunq; viribus ac venenis vomitione expurgatis, exhibendum mox erit aliquod alexipharmacum, ut theriace Andromachi, aut Mithridatium, vel aliud similis facultatis. Cordi verò deinde & cordialibus elect. fomentis, unctionibus erit providendum: ut si qua maligna qualitas, vel imbecillitas relicta fuerit, corrigatur. Ab ictu verò venenosæ feræ, offerenda quoq; sunt antidota: ut theriaca dicta. sed vomitione non est opus.

Quod si autem magna aliqua & confertim facta evacuationio, sive sanguinis, sive alterius humoris, causa extiterit deliquij: non solum

6. Quæ contra venena assumpta, alexipharmaca; theriaca, quæ contra ictus animalium profunt, dicuntur. theriace Androm. utrumq; præstat.

7. Ut in aneurismate erumpente. Verum etiam hoc in malo humore, ut in aqua hydropicorum, vel puris in thorace contenti. fieri enim non potest, ut nō simul spiritus vitales exhauriantur.

B b 3

8. *Eoque liquido. facilius enim impleri. potu, quam cibo.*

9. *His ferè, ac maximè opus, post magnam sanguinis evacuationem.*

10. *Quæ quum valde subtilium partium sit, parum nutrit.*

Lea, 76. Mattij 2.

vino odoribusq; reparandę vires sunt, sed laborandum etiam, ut alimento idoneo restituantur : ^a ut jusculis caponum, vel aliarum carniū, vel contusis ex pulpa caponum, pulli, aut perdici. quibus vel amygdala dulcia, vel nucleos nucum pinearum addi, valde expedit. Dari etiam potest succus ex carnibus non plenè affatis expressus ; vel ab ipsis, in duplici vase decoctis, resolutus ⁹. In valde debilibus exhibetur quandoque aqua ex carnibus caponis coctis atque ipsius jure, additis conf. rosarum, flor. cordialium ¹⁰ & aromatis nonnullis, extracta.

Dolorem verò syncope causam etiam sedare oportet, pro conditione & partis laborantis, & causę efficientis: veluti de dolore in febribus dictum est.

Si pravi, ac vitiosi humores, os ventriculi infestantes animi deliquium effecerint, expurgandi sunt, qualescunque tandem fuerint, uti

uti etiam dictum, ubi de syncope in febribus.

Ab uteri autem strangulatione si animi fiat deliquium, " suaveolentia nec naribus sunt admovenda, nec exhibenda. Frictiones, & ligationes inferiorum partium faciendæ. Cucurbitulæ " ad fœmora parte interiore admotæ multū profunt. Reliqua verò & adhibenda, quæ affectus curatio postulat, de quo suo loco.

Syncope autem sæpius aliquem, citra manifestam causam, corripit, non est bonum, nam, ut Hipp. qui frequenter & fortiter sine manifesta causa exolvuntur, derepente moriuntur. 41. aph. 2.

De Cardiaca Passione.

CAP. 34.

CARDIACE oris ventriculi affectus est, qui à stomachi: cardiogmosi sensus in stomacho. quibus si accedat motus cordis celer ac vehemens, cardiaca est: non antea. In syncope causa potest & dolor idem esse: debilius tamen os ventriculi, quam in cardiaca.

11. Quia fumos magis ex utero exhalare, faciunt.

12. Ad miraculum profunt, restitutæ his quandoque, quæ jamjam moritura viderentur.

Prognosis.

1. Cardialgia dolor stomachi: cardiogmosi sensus in sto-

Bb 4

2. Non mentis. ideoque Phrenitidi contrariam Cels. l. 3. c. 19. dixit; quamvis sæpè ad eam phrenitici transeāt. Tertullian. hanc, & Phrenitidem æmulas somno, illam decessu; hanc verò excessu. De Anima. c. 43.
3. Et siccitas. Cels. l. 3. c. 19.
4. In palpitatione rarus. tanta autem vehementia Causæ. ac velocitas in quodam visa, ut magis de dolore brachij, quàm stomachi, conquereretur. quod factum ob picinum nervum. sano illi id nondum aderat. Curatio.
5. Quæ magnam vim anodynâ habet. absinthium ad abstersionem. rosæ ad astrictionem. pars enim princeps usu, non prorsus resolvable.

corde nomen habet. propterea quod veteres os ventriculi καρδίαν .i. cor nuncuparint: & in hoc affectu cor per consensum laborat. Est autem vehemens oris ventriculi dolor, quem comitatur cordis imbecillitas, & quandoque jactatio, animi angor, sudores circa pectus, faciem, & caput copiosi, extremarum partium frigiditas, cordis verò vehemens, frequentissimus, ac velocissimus motus, quem palpitationi similem Gal. affirmat, & similis arteriarum pulsus.

Causa sunt acres ac mordaces humores, vel alioqui maligni, os ventriculi instantes.

In accessione hujus affectus, ori ventriculi adhibendum erit fomentum ex rosis rubris, absinthio, floribus, & chamæmeli ac meliloti in tenui albo vino, aut vino & aqua decoctis.

Frictiones verò, ac ligaturæ crurum, ac brachiorum etiam faciendæ. Enema

verò

verò & aliquod leve inji- 6. *Quæ nos non facimus,*
cere, aut glandem suppo- *quid enim sudorem ab-*
nere, etiam quandoque *stergeri à facie refert,*
conducit. * Aëtius tum *ventriculo laborante?*
spongia ex posca frigida *stragula angustijs vexa-*
faciem etiã lavandam, itra- *tus ipse æger projicit.*
gula incumbentia tollen- *æer refrigerari potest.*
da, & aërem refrigerandum *vino utendum, licet*
consulit: offerendumq; pa- *causa repugnet, ratione*
nem vino intinctum. *symptomatis. in quo*

Revocato ab accessione *Plinius unicam Cardia-*
laborante, cibi offerendi, *cor. morbo spem esse di-*
qui non facile corrumpant- *cit. aliquos autem in ac-*
tur, ut qui lentum habent *cessione dedisse ut sudo-*
succum: veluti pedes suilli, *rem coërcerent. plures*
ovilli, agnini, vitulorum pe- *imminēte morbo, tutius*
des & capita. Ptisana etiam *putasse. l. 23. c. 1. Sen-*
cum cibis utiliter coqui- *tius prætor Chio uteba-*
tur. Si vires dejectæ sunt, *tur. l. 14. c. 14. Hinc*
cibus offerendus, qualis in *illud Senecæ; Bibere, &*
* syncope ex nimia evacua- *sudare vita Cardiaci.*
tione. Expurgandi verò
sunt & vitiosi humores:

*Topica. * Nam prædi-
cta longiori in-
digent concoctione.*

quemadmodum & in syn- 7. *Vinum enim, ni soli-*
cope. quibus expurgatis, os *diori permisceatur cibo,*
ventriculi ungendum * ol. *ἐν Ἀλφὸς πόνον. quod me-*
masticino, vel cytoneorum, *dicis in artis suæ exer-*
citatione compertum. cardiacis igitur cibum aliquem fru-
mentaceum permiscet vino. *πρὸς καλοχὴν τῆς διωάμεως.*
Athenæus. l. dipnosoph. 8. *Ex unctiones, vel empl. non*
sublatis humoribus, magis nocerent, quam prodesse.

B b 5

vel myrtino, vel aliquot horum. addito nonnihil olei nardini. Aut admoventum empl. ex mastiche corio inducta. exhiberi quoque utile syr. de absinthio addito syr. de granat. aut agresta, si calidior sit. Potest verò & commodum esse vinum absinthites, aut ejus loco cerevisia cum absinthio.

Prognosis.

De hujuscemodi autem affectione scripsisse videtur Hipp. aph. 65. lib. 4. Quibus in febribus fortis æltus & cardiogmos, malum. ubi Gal. in comment. ait; Si per Cardiogmum, Hipp. intellexerit, crebrum & velocem cordis motum, & præcipue palpitationi similem, extremum malum significari.

Leñ. 75. Martij 5.

De Inappetentia.

CAP. 35.

Inappetentia, sive fastidium cibi, facultatis est appetitricis abolitæ, seu debilitatæ symptoma, ad ipsius

ipsius oris : ventriculi suctionis sensum deperditum, aut multum debilitatum, subsequens.

Contingit autem inappetentiam fieri, aut quia corpus non evacuatur, neque ei quicquam decedit, aut propter oris ventriculi intemperiem, aut humorum in ventriculo atque toto corpore redundantiam.

Corpus autem non evacuatur, vel propter consuetam intermissa exercitia, vel quia otio ac somno deditum est. Intemperies verò oris ventriculi appetentiam dejicit calida præsertim, & maximè humiditate accedente. calor : siquidem corpora laxando robur eorum dissolvit, & attractionis functionem reddit imbecillam. Humorum autem copia si adsit, & quidem in toto corpore, partium nulla fit naturalis appetentia, illaque cessante neque per venas exsuctio consequitur, multo minus suctionis sensus in ore ventriculi per-

1. *Plurimum negotij hominibus alvus exhibet, cujus gratia major pars mortalium vivit. alias*

enim cibos non trāsmittit: alias non capit: alias non conficit. Plin.l.26.c.8.

1

2

2. *Hinc qui versus Boream degunt voraciores, ijs, qui ad Austrum. ob locorum nempe frigiditatem. 26. Problem. 16.*

3

3. *Quum enim melius & paratius habent alimentum partes, externum non appetunt. Gal. 3. de facultatibus naturalibus.*

4. Illi enim caninam appetētiam, ac bu-
linum excitant.

Signa.

5. Paulus oleosos vocat hos ructus. quod accidunt maximè ijs, qui oleo usi sunt. R. Dodon. Non malè. κνισσα enim ἡ τῆς λιπαρῆς θυμίας, ἡ ἀνάδοσις. At Andern. τὸ, βορβορώδης, non oleosum, sed oletosum reddidit.

Curatio.

6. Ut digeri corpus & occasio appetentiæ esse.

cipi aut sentiri potest. Sic & copioso in ventriculo, præfertim circa os ejus, hærente humore, suctionis sensus impeditur. Humores isti frequenter calidi sunt, quandoque verò frigidi, crassi, ac pituitosi, sed non acidi. Signa autem calidorū sunt ructus, nidorosi, aut amarulenti. frequenter sitis, & subinde nausea. Frigidis verò, crassis, ac pituitosis humoribus redundantibus, ructus non acidi, sed insipidi, sitis nulla.

Quando igitur intermissa exercitia, vel nimia desidia, vel otium, vel somnolentia, inappetentiæ causæ extiterint, ad exercitia & ad labores revocandus est malè habitus: vel ad minus, in cibi parsimonia, vel inedia continendus. Sic etiam si humorū multitudo in corpore recens collecta fuerit. Sed si dudum repletio facta, vena secanda, aut humorū purgatio adhibenda.

Si autem sola ventriculi, aut oris ejus intemperies calida,

calida, inappetentiam cau-
sarit, offerenda erunt refri-
gerantia: ut lactuca, & simi-
lia acetaria. item edulia
actu * frigida, præsertim ex
aceto, panis in posca imbu-
tus. aqua frigida, & potus
qualiscunque, frigidus.

Acetosam, sive ejus suc-
cum, cum cibis sumi con-
fert. sic & fructus immatu-
ros: veluti uvæ crispæ, uvæ
immaturæ, & similia frigi-
da astrictionem nonnul-
lam habentia.

Quod si verò & humo-
res adsint simul, hos expur-
gari refert: calidos quidem
vomitione, si ad hanc la-
borans facilis sit, exhibita
cum aqua tepida oxymeli-
tis \mathfrak{z} i. aut \mathfrak{z} i. β . Aut per
inferiorem vĕtrem, & qui-
dem cum hiera picra addi-
to rhabarb. aut cum infu-
so rhabarb. cui addi pote-
rit aliquid syr. 7 ex cichorio.
Frigidi humores similiter
per hieram picram, aut pill.
* alephanginas expurgandi
sunt, addito agarico, vel
pill. aggregativis, aut simi-

* Hinc illud; Si stoma-
chus Domini fervet vi-
noque ciboque, Frigidior
Geticis petitur Deco-
cta pruinis. Juven. sat. 5.

7. Vel de succo rosarum.
ad refrigerandū, quum
causa sit calida.

8. Quasi Aromaticæ.
Arabicum est nomen.

Lect. 78, Mart. 6.

Topica.

℞. Rosar. rubrarum,
absinthij, origani, majoranae, & menthae (cui odor non est molestus)
ana ℥ 2. Mastich. garyophyll. ana ℥ 1. specierum diagalangæ ℥ 2.
sem. anisi, annios, carui
ana ℥ ʒ. f. omnium pulvis.
qui addito gossypio consuetur in sacculum gerendum ad ostium ventriculi.

libus. prius tamen exhibito syr. acetoso, aut oxymelite, vel eodem cum hiera dato.

Expurgatione facta, si adhuc relictæ debilitas, aut frigida in ventriculo, aut ejus ore intemperies: offerenda confectio aliqua, velut aromat. rosat. vel diagalanga; & in causa valdè frigida, diacalamenthon, aut diatrionpipereon. Vngendum verò & ostium ventriculi ol. nardino, vel de mentha, vel de absinthio, vel simili. Admoveri quoque poterit emplast. aliquod: veluti quod ceratum stomachale appellatur, vel aliud ejus generis. Loco verò empl. & sacculus gestari potest, in quo rosæ rubrae, absinth. organum, majorana, & mentha aut calamentum (si odor non sit molestus) & mastiche, garyophylli, vel alia aromata, vel species diagalangæ, & sem. anisi, ac carvi cum gossypio insuta sint.

Victus ratio, quando frig. intemperie ventriculus vel ostium

otium ejus laborat, ex optimis sit & concoctu facilibus cibis, non lentis, neq; viscosis, nec sale aut fumo dnratis, quæ aromatis condiri utile est, vel calidioribus herbis: ut origano, calamentha, hyssopo, thymo, majorana, & similibus.

Vinum generosum commendatur. Ab usu omnium refrigerantium abstinendum. Ad exercitia & deambulationes laborans ducendus, præsertim corpore jejuno. Temperandum à somno. Otium fugiendum.

Quod si calida intemperies in causa fuerit, non solum quæ ante dicta sunt lactucæ & acetaria; sed & cibi offerendi lenti succi, ut in cardiacæ curatione dictum. Vinum conceditur tenue & pauciferum.

Absinthij quoque usus probatur. & inunctio ex ol. mastichino, vel empl. ex mastiche, ut supra dictum.

10. *Quæ difficilis concoctionis. ventriculus autem hîc malè coquit.*

11. *Qui prohibet corpus dissolvi ac resolvi.*

12. *Ut extrema animæ, pedes, &c.*

13. *Ut in omni cal. affectione ventriculi: absterget enim bilem, & astringit corroboret.*

De Appetentia Depravata.

CAP. 36.

TRes sunt affectus præternaturā, qui ad depravatam appetentiam referuntur, Appetentia sive fames canina, bulimos sive bulimia, & Citta sive pica. Bulimia generale nomen quibusdā videtur, omnem magnam excedentemq; famem, ac appetentiam quoque caninam sub se continens, sed Medici inter bulimiam, & appetentiam caninam distinguunt, ut in progressu fiet manifestum.

Canina fames.

Est autem Canina fames, vehemens ac insatiabile cibi desiderium, & appetentia modum excedens, sic: ut hac laborantes nimis cibis sese expleant, pluresq; ingerant quam retinere in ventriculo queant, & eosdem, vel mox, vel paulo post quā assumpserint evomere: cogantur, eosque subinde omnino crudos, quan-

1. Similis affectus naturalis in Seleucidis aviculis Asiae. 6. Loc. aff. Gal. c. 3. Appellatur & Phagedæna; In definit. & Epid. 6. sect. 3. aph. 57.

quandoque partim conco-
cos & pituitæ permixtos.
post quos vomitione reje-
ctos iterum cibum veluti
rarius appetunt, sicuti canes
vomitu. unde affectioni
nomen factum.

Causa est humor pitui- Causa.
osus, acidus, vel solus, vel
melancholico humori per-
mixtus, ori ventriculi im-
pactus, in ipsum refrige-
rando, pungendo, ac con-
stringendo, veluti morsum
inducit, suctioni naturali
ferè affimilem.

Curationem breviter LeG. 79. Mart. 8.
Curatio.
ostendit Hipp. Famem, in-
quit, vini potio solvit. 21.
aph. 2. ubi per famem non
aliam quam caninam appe-
tentiam intelligendam esse
Gal. dixit. & vinum esse
debere affirmans ex gene-
re illorum, quæ sufficienter
calfaciunt. Ante cujus as-
sumptionē oportere tamen
ait primū offerri pin-
guia edulia, oleagina & ex
oleo parata. nihil verò au-
sterum, aut acre dandum.
postea vinum quale dictum

2. *Vel etiam butyro.*
quod idè Septentrio-
nalibus regionibus co-
piosius Deum Opt. Max.
largitum fuisse, vir Ex-
cell. H. Mercurial. cre-
debat, ut illarum incolæ
famē, quam clima illud
satis magnam inducit,
illius usu quotidiano le-
nire possent.

C c

est, etiamsi nō sitiant ad potandum ipsis laborantibus exhibendum. atque sic quidem statim sedari famem. atque hac victus ratione observata cessare omnino. Potest tamen & alia ratione appetentia canina curari: attenuando videlicet & expurgando humores peccantes. Attenuari possunt humores syr. acetoso vel oxymel. simplici, vel scyllitico, si fortiori opus. Expurgari verò per hieram picram addito agarico, aut pillulis aggregativis, vel similibus. quæ non semel tantum, sed sæpius, si canina appetentia non cessaverit danda. Exhibenda verò & calfacientia ut diagalanga, diatrionpipereon, vel diacalaminthes; aut his fortiora: ut diacyminum, vel diaspoliticon. reliquaque facienda, quæ in curatione inappetentiæ ab humoribus crudis ac frigidis dicta sunt 3.

3. Quidam appetituum rabiem, inquit Basil. cicuta domarunt. 5. Hexameri. Sensus acrimoniam obtundi narcoticorum usu posse, certum est. sed alia fortè tutius quam cicuta adhiberentur; v. g. papaver. albi semen cum melle, aut sacch. præparatum; aut syr. papaveris.

De

De Bulimia.

CAP. 37.

Bulimia : sive bulimos magna & ingens est famēs, ut nomē ipsum ostendit: ad quam & inappetentia, & virium lapsus consequitur.

Causa est inedia & diuturna cibi indigentia. Potest & causa esse externum frigus, non modo os ventriculi, sed & universum corpus refrigerans: veluti ijs contingit, qui per loca frigida ac nivosa iter facientes, diutius famem tolerant. perit enim his tandem appetentia, vires collabuntur, extremæ partes refrigerantur, faciei color mutatur, & pulsus collabitur. Sic & ijs contingit, qui propter famē, aut inediam ex quacunque tandem causa animo linquuntur. nam & his post diu toleratam famem appetentia perit, & vires deficiunt. Ex his facile cognosci potest quid

1. Novi majestatem boum, inquit Varro, & ab his dici pleraq; magna, ut Bulimon. 2. de re rustica. Dicitur & βούλιμα. In definit. & 6. Epid. 3. aph. 37.

Causa.

2. Quæ tamen necessario non accedit. Bulimia potius in frig. aëre, & hyeme. 8. Probl. 5. Erasistrat. 1. διαίτησιν. apud. Gellium, l. 16. c. 3.

inter bulimiam & caninam appetentiam interfit. In appetentia canina cibus non deest, & propter nimiam ejus ingluviem vomitione laborantes infestantur. In bulimia cibi est indigentia, cui animi deliquium succedit.

Curatio.

Quando.g. aliquis propter inediam ac famē diutius toleratam jam viribus est imbecillus, & animo delinquit; primum odora- mentis est revocandus: ut aceti, aromatum, & piro- rum, malorum, vel aliorum fructuum, ut Gal. ait, odore si ad manum sint. item pa- nis præsertim recenter co- cti,³ & carniū aliorumq; cibariū. Panis verò & vino intinctus exhibendus, & juscula carniū, ovaque sorbilia, aliaque, quæ citò alunt, veluti dicta sunt in syncope ab inanitione fa- cta. Exigua autem quanti- tas initio offerenda. sed frequentius & singulis ferè horis, donec vires repara- tæ & majorem quantita- tem

3. Hujus odore per Thesmophoria vitā pro- duxit Democritus. trium videlicet dierum spatium. Diog. Laert.

4. Hoc qui post obsidio- nem Lugduni Batavo- rum immisso mari solu- tam, non observarunt, cibis affatim ingestis, plerique mortui sunt.

rem ac solidiorem cibum
admittant. Nihilominus ta-
men & partes extremæ
uniculis constringendæ, vel
leviter fricandæ sunt.

5. *Ut calore revocato
ad exteriora, alimen-
tum in corpus distri-
bui possit.*

Quod si verò præter ci-
bi indigentiam etiam ac-
cesserit magna refrigera-
tio, ut in itineribus per loca
nivosa contracta, non sta-
tim etiam laborans lucu-
lento aut magno igni ad-
movendus erit, sed sensim
& paulatim calfaciendus.
Frictionibus & ijs, quæ jam
dicta sunt, nō prætermis-
sis.

De Kitta seu Ma- lacia.

CAP. 38.

Citta sive malacia, quæ Lea. 80. Mart. 9.
Epica non rarò Latinis
dicitur, appetentia est de-
pravata: non modum in
quantitate, veluti appeten-
tia canina, excedens, sed in
qualitate aberrans. est enim
concupiscentia pravorum.
nam vel acida, vel acerba
ut immaturos fructus, ali-
quando terram, testas, car-

C c 3

bones extinctos, aliave similia absurda appetunt. nonnulli etiam carnes crudas, vel etiam crudos pisces desiderant.

Cause. Consequitur & ista appetentia oris vetriculi pravam affectionem, tunicis ejus vitioso aliquo humore imbutis: pro cujus varietate modo hæc, modo alia prava appetuntur.

Frequentius autem hujusmodi appetentia mulieribus uterum gerentibus supervenit, & primis quidem mensibus ad 3. aut 4. usque, authore Gal. quum fcetus videlicet adhuc parvulus est, nec multo eget alimento. & præsertim quando vitiosi humores ad os ventriculi confluentes vomitione non expurgantur. quamquam subinde & posterioribus 2 mensibus etiam *κίτλα* gravidis accidat.

- Idem verò affectus & alijs nonnullis mulieribus, tum & viris nonnunquam supervenit, humore vitioso
ad

4. Ita ut non possit sanguinem per menses purgandum absumere.

2. Non tamen cum vomitione.

ad ventriculi ostium delato, atque illi firmitus inhaerente. Quandoque verò & alia quædam in corpore latens est causa, quæ appetentiam pravarum rerum excitat: qua permanēte, etiam appetentia perseverat.

Gravidas autem, quando *κίτλα* ipsis accidit, in cibo parciores esse cōvenit, nec temerè quosvis ingerere, sed optimos tantummodo & boni succi. Quod si nausea adsit, & morsus aliquis sentiatur in ore ventriculi, exhibenda aqua tepida cum exiguo oxymelitis, ut vomitio succedat, atque vitiosi humores expurgentur. Mediocre corporis exercitiū convenit, & deambulationes ad loca amœna, & cibi, ut Paulus refert, non nimium dulces. Vina fulva, odorata, & quinquennia .i. vetera; & moderata potio. Commendatur etiam initio sumere mensæ: olivas muria conditas, vel 6. aut 7. amygdala 6 amara. Sub finem

Curatio.

3. *¶* humores superflui melius possent concoqui. alioqui multi humores congesti corrumpuntur à malis illis succis.

4. Ita per universum distributi humores minus confluent ad ventriculum.

5. Et omnia quæ roburare stomachū possunt. Olive resiccāt, quia salis. & astringunt, quum immatura condiantur. unde & salivationi ventriculi conferunt.

6. Sic & absinthium. ratione abstersionis.

C c 4

7. Ut pira omnia no-
stra, ac bellaria ex his
confecta.

8. .i. Rhabarbarum per
barbariam ex regione
Chinarum ad nos dela-
tū. ratione astrictionis.

9. Ne ostium ventriculi
omnino refrigeretur,
admiscenda
calida pau-
ca astringentibus.

Vnctiones.

Laudat Aëtius pastil-
los Amazonum. verum
Gal. ex quo citat, ad
vetriculi sub-
versiones, nō
κίτλα commendat.

Cataplasma.

10. Non tantum pro-
sunt in κίτλα, sed & si
non solum manē, sed
etiam interdum vomant:

11. 4. Rosar. rub. ba-
laust. absinthij
ana 3 2. sem.

Sacculi.

fœniculi, coriā dri, myr-
ti ana 3 1. santal. lut.
rubrorum, mastich. thu-
ris, garyophyllorum ana

3 2. cum gossypio 3. q. s. f. f. sacculus. Pulveres plures
quam 12. & pauciores 16. 3 debent esse. ideo absinth.
& rosas per pondera descripsi. R. Dod.

dandæ carnes cydoneorum
conditæ: vel ex his facta
alia bellaria: vel conserva
rosarum rubrarum; vel ali-
quot mali punici grana, aut
similia astringentia 7 ori
grata. Paulus verò & rha-
ponticum 8 & ante cibum,
& post, assumi posse refert.

Vnctiones verò oris ven-
triculi & faciendæ sunt ex
oleis astringentibus: ut ma-
sticino oleo, cydoneorum.
quibus aliquid ol. de 9 men-
tha, aut de absinthio admif-
ceri poterit. Laudantur &
cataplasmata ex cœnanthe
.i. immaturo uvæ fructu,
balaustijs, smyrnij semine,
pæoniæ, & fœniculi semi-
ne, cū palmulis & vino ve-
teri. Cujus loco admoventi
poterit vel ex sola 10 masti-
che emplastrum, vel sacculi
11 in quibus rosæ rubræ, ab-
sinthium, balaustia, fœni-
culi, coriandri & myrti se-
mina, santali lutei & ruben-

tus,

res, mastiche, thus & garyophylli cum gossypio sint infusa.

Si verò mulieribus non ²
gravidis, aut viris hujusce-
modi depravata appeten-
tia accidat, purgatione vi-
tiosorum humorum curan-
di erunt. Vomitu, quidem
ad hunc prompti, alij pur-
gatione per inferna. veluti
in curatione inappetentiæ
dictum est.

Quibus verò aliqua in ³
corpore latens hujus sym-
ptomatis causa fuerit, ^{12.} *Vt à lato lumbrico,*
non prius cessat depravata *quod in viro factum.*
appetentia, quam causa sub- *Alia, cui intestinū disse-*
lata. quæ si tolli nequeat, *etæ plenū flatibus inven-*
affectio permanet. licet ta- *tum, quibus cōmotis co-*
men non assidue, sed per *gebatur crudos pisces*
intervalla tantummodo re- *comedere, unde vulgò*
currat, causa videlicet se *lutram eam in ventre*
movente. *habere existimabatur.*

De Siti.

CAP. 39.

Sitis naturalis est appe- ^{Lect. 81. Marc. 12.}
tentia humidi ejus, quod
cibi ac alimenti est vehicu-
lum; sed quæ modum exce-

C c 5

dit symptoma est appetitricis facultatis depravatæ.

Causæ.

1. *Ut in bima puellula, cui ventriculus, qua folliculo fellis adjacet, non solum æruginosa bile perfusus, sed & ab eadem perforatus erat: unde ingestis uno die cerevisiæ libris sex, septemvè, sitim tamen restringere, non poterat.*

2. *Quæ inditium medicamenti bonè operantis.*

Cujus causa esse potest aut calida, aut sicca, vel utraque, ventriculi & præsertim ipsius oris intemperies. Vel falsi & biliosi humores os ventriculi mordicantes; vel etiam ejusmodi edulia, aut potiones. non rarò verò etiam meracissimi ac potentissimi vini potus. In jocinore verò, ac præsertim ejus sima ac interna parte, in mesenterio, in jejuno intestino, in imo ventre, vel etiam in ipso pulmone si affectio aliqua constiterit erysipelatis aut inflammationis naturâ referens: sitis etiam accenditur, ut in febribus acutis. Potest verò & inopia humidi sitis causa esse: veluti post copiosa sanguinis profluvia, vel post alias vacationes sive sponte, sive à medicamētis factis. sic & post labores ac sudores immodicos. Non rarò autem & diabetes, proprius renum affectus, ingentis sitis causa est.

est. quem Gal. ea de causa
Dipsacum vocat, & caninæ
appetentiæ proportionem re-
pondere ait. Iam verò &
hydropici 3 frequentissime
iti prænuntur.

3. In ascite, quod humo-
res sint acres. In leu-

Curatio. cophlegmatia,
quia febricula
ferè etiam adest; utpote
humoribus putrescenti-
bus.

4. Non solum aqua, sed
etiam cererisia.

Si itaque sitis causa fuerit
calida aliqua in ore ventri-
culi citra humorẽ intempe-
ries, frigida & potio condu-
cit. tum & ea profunt, quæ
adversus inappetentiam ex
hac causa supra cõmenda-
ta sunt. Sic & siccitatis for-
ius humidũ remedium est.

Quod si verò falsi ac bi-
tiosi humores sitim excita-
int: (quod ex falso vel
amaro in ore sapore, aut
iuscemodi ructu cognosci
potest) tunc humorum va-
riatio facienda, ut in cura-
tione inappetentiæ ex hac
causa dictum est. Cibis ve-
rò falsis aut acris assum-
ptis, aut nimio vino mera-
to: superdormire utile fue-
rit. concoquitur enim ut
Gal. in comment. 27. aph.

. particulæ, per somnum
quod assumptum est, ac
eorsum descendit.

5. Ac tum qualitate
amissa, sitim non fa-
ciunt amplius.

Quando verò interiorum partium aliqua inflammatio, aut erysipelatis naturam referens affectio, aut febris acuta, magnæ ac modum excedētis sitis causa extiterit: quomodo, & qua ratione eis sit succurrendum ante ostensum, ubi de siti in febribus. Ibidem quoque dictum, quid faciendum: quando post magnam vacationem, sive sanguinis, sive alterius humoris, sitis nimia urget. Citò enim nutriri, ac refici laborantes, debent, & humido quidem alimento: nam, ut Hipp. facilius est impleri potu quam cibo. I. I. aph. 5.

6. Concretis quosdam ossibus, ac sine medullis vivere accepimus. signum eorum esse nec sitim sentire, nec sudorē emitte. Quamquam & voluntate scimus sitim vivere. equitemq; Romanum in pupillaribus annis aque subtercutem fuisse morbo prohibitum humore à medicis, naturam fecisse consuetudine, atque in senectâ caruisse potu. Plin. l. 7. c. 18.

7. In ascite forte non prodesset ob humorum acrimoniam.

Adversus diabete[m] autem, quæ semper ingentis sitis est causa; cujusmodi remedijs sit utendum, suo loco dicetur. Hydropicis sitim ferre expediens ac utile est. præsertim leucophlegmatia sive hyposarca laborantibus. profuit his nonnunquã gingiberis frustum in ore continere, atque ipsum subinde mādere. sali-

salivam enim provocat. per quam sitis nonnihil sedatur, & simul ad superfluae humiditatis resiccationem conducit.

Cavendum autem est urgente siti, ne multus ac copiosus potus affatim ingeratur. nam vehementi siti laborantes, si larga portione utantur. 4. accidentium periculum, ut Gal.³ ait subire solent: Vel enim ad vomitum irritantur: vel potu citò per intestina descendente fluore, alvi autlyenteria corripuntur: Vel potus in ventriculo hærens ejusdem inflationem, parit: vel celeriter per vias urinæ transiens diabeten, si ve urinæ fluorem excitat.

hausto tali lacte: nisi id concretum evomant.

8. Lib. 6. de loc. aff. cap. 1. Nulla re similis est fabricitantium sitis siti sanorum. hi si bibant, non ultra sitiunt. illi verò brevi tempore se bibisse cum delectatione sentiunt, dein nau-seant, aqua in bilem vertitur, vomunt, tormina patiuntur, iterumq; validius sitiunt. Epictet. apud Arrian. l. 4. c. 9. 9. Quod multum cōtingit febricitantibus crassam cererisiam bibentibus. quum descendere non possit. Nocet etiam lac. magis tamē ex quo butyrum extractum. cito enim concrescit in ventriculo calido. sic quidam subito pereunt

De Nausea & Vomitu.

CAP. 40.

Lect. 82. Mart. 13.

Nausea & vomitus facultatis expultricis ventriculi motus sunt de-

1. Sic quidam difficiles ad vomendum: quod re-
tentricem habent fir-
mam. Loquimur autem
de ea, quæ fit ante cibum
assumptum. de ea, quæ
post cibum infra age-
mus.

pravati, accedente: reten-
triciis debilitate. in hoc ta-
men differentes, quod nau-
sea conatus quidam sit ad
vomitionem irritus, sive
inanis irritatio ventriculum
atque ejus ostium commo-
vens; nullum interim hu-
morem expellens: Vomi-
tus verò eorum, quæ in
ventriculo continentur, at-
que ipsi molesta sunt, sur-
sum per os vehemens est
expulsio.

Contrahit autem se tunc
ventriculus circum ea, quæ
in ipso sunt: ac eo modo
extrudit & expellit, quæ ex-
cernuntur. Nausea autem
vomitus præcedit. non ta-
men semper, nauseam vo-
mitus sequitur. Hæc si in
morbis acutis in die super-
veniat theoritico, aut de-
cretorio apparentibus sig-
nis concoctionis, futuræ
per vomitum crisis & solu-
tionis ipsius morbi spem
facit. atque hujuscemodi
nauseæ non est resisten-
dum: veluti neque vomitio-
ni, quæ in die fit decretorio
quam-

quoadmodum confert, & leviter
vertur.

Sed nausæ alio tempore
molestæ, per curationem
eccantium & vitiosorum
humorum curandæ sunt, ut
prius dictum.

Sic & vomitus, qui die
non decretorio, nec appa-
rentibus signis concoctio-
is supervenit, & molestè
vertur modumque excedit,
c vires dejicit: omni si-
cendus est modo, partim
divertentibus, partim alijs
remedijs, pro causæ tamen
efficientis conditione: nam
humores biliosi acres ac
mordaces vomitum effe-
cerint, veluti in febribus
acutis, curatio instituenda
est dictum est, ubi de cura-
tione vomitus in febribus.

Si autem frigidi ac pitui-
osi humores copia sua
ventriculum aggravent, &
ad vomitionem impellant,
c simul adsint graves ac
molesti dolores colicis si-
miles (facta prius sive per
nematata, sive per glandes
diversione) fomenta erunt

Fomenta.

2. *Incrassis corporibus ut penetret. in tenuibus magis vinū placet, quum tanta diductione non est opus.*

3. *Quia calfaciunt, atque ut fructus immaturi astringunt.*

4. *Vt si sint flatus aliqui discutiantur.*

5. *Vel sponsia horum decocto imbuta. quidam orbem ligneū calfactum applicant. apponunt etiam ligneam patellam cineribus calidis plenam, cui superinductus pannus duplex vino madefactus. Itale mulierculæ cineres calidos linteo immisos applicant. Ex ligneis orbibus nimium calidis, nimisque frequenter admotis, hepar inflammatum, suppuratum, atque ægrum mori vidimus.*

adhibenda, ventriculo ac ejus ostio calida, veluti ex crusta panis tosta & aceto deinde, vel generoso vino leviter madefacta, superasperso pulvere garyophyllorum: vel garyophyllis: ipsis crustæ impositis, quæ tam calida quam ferri potest applicanda.

Hujus loco sacculo uti licebit. in quo absinthium, rosæ, origanum, calamentum, pulegium, serpillum, thymus & similes herbæ: & sem. anisi, carvi, cymini sint insuta. qui in vino decoctus & expressus erit ventriculo admovendus. Sedato vomitū, offerenda ventriculū calfacientia ac roborantia, & unguentis, ceratis, ac sacculis cum gossypio utendum: veluti in curatione fastidij à causa frigida. observata eadem ac simili victus ratione. Si autem non vehemens pituitosorum ac crudorum humorum vomitio sit, neque cum magno dolore, & frequenter singulisque ferè diebus

ebus recurrens: hiera pi-
ra danda erit, vel pillulæ
ephanginæ, aut simile ali-
quod med. cum syr. aceto-
sæ, vel oxymelite. Syr. etiam
acetosus sive simpl. vel
etiam compositus jejuno
ventriculo sumptus sæpè
plus vomitionem curavit
quàm: humores pituitosos
incidens ac deorsum com-
pellens. Postea possunt con-
fect. dari: & unctiones si-
milisq; localia adhiberi ut
ante dictum.

Contingit autem vom-
itionem non solum propter
vitiosorum humorû in ven-
triculo collectionem ac re-
ludantiam fieri, sed &
alijs de causis. Colicos, ac
ephriticos dolores fre-
quenter comitatur vom-
itus, & non rarò ipsius pau-
cò antè assumpti cibi, non-
nunquam verò & crudo-
rum humorum. Huic au-
tem vomitioni non aliud
adhibendum remediû quàm
affectio, quam comitatur,
requirit. Exonerat se &
quandoque lien, aut jecur

6. *Vel ipsi ex ijs, quæ
vêtriculo utilia, ut enu-
la, mentha, origano cum
aceto & saccharo com-
ponimus.*

7. *In exigua quanti-
tate, & ut vomitum fa-
ciat. tamen causam tol-
lit.*

Prognosis.

Lect. 83. Mart. 15.

8. *Quicquid fuerit in
ventriculo. non enim
per se afficitur.*

9. In pulmone, vel mesenterio vomitum non movet, sed quandoque per intestina effertur pus. quod Fernel. ait, & vidi. nihil autem, mali modo ita erumpat.

10. Semper quidē adest. verum quandoq; minor. ita ut assumpta retineri queant. ac tum major spes salutis,

& copiosum sanguinem, eumque atrum ad ventriculum demittit, qui deinde cum vomitu per vim cum molestia & magna virium dejectione rejicitur, de qua prius dictum est. Ilei dolorem vomitus quoque comitatur. qui gravis, molestus & perniciosus, ut Hipp. refert 10. aph. 7. præsertim quando alvi excrementa per os redduntur, & ea quæ subtus injecta sunt sive enemata, sive glandes sursum rapiuntur. Est & malus vomitus ex phymatis, sive tuberculi interioris ruptione. quod quidem vel in ventriculo, 9 aut sima hepatis parte, vel in liene, aut vicina aliqua constitit. Iam & malus vomitus est in omni capitis vulnere. ostendit enim cerebri meninges, vel ipsam ejus substantiā simul læsam esse. quod absque summo vitæ periculo non accidit. Pestilentes febres comitatur etiam 10 perniciosus vomitus. qui veneni vehementiam & malignitatem

tatē ostendit. In omni. a. vomitu ex quacūq; causa fiat, singultus & oculorū rubor, Hipp. authore, mala sunt. Malæ verò & convulsiones. significāt enim superfluam ac nimiam corporis inanitionem. Extant verò & nonnullæ apud Hipp. 2. prædict. de vomitu sententiæ. quas illic requirēdas reliquimus.

11. Qui vomunt faciliè laborāt oculis. nec aded malum. neque etiam in Coacis ejus fit mentio. sed solum in aph. qui fortè depravati.

De imbecillitate ventriculi.

CAP. 41.

Ventriculi imbecillitas ejus dicitur affectio, per quam cibus assumptus ægrè retinetur ac difficulter tardèque conficitur, & subinde cū exigua appetentia concupiscitur sic, ut non nisi modicus assumi queat; languor nempe ventriculi & virium ejus exolutio.

Hujuscemodi autem imbecillitas non rarò ex morbo convalescētibus adest, quandoque verò ex ejus intemperie humida ipsum laxante, contingit. & talem quidem affectum *ὑπὸ τῆς*

1. Nescio an stomachi solutionem dicens Scribonius non hunc affectum intellexerit. Vox *ὑπὸ τῆς* cessationē denotat apud Polluc. 1.3.

c. 25.
Causæ.

2. Ore ventriculi cum alijs corporis partibus debilitato.

D d 2

veteres appellant, sive supinitatem. quod videlicet resolutis ejus viribus quasi supinus jacet.

I

Ἀνατροπή.

3. Videtur sic appellare, tum appetitus perditionem, tum nauseosas dispositiones, in quibus aliquando quidem vomitus contingunt. fiunt, si post adsumptum cibum paulo vehementius moveant. 8. καὶ τὸ π.

Causa.

Huic proxima est ἡ ἀνατροπή dicta, seu subversio ventriculi. nauseosa affectio & conatus quidam vomendi, sed ab assumpto cibo. in quo à nausea differt, nausea enim jejuno accidit ventriculo : ἀνατροπή verò post cibum assumptum.

Accidit hæc propter ventriculi facultatis retentricis debilitatem : quando videlicet plus cibi ingestum est, quam commodè venterculus amplecti & concoquere valeat. Hoc autem modo affectos, stomaticos veteres nominant.

2

Lib. 84. Martij 16.

4. [Aët. cap. de vomitu sic appellari dicit vomitus concitatiores à serosis ac malignis humoribus.]

Reperitur verò & alterius ἀνατροπῆς apud Gal. mentio lib. 8. secund. locos qui εἰλεώδης cognominatur. interpret, volvulosam stomachi + subversionem, vocat. hæc cum magno dolore contingit & à priore differens est.

Superioribus autem duobus

us malis annumeratur
etiam ventriculi *πυελισμός*
ive salivatio. quæ est humi-
la : ipsius constitutio cum
dulcis pituitæ in eo redun-
dantia. quæ deinde sensim
ad fauces sursum fertur, ac
per frequentem screatum
expuitur.

Salivatio.

5. Hic major humorum
copia . quo à prioribus
differt. *πλόιδον* author
lib. qui Medic. inscribi-
tur cap. de humoribus
appellat.

Curatio.

Curatio horum affectuum
in bona victus vivendique
ratione potissimum consi-
stit. Resiccantium, ac me-
diocriter astringentiũ usus
utilis est; Et si frigiditas ad-
sit, moderatè calfaciētium.
Exercitium non vehemens
& sudorem non movens,
jejuno corpore, conducit,
& exigui temporis à cibo
abstinentia. Post cibum
sumptum quiescendũ est:
præsertim quum ventricu-
lus subversione laboret .
ac suo tempore somnus ad-
mittendus. Cibus opor-
tet esse facilis concoctio-
nis: ut sunt ova, carnes, vi-
tulorum, & volucrum. in-
ter quæ laudantur aviculæ
silvestres & montanæ, lon-
gè à locis palustribus ver-

6. Quia omne, quod vi-
res dejicit, etiam ven-
triculi robur frangit.

7. Ut concoctio melius
persici possit.

8. Quia levi motu ad
vomitum incitarentur.

9. [Dicit hoc etiam Gal. 7. meth. 4. ac paucum etiam vult esse.] *πλάδον* ventriculi resiccet *ἐνγοφάρυα*, & absinthij potus. In med. c. de humor.

10. Præsertim si frigidus ventriculus, ne frigidis offendatur. Pro sunt verò, & quæ bene olent. nam odores *τὸ κὺ-τὸ ἀπὸν* quod inter verticem atque umbilicum est [imò & quæ infra, ut Matricem] *τεχ-χῶει*, ἢ *πεχῶει*, ut scribit in Timæo Plato.

11. Sic caro salsa, harenga, & similia, jus olivarum ratione salis resiccantia.

12. *℞. Rosar. rubr. sem. coriandr. preparati, cinnamoni ana ℥ 2. mastich. garyophyll. sem. anisi. ana ℥ β. sacchari quantum est pondus omnium.*

santes. Præstat autem cibum assum, magis quam elixum edere, & astringentibus nonnullis conditum, ut uva immatura, uva crispata, baccis oxyacanthæ seu berberis, mali punici acinis. vino omphacite, quod omphacium vocant; quibus & aromata admiscenda sunt: ut gingiber, cinnamomum, garyophylli, vel etiam piper aut galanga. possunt & olivæ muria conditæ dari, tum & cap-pares; & quæcunq; sunt talia. quæ vel statim initio, vel cum ipso cibo statim assumere prodest. A cibo laudantur astringentia, ut sunt carnes cydoneorum, inter quas præstant aromata admixta habentes. Dantur verò & utiliter tragemata quædam post cibum: ut ex rosis rubris, sem. coriandr. cinnamomo, & alijs nonnullis cum saccharo permixta. quæ cum particula panis tosti in vino madefacti aut aliter exhibentur. Vnctiones autem

ex

ex ol. astringentibus. tum
& alia localia, qualia in
iustā dicta sunt, cōveniunt.

Quod si verò & adeo
multa sit ventriculi humi-
ditas ut præscripta ratione
non mox corrigatur, dan-
da erit pill. una ex hiera-
picra, vel alephang. pon-
dere .i. 3 β. bis tervè in
hebdomada, mane jejuno
ventriculo. quæ ad humidi-
tatem resiccandam, & ro-
borandum ventriculū pro-
desse poterit.

Subversio autem illa, quæ
volvulosa dicitur curatio-
nem requirit, qualem crudi
humoris cum dolore, vo-
mitio. de qua ante dictum.
Commendant ad hanc ve-
teres pastillū Amazonium
quam ex calidis, aliquot
mod. componitur, quibus
additur opium. hujus loco
nostra ætate diagalanga,
diacyminū, & similes com-
pos. receptæ sunt. neq; alijs
utimur, nisi magnitudo do-
loris ad opiata impellat.

13. Magnā enim quan-
tatem non fert ventri-
culus, & si non statim
purget; tempore id fa-
ciat.

14. ℞. Sem. felini ʒvj.
anisi ʒvj. absinthij ʒ
iiij. piperis ʒij. myr-
rhæ ʒij. cinnamomi
ʒvj. opij ʒij. castorij
ʒij. fiant cum aq. tro-
chi Dosis integra ʒj.
Stomachicis cum vini
protropi ʒiiij. exhibe-
tur. 8. Secundum loca
Gal. ex Asclepiade.

Leq. 84. Martij 19.

De Cruditate.

I. Ventr̄is haud segne ministerium, nec magis alitur, quam alit, red- dens in omnes corporis partes hunc, quo viri- mus, vigemusq; divisum pariter in venas matu- rum confecto cibo san- guinem. Agrippa Mo- nen. apud Liviū. dec. 1. l. 2. Hinc regem totius corporis dixere: quod huius validus firmet te- nor omnia membra. At contra ejusdē fran- gantur cuncta dolore. Sammon. Hinc quidam omnes morbos, quod omnes ex stomacho ori- antur, uno remedio cu- rari posse scripsit. Mul- tos sanè propter erra- res in victu commissos, oriri; illosq; uno ven- trem deonerantium ge- nere curari, verum.

Cruditas facultatis cō- coctricis ipsius: ven- triculi frustratio est. Tri- plici hæc accidit mode
1. Quando cibus assum- ptus omnino nō alteratur: quæ ἀπεψία dicitur. & ex- trema est cruditas. 2. Quā- do cibus quidem alteratur, sed tardè & difficulter ad- modum, sic ut multo tem- pore vix mutationem sus- cipiat, dicitur & hæc crudi- tas, non tamen privatio- nem, sed vitium tantum- modo significans; græci βεβδονεψίαν .i. tardam concoctionem appellant.
3. Quando assumpta non ut oportet mutantur, sed non corrumpuntur sic ut concoqui nequeant, atque in substantiam idoneam ad corporis nutritionem con- verti non possint. & tale quidem concoctionis vi- tium cruditatis etiam no- mine comprehenditur. & nullum nomen proprium, ut Gal. ait, obtinet.

Causa

Causa autem cruditatis *Causæ,*

duplex est: vel enim ipsius ventriculi facultas læsa, vel aliquis externus error. Læditur autem ventriculi facultas vel per intemperiem aliquam, frequentius frigidam, subinde tamen & nimis calidam; & quandoq; absq; humore, quandoque cum humore: vel propter inflammationem, erysipelas aut similem instrumentalem morbum² in eo consistentem, per quem facultas ejus læditur.

Error autem extrinsecus adveniens concoctionem impediens tripliciter fieri potest. 1. propter humores vitiosos in eo contentos. 2. à cibis. 3. propter exiguum ac breviorē somnum. Et frigida quidem intemperies concoctionem impedit, vel tardiorē eam reddit. Similiter existentes in eo frigidi ac pituitosi humores concoctionem assumptorum remorantur. Nimis etiam calida ven-

2. Siquidem accedat intemperies, alias novimus aliquē, cui ob aneurisma nulla ventriculi, in quo erat, actio læsa; imò ob calidum sanguinem auctū, fortè etiam melior fuit, eo tamen erumpente subitò mortuus est; quum antea benè pinguis, bona ratione victus, factus esset.

3. Sunt autem tales, vel tricoli intemperies cibo sua natura: ut Fungi, ex facilis concoctionis cor quorum usu etiam non rumpit, ac in pravam substantiam convertit. quod & Claudius supserat, post biliosi, ac vitiosi humores quē nihil amplius edit) in ventriculo existentes, faciunt. Pravi item ac vitiosi cibi: bonam concoctionem impediunt. licet nullo affectu ventriculus laboret. Impeditur verò, & concoctio per immodicam ciborum portionisque quantitatem. quando videlicet tanta assumptorum est copia, ut nec commodè amplecti, nec retinere eos ventriculus queat. tunc enim assumpta subinde vomitu rejiciuntur, vel multum temporis quietis ac somni ad concoctionem requirunt.

4. Quanta est gula que sibi totos Ponit apros- Pœna tamen præfens, quum tu deponis amictus Turgidus & crudum pavonem in balnea portas. Hinc subitæ mortes, atque intestata senectus. Iuvenal. Sat. l. Hinc illud. Plures necat gula quam gladius.

5. Ut caseum. sic quendam nori, qui ita oderat vaccinā carnē ut etiam si ex bove comedisset & quis cum ex vacca comedisse diceret, omnia eromeret. Nil autem refert, an propter idiosyncrasiam cibū aliquē abhorreat, an verò ἢ ἐκ τῶν ὑπονοίας illos turbet, quod Asclapiades Menedemo quondam exprobravit.

Sic

Sic & nonnullorum substantia concoctioni rebellis est: ut sunt vinacea, & olliculi uvarum, cappares, aliorumq; fructuum membranæ, furfures, & plura alia, quæ non permutata cum excrementis descendunt. Ordo quoque in assumendis cibis præposterus, ut Gal. ait, quandoq; & cruditatis causa est: veluti, inquit, si quis exempli causa, aut cotonea, aut malaunica in primis ingessit, nox olera ex oleo & garo. Potest & cibus intempestivè assumptus idem efficiere: quò videlicet ingeditur priusquàm antecedens concoctus sit, aut descendit. Et totidem quidem modis per cibum concoctio impeditur.

Opus verò est ad cibi propriam concoctionem, quiete & somno. si itaque somnus impediatur, aut brevior sit, cruditatis, quoque habitum. Eodem sensu, & illud recubitus, si quid aliud, concoctionem adjuvat, s. 4. c. 50.

6. Cujus loco nos oleo & aceto condimus cibos. Varietas etiam per se laedit: Neque verum est, quod ab Asclepiade dicitur, facilius concoqui cibos varios. eduntur enim facilius. ad concoctionem autem materiae genus, & modus attinent. Cels. l. 3. c. 6. At vel ob id ipsum vitando, quod non esurientem ad comedendum invitent. Varietas itaque ciborum mala; condimentorum pessima reputanda est.

7. Nam calor, cujus opera concoctio fit, intro per somnum fertur. Itaque quod Plinius dicit: Pervigilio præcipuè vinci cibos. l. 11. c. 53. non aliter verum est, quam quod à ventriculo quem gravant, vel semicocti facilius descendunt; vel jam cocti facilius distribuuntur ad

Aëtij capiendū: Erectior

causa erit, nullo in ventriculo interno vitio existente, ut Gal. confessus est.

Lect. 86, Mart. 20.

Curatio.

Curatio cruditatis per causæ efficientis conditione perficitur. Si frigiditas ventriculi sola concoctio nem remoretur exhibenda sunt aromata calida per se vel cum cibis permixta: vel cōpositiones similes. deinde & unctiones, empl. sacculi ut in curatione ex causa frigida. Conducit verò & fots cum spongia ex vino forti, fulvo, veteri, non dulci, sed aultero. Iam & catellos viuentes extrinsecus admoveri ventriculo non parum prodest. Gal. puellū carnosum per quietem admoveri consulit.

Quod si simul adsint frig. humores, expurgare eos oportet: veluti in appetentia canina dictum; si non usu oxymelitis aut syr. acetosi concoctio emendetur.

Intemperies verò calida absque humore eadem curatione, qua cibi inappetentia

entia à simili causa : usu vi-
elicet actu ac potentia re-
frigerantium.

Humores autem biliosi, ac
vitiosi concoctionē depra-
vantes expurgandi sunt,
ut eluti ante dictum.

Circa autem cibi exhibi-
tionem sollicitudo habenda
est, ut non detur nisi post
mediocre exercitium ; &
non nisi optimus ac facilis
concoctionis, qualis ante
dictus. & quies ac somnus
non impediantur. Vitiosa
verò ac corrupta alimenta
quam citissimè vel vomiti-
one rejicienda sunt, vel
per alvū deducenda. Si im-
modica assumptorū quan-
titas offenderit, quies &
somnia imperanda sunt.
Eadem facienda quando
præposterè, vel intempesti-
vè cibi assumpti sunt.

Magna autem cruditas
ventriculi diu cōsistens, vel
ad lienteriam, vel ad hydro-
pem laborantem perducit.
Sed quæ ex vitiosis humo-
ribus, aut ex pravis fit ciba-
rijs, facile febrem inducit.

8. Si coactus fueris in
epulis surge per medium
transiēs, vome, & quies-
ces. Ecclesiastic. c. 31.
v. 24. h. e. refrigerabit
te, & corpori tuo non
adduces infirmitatem,
ut additur in vers. vul-
gari.

9. Quæ dato medica-
mento quam citissimè
desinit. calor enim non-
dum in sanguine hæret.

De Inflatione ventriculi.

INflatio ventriculi ejus cum dolore est distensio, ex flatuoso spiritu in ipso collecto, & neque sursum, neque deorsum exitum habente.

Causa vel alimenta sunt cruda: ut olera cruda, fructus crudi. qui suapte natura ad flatus gignendos sunt idonei: ut & legumina quædam. Alia causa, frigidi & pituitosi, crassi sunt humores à debili calore in halitus ac flatus resoluti; qui à retentrice facultate diutius quam par est retinentur. Quæ autem harum efficiens sit causa, non difficulter cognoscitur. nam crudorum olerum, fructuum, leguminumvè esus latere non potest. & hinc genita inflatio non est diuturna. Sed si cruda non fuerint assumpta, vel cibi ad flatus gignendos idonei, causam esse crudos, crassos,

1. *Tenuis enim pituita non facit flatus, qui diu in ventriculo hæreant. tenues enim sunt; ideoque facile discutuntur.*

crassos, viscidosq; humores
sit manifestum.

Ad inflationem autem *Curatio.*

ex crudis oleribus, aut simi-
libus cibis flatum ingene-
rantibus, sufficiunt excalfa-
cientia : piper, gingiber,
galanga, & ex compos. dia-
galanga, diacyminum, dia-
spolit. & similia.

Si verò inflatio fiat ex cru-
dis & crassis humoribus;
hos expurgare oportet.
nec satis est hiera picra so-
la, sed admiscenda ei for-

tiora sunt, ut sunt pill. ag-
gregativæ vel iliacæ pill.

Rhaz. 3 quæ in omni dolore
ex flatu sive ventriculi, sive
intestinorum, mirificæ sunt
& singulares. harum .g. 7.
aut 8. cum pill. hiera mis-
ceri multum conducit. In
hoc casu enemata aut glan-
des 4 parum prosunt: si ta-
men omnino enemata inji-
cienda videantur, acria esse
oportet, ne diu hæreant, &
flatibus viam impedian-
t. præstat idcirco glandibus
uti.

Victus ratio & reliquo-

2. Non vinum, ne parte
crudi humoris ad hepar
rapta, obstructione fe-
brem faciat. Piper,
Zinzeber, & præsertim
cressiusculè contusa, aut
integra vix ultra ven-
triculum actionē suam
extendunt.

3. Recipiunt Colocynt
sagapeni ana 3 1. scam-
monij 3 1. Valida qui-
dem per se existunt,
sed in exigua quanti-
tate paucorum nempe
granorum, lenioribus
pilulis permistæ medio-
criter, ac nihilominus
tuto agunt.

4. Quia Glandes supra
Rectum; Enemata su-
pra Colum intestinum
vix adscendunt.

rum med. in hoc affectu talis esse debet qualis in omni ex causa frigida ventriculi affectione. de quibus ante dictum.

De Inflammatione Ventriculi.

Lect. 87. Matt. 22.

1. *Omnis enim pars, quæ sanguinem alimentum accipit, etiam ossa ipsa, illo superfluo irridente, inflammatione corripi potest.*

2. *Præsertim in non admodum obesis.*

Ventriculum, vel ejus ostium, inflammatione corripi posse, non est à ratione alienum; sed tamen raro admodum contingit. Nata autem in illo inflammatio dolorem & tumorem affert, qui & admota manu sentiri potest. adest febris continua, sitis, & linguæ ariditas. quæ etiam majora sunt, si inflammatio erysipelatis naturam referat; minora, si vel ex solo sanguine, vel sanguine pituitoso originem habuerit.

Curatio.

Curatio à sanguinis missione incipere debet. secunda autem erit vena dextri brachij media, aut interna; sollicitudine adhibita, ne in animi deliquium incidat laborans. quamobrem non tantum

tantum sanguinis quantum
opus videbitur una vice,
sed potius duabus extrahē-
lum erit. Ventriculo enim
& præsertim ejus ostio-
o laborante facile animi
deliquium supervenit. De-
tracto sanguine non dan-
da purgantia medica-
menta, sed alvus leni aliquo ene-
mate expurganda. & qui-
dem sæpius, si opus fuerit.
ut ex decocto malvæ, bis-
malvæ, mercurialis, viola-
riæ. quibus addi potest atri-
plex, & beta, & nonnihil
florum chamæmeli. item &
furfures. hujus decocti su-
menda ℥ 1. deinde ol.
viol. ℥ 2. aut 3. si calor ve-
hemens est: sin minus ol.
chamæmel. vel chamæ-
mel. & violacei simul tan-
tumdem. & diacatholicon,
vel diacassia ℥ 6. vel ℥ 1.
sacchari rubei tantumdem,
exiguo salis addito.

Victus ratio in hoc affe-
ctu humida sit ac liquida,
ne videlicet diutius assum-
pta in ventriculo hæreant:
ut juscula caponum, galli-

3. *Ne fiat attractio ad
locum affectum.*

4. *Ac comprimendo lo-
cum affectum dolorem
augeant.*

E e

5. *Dum materia adhuc influit.*

6. *Quando non amplius influit: tum enim discutientibus, aut maturantibus utendum.*

7. *Quod inde colligemus, si morbus diutius consistit.*

8. *Dum materia peccans adhuc fluit, ut in Principio, & in initio Augmenti.*

narum, cum ptisana decoctorum. quibus initio ⁵ addi potest succus malorum punicorum acidorum, aut cydoneorū, aut succus uvæ immaturæ, aut omphacium, vel similia astringentia: à quibus tamen in progressu ⁶ morbi abstinendum. Potus sit ptisanæ decoctum cum uvis passis & glycyrrhiza, additis etiam ficibus, si videatur ⁷ inflammatio ad suppurationem tendere.

Extrinssecus admovenda sunt cataplasmata ⁸ partim ex astringentibus, partim ex solventibus, ut ex rad. bisfmalvæ decoctis, farina hordei & fœnugræci, absinthio, rosis rubris. florib. chamæmeli ac meliloti in aqua simplici, vel in decoctione radicum decoctis. quibus addendum ol. chamæmelinum, & tantundem rosacei, vel de absinthio: rosaceum quidem, si ad erysipelatis naturam accedat; de absinthio, si minus calida inflammatio.

Quod

Quod si verò ad suppurationē tendat (quod cognosci poterit ex tumore non imminuto, sed molliore facto) tunc cataplasma admovendum, quod nec rosas, nec absinthium, aut horum olea, aut alia astringentia contineat; sed rad. tantummodo bismalvæ, & farinam tritici, sem. lini ac fœnugræci cum ol. chamæmelino, aut simili.

Posteaquam in abscessum conversa cruperit, potioni admiscendū erit mel rosaceum, vel aqua hordei cum melle rosaceo propinenda; vel saltem hydromeli propotione exhibendum.

Est autē inflammatio ventriculi gravis in primis, ac periculosissimus morbus: magnam enim causam esse oportet, quæ in parte non carnosa inflammationē excitare potest. Deinde ventriculus, & præsertim ipsius ostium, pars est valde sensibilis, quæ graves affectiones diu sustinere nequeat.

9. Saltem magna quantitate: nam exiguum quid adstringentium, ob tonum ventriculi, quæ pars satis nobilis est, conservandum immisceri, absurdum non fuerit.

10. Ad ablutionem ulceris.

Prognosis.

E c 2

Lect. 88. Mart. 23.

De Cholera.

1. Alba ferè sunt quæ excernuntur.

Causæ.

2. Ut fungi & similes cibi. pinguedo assa, aut frigida &c.

3. Cholera subitò sæpè moriuntur; neq; tamè ulli morbi minori momento succurritur &c. Hic morbus & acutus est & inter

Curatio.

Intestina, Stomachūq; versatur, sic ut cujus potissimum partis sit, facile dici non possit. Cels. 4. Aquam tepidam Paulus exhiberi vult. Distinguit bene Trallianus, si prava alimenta adhuc in ventriculo sint, ac nausea ac conatus quidā sint. tunc exhibenda.

5. Gratius ægris ut singulis appositis, modo hoc, modo illo utantur.

Cholera immoderata & vehemens est ventriculi perturbatio, cum assiduo vomitu, & continua ferè alvi dejectione.

Causa aliquando sunt corrupti, aut vitiosi cibi assumpti. Sæpenumerò autem pravi humores: veluti biliosi, ventriculum ad dejectiones & per superiorem, & per inferiorem partem irritantes.

Qualiscunq; autem tandem causa fuerit, posteaquam prava & alimenta ventriculo molesta rejecta fuerint, offerenda & adhibenda sunt, quæ ventriculum roborare queant: ut syr. de granatis acidis, de agresta, de cydoneis, de mentha, diaribes. quorum singuli vel seorsim vel inter se permixti, sæpius in exigua quantitate offerendi sunt. Ventriculus verò & totus venter inungendus ol. mastichino, vel cydoneorum addito

lito ol. de mentha, vel de absinthio ; nisi obstet calor. Fetus ex vino austero cum spongia subinde etiam profuit.

Alimentum, veluti sorbitio aliqua, in exigua quantitate, & sæpius per intervalla exhiberi debet: ut lac ex amygdalis dulcibus, vel sorbitio ex aqua & vino cum ovi luteo, vel ³ similis, quæ alvum lubricam non reddat. Iurulenta fugienda sunt, & olera: donec ventriculus robustior factus solidiorem cibum admittere potuerit.

Posteaquam autem cholera repressa vomitus, & alvi dejectio cessaverint: si linguam & palatum albis sordibus gravari contigerit, utile erit pulverem specierum hieræ picræ cum syr. aliquo, veluti de limonibus permixtum exhibere, vel pill. ex hiera picra dare, ut reliquæ sordium ventriculo inhærentes expurgentur.

Os verò aqua hordei, in

6. Non obstat calor ubi ex vitiosis est humoribus: quod plerumque fit.

7. Sanitatis pars est vomitum esse suppressum. Cels. 4. c. 11.

8. Ut conserva rosarum in aqua dissoluta, inde panis intinctus sumendus.

9. Quod vocant die sprourv. non sunt autem ἀφθαι Veterum. in quo valde errant neoterici. nam illæ sunt ulcera maligna cum quibus etiam partes maxillæ cum dentibus exciderunt: cujus remed. aqua in qua viride aris, seu arugo, & alumen solutum. Sordes autem hæ etiam in tertiana, post nimium usum frigidorum, contingunt.

E e 3

10. Aut sequitur mors, qua sit decoctum nonnihil herbæ morsus diaboli, & additum aliquid mellis rofacei, sæpius colluendum. Acutissimus autem affectus cholera est, citò laborantem in vitæ periculum adducens ¹⁰, celerrimam idcirco curationem postulans.

ventriculus. ^{Prognosis.}

Convelluntur autem suræ &c. eo affectu, quem de Cramp vocamus; alij Spasimum flatulentum.

De Diarrhœa.

Lea. 89. Aprilis 9.

1. Libr. 4. c. 12. Sed nescio an non virum cruditum quidem, sed qui animû nunc ad rem rusticam, ac militare, nunc ad Philosophiam, & jus civile divideret, affinitas nominum Cœliaci, & Colici morborum, deceperit; ut de eodem affectu hoc ¹². & 14. cap. bis ageret; sic tamen ut huic cap. quædam ad Cœliacum, quædam ad Colicum morbum pertinentia infereret.

Diarrhœam Græci vocant alvi illud profluvium, per quod liquida defluunt excrementa citra tamē crudorum & non concoctorum ciborū, vel sanguinis alicujus permixtionem. in quibus à lienteria, & dysenteria differt. Paulus hujusmodi affectum, Cœliacum vocat. contra Celso: Cœliacus affectus talis est astrictio, ut nec flatus erumpere, nec excrementa descendere, nec excerni queant.

Contingit autem alvi profluvium, vel universo corpore, vel una aliqua, vel pluribus partibus malè se habentibus.

entibus, à quibus humores ad intestinum transfusi diarrhoeam excitant. quandoque & ventriculus & jejunum intestinum majore affecta sunt, reliquo corpore bene se habente. Ab universo autem corpore alvi profluvium non uno incidit modo: aut enim in febribus, aut in alijs acutis supervenit morbis. in quibus quando fit, si posteaquam bona & concoctionis apparuerint signa, & in die critico contingat, bonum est: nam confert, & morbum solvit. tale etiam leviter fertur, nec stridorem facit, aut tormina infert: neque reprimendum est, nisi superfluat & vires deiciat. quo casu adhibenda erunt remedia, qualia infra dicentur. Accedit verò & quandoque alvi profluvium in morbis acutis, aut febribus diuturnioribus, non apparentibus signis cōcoctionis. quod diuturnitate sua molestum est, & propter corporis fit col-

E c 4

liquationem. excrementa autem in hujusmodi profluvio liquidiora quidem sunt, non tamen omnino aquosa, sed glutinosa & pingua, & ad hæc admodum graveolentia, & frequenter colore flava ac biliosa apparent. Quomodo autem huic sit occurrendum, inter accidentia in febribus, ubi de Syntexi, dictum est.

Fit verò & quandoque alvi profluvium à toto corpore citra febrem, quando humorum in toto corpore est redundantia. quam consuetorum exercitiorum intermissio, & otiosa vita frequenter præcedit, vel consuetæ alicujus vacuationis suppressio, aut ciborum potuumque immodica repletio. Tale autem alvi profluvium si absque torminibus & doloribus fiat, & leviter feratur, confert. nec prius cohibendū est, quam superfluere videatur, vel tormina ac dolores accesserint, ac vires dejiciantur. Interim observanda bona victus

2. Vna die fluere alvum interdum pro valetudine est, atque etiam pluribus dum febris absit, atq; intra septimū diem conquiescat. purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est. Cels.

victus ratio, & abstinendum ab ijs, quæ alvum lubricare, vel irritare queant: ut sunt jura carniū, olera pleraque & fructus: veluti poma, pruna, cerasa⁺. Exhibenda verò initio non ea, quæ valenter astringunt, sed quæ ad ciborum distributionem faciunt: ut vinum album tenue, & ex hoc factæ cum aqua sorbitiones; vel aqua decoctionis sem. anisi addito aliquantulū cinnamomi. Carnes potius sint assæ quam elixæ. Panis absque fufuribus, sed benè fermentatus. Perseverante autem fluxu, & molestiam afferente, præter ea quæ dicta sunt, exhiberi poterunt, quæ magis astringunt ac ventrem retinent: ut conserva rosarum rubrarum antiqua, syr. de rosis aridis, syr. de cydonijs; & in causa calida, syr. de mentha. carnes etiam cydoniorum conditæ ante cibum dandæ.

Vngendus verò ventriculus, tum & ipse venter

3. *Ut sunt spinachia, malva, beta, decoctio brassicæ, &c.*

4. *Potui etiam quantum fieri potest, demendum: exemplo Corvorum, qui quod æstate alvi fluxu laborent, etiam nitidissimis Arethusæ, Danubij, Nili, aut alicujus alterius fontis, aut fluminis aquis, ut bibant irritari se non sinunt; ne morbum augeant; sed quasi Tantalij alij sitim perferunt; non ab Hippocr. Machaone, aut Centauro Chirone, sed à natura sola docti. Theophrast. Simocatus in physicis.*

E c 5

oleo mastichino, rosarum, cydon. myrtino, aut de mentha, vel cum aliquot horum inter se permittis.

Adhiberi verò poterunt & emplastra, tum & facculi, & fomenta, ut in curatione diarrhoeæ provenientis ex mala affectione ventriculi, & jejuni intestini; ut infra dicetur.

A toto autem alvi profluviū etiam accidit phthificis, ac tabescentibus, sed non propter humorum copiam, sed propter virium naturalium imbecillitatem, & retentricis debilitatem. quale alvi profluvium lethale Hippocrates aph. 12. & 14. lib. 5. refert. Sic & quandoque hydropticis alvi profluvium accidit, viribus plane dejectis, & intestinis à copia humorum ita pressis, ut diu retineri nequeant. atque his, non minus quam phthificis, lethale est alvi profluvium.

A jecinore autem fit alvi profluvium: quando in dextro hypochondrio gravitatis

§. Hoc alvi profluvium observavi aliquādo. nullus autem præter Rondeletium ejus meminit, qui omnes mori scribit.

Leßgo. April. 10.

tatis sensus cum tensione
liqua sentitur, & excre-
menta chylosa fuerint, hoc
est, concocta quidem, sed
quida & instar glutinosi
humoris lenta, & subinde
nonnihil flava, à bile per-
mixta, vel etiam varij co-
loris, odore nonnihil gra-
veolentia, non tamen ita
foetida, sicuti quādo febris
adeſt, vel inflammatio je-
coris, aut alterius partis.
descendant autem hæc fre-
quentius per noctem, quam
per diem. Accidit hujus-
modi alvi profluvium pro-
pter jocinoris, aut venarum
meseraicarum obstructio-
nem, & propter ipsius vis-
ceris imbecillitatem.

In curatione autem hu-
jusmodi fluxus, præsertim
initio, abstinendum ab om-
nibus, quæ obstruunt & va-
lidè astringunt. exhibenda
verò, quæ aperiunt, & ad
alimēti distributionem fa-
ciunt. & præter hæc etiam,
quæ jocinori prodesse pos-
sunt, qualia sunt non ve-
hementer astringentia, quæ

6. Quia folliculus fel-
lis plerumque, quando
hepar debile est, & ipse
simul debilitatur.

7. Pro ratione ciborum
assumptorum.

8. Quando calor exter-
nus, atque motus distri-
butionem chyli promo-
vent.

9. Vias enim distribu-
tioni chyli dicatas coar-
ctare non debent, sed
tantum robur partis
nobilis conservare.

aperiētibus admisceri que-
unt. Ad aperiendum uti-
les sunt rad. apij, petroseli-
ni, rufci, fœniculi & grami-
nis. Ex herbis commen-
dantur cuscuta, cichorium,
& si affectus frigidior, vul-
gare hepatorium. Ex se-
minibus, quum affectus fri-
gidior est, sem. anisi, apij,
fœniculi; quum verò affe-
ctus calidior est, sem. ci-
trulli, cucumeris, melo-
num, cucurbitæ. ex quibus
decoctum parari poterit,
agrimonia, radi. plantagi-
nis, & sem. coriandri ad-
ditis: quæ ad jocinoris con-
fortationem faciunt. In de-
cocto illo dissolvi potest
syr. aliquis leniter astrin-
gens & roborans: veluti
syr. ex rosis aridis, aut de
granatis acidis, aut ex suc-
co cydoneorum, vel oxy-
sacchara; quæ ad aperi-
endum, & ad nonnullâ astri-
ctionem conducit. Sic &
syrupi dari possunt, si affe-
ctio calidior, de cichorio
vel de endivia; si frigidior,
syr. de Bizantijs, quibus ali-
quid

quid supradictorum addi
 poterit. Conveniunt & ele-
 ctuaria: ut diatrion santalon
 & diarhodon Abbatis : &
 in morbo frigidiore aro-
 maticum rosatū, vel etiam
 iagalanga. ex quorū spe-
 ciebus, additis corticibus
 myrobalanorum, præser-
 tim citrinarum, & cinna-
 momo, cum vino albo cla-
 ratum factum, utile.

Conducit verò & the-
 iaca * quandoq; cum vi-
 no albo à jejuno sumpta.
 Profunt & brachiorum,
 crurum ac dorfi satis fortes
 frictiones, & mediocre
 corporis exercitium, si vi-
 res admittant. Perseveran-
 te diutius fluxu, vitiosos hu-
 mores etiā expurgare con-
 venit. ad quod maximè
 conducit rhabarbarū, ma-
 ximè tostum, cujus plus mi-
 nus ʒ i. cum vino albo ex-
 hibenda.

Localia etiam remedia
 in hoc fluxu non sunt præ-
 termittenda. ungendum est
 dextrum hypochondrion
 * oleo mastichino, myrti-

10. *Quod motum ad
 centrum, seu primam
 corporis regionem, con-
 trarium motum versus
 peripheriam inducen-
 do, si stat.*

* *Vt tonus, seu robur
 hepatis addatur. cujus
 virium rationem, utpote
 nobilissimæ partis, Me-
 dicum semper habere
 convenit.*

no, vel de absinthio ; & calor adsit, addito rosaceo quibus addi potest ceratum fantalinum, aut unguentum comitissæ.

Potest verò adhiberi fomentum ex decocto rosarum rubrarum, absinthij agrimonix, seminis anisi coriandri, & myrti in aqua & vino decoctis.

Victus ratio non dissimilis esse debet ab ea, quæ in profluvio ex humorum in toto corpore redundantia convenire suprà dicta est.

Alvi profluvium malè affecto liene.

Lea. 91. April. 12.

A liene autem si diarrhæa fiat, adest vel tumor vel durities, vel gravitatis sensus aliquis in sinistro hypochondrio. excrementa etiam quandoq; nigricant. Talis fluxus, si fiat initio quartanarum, non est statim reprimendus: etiam si cruenta admisceantur. terminantur siquidem per huiusmodi fluxum quartanæ. & Hipp. dysenteriam lieno-

lienosis supervenire bonum esse ait 48. aph. 6. quod si tamen diuturnior talis fuerit fluxus, ei occurrendum: nam & lienosis longa difficultas intestinorum, vel hydropem, vel lenteriam & mortis periculum, affert 43. aph. 6. Sic & fluxus ventris, qui in fine quartanarum supervenit, non statim est reprimendus: nam majori periculo liberat. si tamē diuturnior fuerit, ei crit resistendum; non tamē cum astringentibus: sed per excalfactientia, & concoctionem promoventia. dandum el. diagalanga, diatrionpipe-reon aut simile. Venter un-gendus oleo de mentha, & de absinthio. Possunt & fomenta adhiberi ex floribus chamæmeli, rosis rubris, origano, pulegio in facculo confutis; vel ex milio, vel etiam malto torrefacto.

Victus ratio sicca esse debet. vinum laudatur generosissimum, ac potens; non tamen rubrum.

11. Quibus longo tempore lien obduruit.

12. Ratione translationis, & evacuationis materiæ, quæ lieni infarcta erat.

13. Lenteriam, debilitatis diuturno pravorum humorum transitu Intestinis; Hydropem hepate, liene, & toto venoso genere consentiente.

Quod si absque febre, neque post quartanam febre, diarrhœa superveniat, excrementaq; nigra fuerint: citò remedium adhibendum, priusquam in dysenteriam transeat.

Observanda bona victus ratio, qualis supra dicta. Absinthij usus quovis convenit modo. Vtiles sunt cum cibo assumpti cappares. empl. ex ammoniaco commodè lienis regioni admovetur. vel ex ol. capparorum & de absinthio unguentum. Exhibenda quæ astringunt, etiam initio, calidis tamē permixtis: ut est diacydonion cū speciebus; vel quale à Gal. in fine lib. 6. de sanit. tuend. describitur. Sic & conserva rosarum rubrarum, & trochisci de spodio conveniunt, additis speciebus diagalangæ, & diatrionpipeleon; aut diatriōpipereon, & syr. de mentha. quibus si addatur sem. nasturtij¹⁴ modicè torrefacti med. fiet utilius. Fomenta verò

14. *Ut etiam cochlearia & quæcunque nasturtio similia sapore.*

erò & paulò antè dicta in
hoc casu etiam cōveniunt.

Ex capite autē destillan-
tes humores si causa diar-
rhœæ fuerint, adest do-
lor vel gravitas capitis, &
excremēta spumosa sunt, ut
Hipp. 30. aph. 7. ait. Cōtin-
git autē hujuscemodi diar-
rhœam citius fieri sub au-
trina & pluviosa cæli con-
stitutione, quam sub alia, ut
aph. 16. lib. 3. Capiuntur
maximè hoc fluxu balbi, ut
aph. 32. lib. 6. Victus autem
ratio in hac fluxus specie
sicca esse debet, & cœnæ
tempore admodum parca.

à vino abstinendum; tum
& à crassa, & potentiore
cerevisia. Potus sit tenuis
cerevisia, vel decoctum pti-
fanæ cum cinnamomo; vel
decoctum sem. anisi; vel
decoctum cinnamomi; vel
similis aliqua potio.

Capiti admovenda etiam
localia: qualia in curatione
destillationis dicta sunt.
profunt & apophlegmatif-
mi, seu masticatoria: ex cu-
bebis, mastiche, aut ex py-

Ex Catarrho
diathosa.

15. Quia vaporibus ce-
rebrum copiosiorib. re-
plent; qui ejus frigore
densati in catarrhos
vertuntur.

FF

16. *Tale quod astringentem post se relinquat.*

17. *Faciunt enim ad corroboracionem. & resiccacionem cerebri. ut etiam cardamomum & cubebæ, quæ singularia.*

18. *Non utendum nil-
tis med. nisi quis aliquid
conservæ rosacæ, vel
viol. dare velit.*

Lect. 92. April. 16.

retri, vel pimpinellæ saxi
fragæ radice. Perseveran-
te fluxu etiã purgans med-
dandum ¹⁶: ut sunt pill. ex
mastiche dictæ. quæ com-
ponuntur ex agarico, ma-
stiche & aloë. vel pill. affa-
jereth Avicennæ. quæ ma-
stichen & myrobalanos
recipiunt. quibus si nonni-
hil addatur rhabarbari to-
sti, præstantiores erunt.

Post purgationem mi-
thridatium ¹⁷, vel theriace
dari potest, vel ex his con-
ditum additis cubebis, car-
damomo, speciebus pleris
archontici cum syr. de stœ-
chade.

Huc pertinet & fluor ille
ventris, qui pueris quum
dentinunt supervenit. qui
bona victus ratione non
difficulter curatur ¹⁸, &
inunctione ventris cum ol.
mastichino si perseveret.

Ventriculum autē & jeju-
num intestinum, quum alvus
fluida est, malè affici exi-
stimandum est; quando nec
plenitudinis, neq; universi
corporis, aut alicujus partis
laboran-

orantis signa adsunt. ali-
 menta tunc satis concocta
 apparent, sed humidæ, li-
 quidæ & aquosæ sunt deje-
 ctiones. adest verò & quan-
 doque nausea; præsertim
 ventriculo malè habente.
 In hoc fluxu ventriculus
 quandoque nonnulla imbe-
 cillitate laborat, sed præci-
 pue ora venarum meserai-
 carum ad intestinum jeju-
 num pertinentia obstructa,
 impedimento sunt, quo mi-
 nus alimentum distribui
 queat. Afficiuntur autem
 hæ partes non rarò propter
 frigidorū, præsertim astrin-
 gentium, usum: ut sunt fru-
 ctus immaturi, vel alij
 astringentes, ut sorba, me-
 spila, corna, vaccinia, & vi-
 num rubrum austerum im-
 maturum. quandoque &
 fructus nullam astrictio-
 nem habentes, sed frigidi
 alvum perturbant: ut sunt
 persica, pruna, uvæ, melo-
 pepones, cucumeres: &
 tunc quidē præcipue, quan-
 do in ventriculo corrup-
 puntur. Provocant & alvi

19. Sic usu uvæ crispæ
 multos in diarrhæam
 incidisse novi.

FF 2

20. In omni fluore ven-
eris necessarium est, non
quoties libet desiderare,
sed quoties necessum est;
ut hac ipsa mora in
consuetudinem ferendi
oneris intestina dedu-
cat. Cels. l. 4. c. 16.

profluvium cibi acres, sal-
aut alioqui corrupti, v
corruptioni obnoxij: i
sunt pisces, & lac quandoq
post alium cibū sumptum
ab his abstinere oportet
eum, qui profluvio ventri-
laborat: aut alioqui facile
illo corripuntur, cujusmo-
di sunt quibus ventriculus
natura debilis est. Victus
autē ratio in hoc alvi pro-
fluvio talis esse debet, qua-
lis in profluvio à corporis
repletionem; non astringens
videlicet, sed aperiēs & ad
alimēti distributionem fa-
ciens 20. Si verò cibi pravi,
aut corrupti causam dede-
rint; rhabarb. tostum utili-
ter exhibetur modo, quo
supra dictum est. Prodest
verò & exercitium corpo-
ris, & fœmorum, & dorsi
frictiones. Perseverante
verò hoc profluvio, tandem
& astringētia danda erunt;
veluti primo loco dicta
sunt. & ventriculus ungen-
dus ol. mastich. cydon.
myrtino, vel etiam de men-
tha. Fomentum ex milio
vel

el malto, vel ex herbis &
oribus, ut antè dictum est,
etiam conveniunt.

Possunt verò & in isto
profluvio diuturno enema-
ta injici astringendi vim
habentia : ut ex hordei
mundati, rosarum rubra-
rum, fol. thapsi barbati, fol.
sumach. cortic. granato-
rum, calicum glandium, aut
similium decocto. cui adji-
ciendū vel mel rosaceum,
vel abstersione opus sit, vel
syr. de rosis aridis, vel myr-
tinus, vel ex succo cydo-
neorum, (nullo addito ol.
aut pingui.) & si adsit do-
lor, etiam unum aut duo
ovi lutea.

In alvi autem profluvij
excrementorum mutatio-
nes juvant; ut Hipp. ait 14.
aph. 2. veluti si prius flava
ac biliosa excernantur, de-
in pituitosa: significat enim
hujusmodi mutatio corpus
à varijs humoribus expur-
gari. sed si viridia, nigra, aut
livida, & pingua, atq; gra-
veolentia fiant excremēta;
mutatio mala: vel enim na-

21. ℞. Hordei mundati
℥ β. fol. thapsi barbati.
M. 1. rosar. rubrar. fol.
sumach. ana M. β. cor-
tic. granatorum, aut ca-
licum glandium ℥ 2.
sem. coriandri, sem. anisi
ana ℥ 1. f. decoctio in
cujus ℞. dissolve mellis
rosacei ℥ 1. β. vel syr.
myrtini & de rosis ari-
dis ana ℥ 1. f. enema.

Prognosis.

F f 3

turalis caloris defectū, v
 maximam putredinem, v
 corporis colliquationem
 ostendit. Vomitus autem
 spontaneus in lōga, ac diu
 turna diarhœa superveniē
 bonus est. ut Hipp. 15. aph.
 lib. 6. prodest siquidem vo-
 mitus ratione revulsionis.
 & tunc quidē, quando hu-
 mor aliūde in ventriculum
 influit, veluti quando ex ca-
 pite. sed tamen idcirco non
 est vomitus provocandus,
 nisi in longis alvi profluvijs,
 & quidem viribus constan-
 tibus, & his qui vomitioni
 assueverunt, ut diligenter
 Hollerius annotavit.

De Lienteria.

Diarhœæ diuturniori Li-
 enteria .i. intestinorum
 levitas succedit¹. quandoq;
 verò & dysenteria², ut Pau-
 lus tradit. Est autē lienteria
 velox assumptorū ciborum,
 ac potuum per alvū descen-
 sus, eorundemq; crudorum
 & nondum concoctorum.
 idq; præcipuè propter im-
 becillitatē retentricis ven-
 tri-

Lect. 93. April. 17.

1. Nonnunquam enim
 per se supervenit quum
 facultatis tanta imbe-
 cillitas non sit initio.

2. Vt quum ob cicatrices
 lævia sunt intestina.
 quam Galenus sentētiam
 rejicit; quum semper læ-
 via sint intestina, & ta-
 men cibum retineant.

3. Hæc causa proprijs-
 sime dictam, atq; ab alijs
 morbis distinctam Lien-
 teriam facit, intensissi-
 ma accedente crudita-
 re. nam à Cæliace, cui
 maxime complicari il-

iculi, & superiorū intesti-
 orum. ad quam & conco-
 tricis debilitas accedit. in-
 erdum etiam + expultricis
 motus depravatus. atque in
 hoc à diarrhœa differt. nam
 in diarrhœa excrementa
 quidē liquida descendunt,
 sed concocta. in lienteria
 & liquida, sed vel parā,
 vel omnino nihil mutata.
 sic ut assumpti alimenti ge-
 nus manifestē agnoscatur,
 vel omnino tale, quale as-
 sumptum est, dejiciatur.

Curatio non dissimilis
 curationi inveteratæ diar-
 rhœæ, quæ vel à toto cor-
 pore, vel ventriculi & inte-
 stinorum vitio nata est.

Astringentia s. assumen-
 da sunt, & foris admoven-
 da calfacientibus permix-
 tis. Abstinendum ab ole-
 ribus & fructibus, quæ al-

lam Paulus existimavit,
 distinguitur; quod cibi
 in ventriculosa affectio-
 ne liquidi, crudi ta-
 men; in lienteria ne-
 que in consistentia, ne-
 que in colore, odore, aut
 ulla alia qualitate mu-
 tati, sed quales adsumpti
 sunt, veluti per cana-
 lem (unde vulgus σολῆ-
 νά vocat. Steph.) deji-
 ciantur. Potest autē hæc
 debilitas post Ileum,
 hydropis per alvum so-
 lutionē, diuturnas Dia-
 rhœas, aut Dysenterias
 relinqui. A Rheumatif-
 mo autem ac Diarrhœa
 secernitur; quod nulli
 humores cum cibis non
 concoctis descendant.
 A Dysenterijs tum per
 jam dicta; tum quod
 Tormina nulla conjun-
 gantur.

4. Ut quum cibi non concocti pondere; vel ubi superficia-
 ria excoariatio est acrimonia quasi Expultricem irritant.
 sed illud ad Celiacem; hoc ad Dysenteriam potius refe-
 rendum. Occludi cicatrice Meseraicas, & agrum vivere
 posse, imaginariū est. 5. Ad retentricē corroborandam,
 Calida verò ad roborandam concoctricem adduntur.

F f 4

6. Robur & tonus nervorum & fibrarum in mediocri siccitate consistit.
7. Aut albis; non nigris. Ante alios autem cibos hæc dentur.
8. Ut serosæ partes abstergētes absumi queāt. Albi autē, propter mundiciem fortè, præferuntur.
9. Ut possit concoctio promoveri.
10. Moderatè tinctum. Potus verò parcissimus esse debet. Sic Corvi, quod æstate ventris fluxu laborare consueverint, fontium, fluviorum, aut stagnorum aquas illo tempore haudquam attingunt; nec Arethusæ splēdidis, Istri frigidissimis, aut Nili latè stagnantibus lymphis, ut malum suum bibendo majus faciant, impelli se sinunt: non quod ab Hippocr. Machaone, vel Chirone Dieteticen didicerint, aut ratione utantur, sed à Natura docti, ductique. Theophil. Simocat, in Physicis.
- vum⁶. humectant. brassica bis cocta, si cōcoqui queat, non improbatur. Fructus astringentes utiles sunt: ut mala cydonia quovis appa- rata modo, pira cocta, castaneæ, amygdala dulcia, ex mespilis, sorbis, ribesijs⁷ rubentibus, cornis cum saccharo bellaria confe- cta. Cibus siccior: ut ex carnibus vitulorū, aut pul- lis assis utilior est, quam li- quidior. si tamen laborans assumere recuset; dandæ erūt sorbitiones: ut ex vino & aqua: vel lac amygdala- rum dulcium: vel lac vac- cinum, in quo ferrum can- dens, aut calculi⁸ igniti ex- tincti sint: aut ex lacte puls cum oryza, milio, vel pani- co cocta. Ova recentia etiam conveniunt. Potus sit vinum generosum⁹ ac potens, vel rubrum¹⁰, ver- miculum si maturū sit, quod dilui potuerit aqua deco-

etio-

ctionis sem. coriandri, vel
cinnamomi, vel etiam ma-
stiches.

Ex medicamentosis, uti-
le diacydonion cum specie-
bus, tum & alia in curatio-
ne diuturnioris diarrhœæ
dicta. Vngendus verò
& ventriculus ol. aliquo
astringente: ut ol. mastichi-
no, vel de cydoneis, vel de
mentha, vel myrtino, vel
de absinthio, aut aliquot
horum permixtis, addita
cera & pulveribus garyo-
phyllorū, cyperi, galangæ,
mastiches, & similia. vel
empl. ventriculo imponen-
dum, quale est ceratum sto-
machale: præsertim si loco
ol. rosacei, quod compo-
sitio apud Cordum habet,
sumatur ol. mastichinum,
aut de mentha. Vel potest
componi empl. isto præ-
stantius, ex ladano, cera, &
oleo mastichino, de men-
tha, & de absinthio, cum
garyophyllis, galanga, thu-
re, mastiche, rosis rubris, &
lauri baccis, in pulvere tri-
tis. Vel hujus loco appli-

II. Quod ut frigidum,
concoctricis defectum
augere posset. Ideoque
nec lotio ol. & ceræ per
aquam rosaceam, præ-
sertim sæpius repetita,
hic requiritur: & pro
rosis non malè, vel sal-
via, vel mentha substi-
tueretur.

F f 5

12. *Vel ipsius Gal. 8. secundum loca, & 8. Methodi descriptum.*

Prognosis.

13. *Quum causam habeat intemperiem factam, seu hecticam & quidem intensissimam. Atque egros interdum trahit, interdum precipitat.*

14. *Quando calidū naturum debile est; ut hyemis condensante frigore restinguatur potius quam excitetur.*

Lecl. 94. April. 19.

Dysenteriae
differentiae.

1. *Vide Gal. 4. de artic. comm. 38. & 39.*

I. Hepaticus Huxus,

cari potest, quod apud Nicolaum titulo cœrati Gal. extat ¹².

Difficilis autem morbus lienteria est ¹³, præsertim si autumno ¹⁴ incipiens in hyemē pertrahatur, ut Aëtius ait. Consequitur hunc atrophia, seu universi corporis extenuatio. In longis autem lienterijs, si ructus acidus, qui prius non fuit, superveniat, signum esse bonum Hipp. refert aph. 1. lib. 6. significat enim, ut Gal. ait, cibum aliquandiu in ventriculo retineri, mutationisque principium accipere.

De Dysenteria.

Dysenteriae nomen aliquando generaliter sumitur: pro quavis sanguinis per alvum & intestina excretionem. aliquando vero magis propriè, pro illa tantūmodo affectione, per quam sanguis cum torminibus, ramentis quibusdam & excrementis permixtus rejicitur. Ad generaliore appellationem

appellationem pertinet ille alvi fluor, per quem tenuis sanguis loturæ recēter matatarum carniū: similis excernitur: deinde aucto malo, ut Gal. 6. de loc. aff. ait, crassus humor fecibus vini, rubri videlicet, aut limo sanguinis, haud absimilis. Fit autem hic fluor propter retentricis, sed potissimum alteratricis jecinoris facultatum imbecillitatem, & frequentissimè citra inflammationē: quandoque verò & inflammatione accedente. hunc fluxum hepaticum, & jecoriam dysenteriam Paulus vocat.

Huc verò facit & ille sanguinis per alvum fluxus, quando natura gravata sese exonerat: veluti his contingit, quibus præcisa magna aliqua corporis est pars, veluti crus ablatum, aut brachium. Vel qui priori tempore laboribus ac validis exercitijs assueti derepēte hæc deseruerunt, non imminuta interim ali-

2. *Quamdiu propter atoniam semicoctus, seu crudus solummodo.*

3. *Quando succedente putredine, atque ex illa, calore humor qui effluit tostus, seu superassatus est, ac in melancoliam mutatus.*

2. *Dysent. cruenta.*

4. *Ideoque valentis, non debilis facultatis ut fluxus hepaticus, indicium est.*

5. *Etiam in Recto, longè tamen supra Anum: quo solo ab Hæmorrhoidibus differt. Gal.*

6. *Ex Gal. 5. de locis affectis circa finem.*

3. *Cum Vomitione atrocum etc.*

7. *Fit hoc aliquando per multos menses, vel annum etiam à percussione. oportet autem illum sanguinem in 4. A Casu, venis loci cõ- 1. A etc. tusi hæsisse, alioqui pueruisset.*

mentorū quantitate, qua uti solebant. tunc enim sanguis, qui per validas exercitationes ac labores digeri solet, vel qui prius ad partem præcisam deferebatur celeriter, in venis colligitur, & copia nimium adaugetur. auctus autem supra modum sanguis, sæpius per nares, vel per hæmorrhoides, aut mulieribus per menses, aliquando verò & per ora venarum in intestinis, aperta excernitur, ut Gal. comment. 4. in lib. Hipp. de articul. vidisse se refert. Hujusmodi autem sanguinis fluorem, cruentam dysenteriam Paulus nominat. Exonerat verò se & quandoque hepar, sed frequentius lien à sanguine crasso, qui plurima parte vomitione rejicitur: partim verò etiam per intestina descendit. de quo supra ubi de sanguinis vomitu.

Contingit & quandoque sanguinem per intestina expurgari ab his, qui aliquando vel ex alto ceciderunt,

derunt, vel circa hypochondria, vel lumbos gravem aliquem ictum sustinuerunt. & talis quidem sanguis quandoque nigricans est, interdum verò & graveolens existit.

Per hujuscemodi autem excretiones, & multa excrementa, & affatim excerni solent*, ut Gal. testatur.

At in dysenteria propriè, dicta non copiosè, sed paulatim, & per brevina intervalla dejectiones fiunt. nec purus sanguis statim initio, sed in morbi progressu excernitur. initio enim quidam mordaces, & acres humores cum liquidioribus excrementis descendunt. mucosa deinde quædam ab intestinis abrasa, & subinde adiposa, ac pinguis succedunt. postea sanguinis nonnihil admiscetur: & tunc propriè dysenteria dicitur. quum videlicet non solum abrasa sunt intestina, sed & læsa, ac exulcerata ¹⁰ eorum substantia apparet. Adsunt

8. Præsertim in 2. & 3.

5. Propriè *species.*

dicta, quæ
rursum va-
ria pro.

9. Nomen hoc
locum affe-

ctum, & Symptoma,
Dolorem nempe, simul
definit. unde Fluxui, qui
cum Torminibus, so-
lummodo propriè tribui
potest.

10. Aded ut interior
tunica, soluta connexio-
ne, secundum longitudi-
nem abscedat, egredia-
turq; Aret. lib. 4. cap. 9.
Exulceratio autem in
Dysenteria duplex; aut
enim *nuda* Intestinorum
exulceratio est; aut cum
putrefactione, quæ No-
men Medici appellant.
Gal. 9. sec. loca.

Causarum,

* *Vel Lap. lazuli, & illorum quæ ex metallicis conficiuntur.*

11. Sic *Ranunculus flammula* Dysent. facit. *Arboris cujusdam in India fructus quamvis dulcis, esum Alexander Magnus, quod dysenteriam faceret, prohibuit. Theophrast. 4. histor. plant. c. 5.*

tunc dolores, & tormina ventris & intestinorum. accedit subinde & sitis, & febricula quædam. interdum verò & affectio eousq; intenditur, ut & membranosæ quædam intestinorum particulae simul expurgentur, quæ subinde tam magnæ, ut carunculæ quædam videantur & dicantur. Humores autē acres & mordaces, dysenteriae effectrices causæ frequentissimæ, biliosi sunt: subinde pituitosi, falsi ac corrupti: rarò melancholici ex adustione nati. qui ab ipsorum excrementorū colore cognosci, ac discerni possunt. Quandoque verò & vehementissimorum medicamentorum immodicus usus dysenteriae causa est, ut scammonij, vel colocynthidis*, vel aliorum venenosorum¹¹. Dysenteriae autem à biliosis humoribus promptissimè accidunt, quando aëris constitutio calida ac diutinè sicca permanet. nam ut Hipp. 16. aph. 2. in sicci-

siccitatibus dysenteria fiūt. 12. *Exercitus Frācorum*
 sic & per aëris constitutio- *pars tertia ex carniū*
 nem humidam, præsertim *bovillar. & aq. Padanæ*
 pestilētem, dysenteria fiunt *nimia ingestione dysē-*
 ex ¹³ humore pituitoso cor- *teria facta, interiit. Pro-*
 rupto ¹³. *co. de bello Gothor. l. 2.*

Lect. 95. 13. *Tachus*

April. 20. *quum fruga-*

Intestino- *lē Ægyptio-*

rum affe- *rum vivendi*

ctorū va- *rationē Per-*

rietate. *sarum delicijs permu-*

tasset, Dysenteria inte-

riit; delitijs mortem si-

bi lucratus. Ælian. l. 5.

var. histor.

14. *Particulæ nimirum*

seu grumi. nā supernatae

quandoq; pingue quid-

dā, ut in colliquatione.

* *Amphiretus à piratis,*

ut magnum ab ipso li-

trum extorquerent, in

Lemno detinebatur. at

ille à cibo abstinens ru-

bricam marinæ permistam aquæ bibebat. itaque cum san-

guinis fluxu laborare illum crederent, ne moreretur, vin-

culis illum liberarunt: atque ita clanculum elapsus Acan-

thum fuga devenit. Polybius l. 6. stratagem. Hic fluxus

sanguineum mentiens ad Medecinam quidem propriè non

pertinet. est tamen ubi technas hasce nosse, & Magistra-

tus de ijs monere, necessum est.

Afficiuntur autem in dy-
 senteria propriè dicta quā-
 doque crassa ac inferiora
 intestina, alias tenuia & su-
 periora. inferiora potissi-
 mum laborare atque exul-
 cerari, adiposa ac pingua
 simul cum excrementis ex-
 purgata ostendunt: sic &
 sanguis ipsis non exquisitè
 permixtus. tum & dolores
 circa inferiorem ventrem.
 Superiora verò magis affi-
 ci existimandum, quando
 nulla pingua exeunt ¹⁴, &
 sanguis excrementis per-
 miscetur, & dolor circa
 umbilicum magis existit *.

bricam marinæ permistam aquæ bibebat. itaque cum san-
guinis fluxu laborare illum crederent, ne moreretur, vin-
culis illum liberarunt: atque ita clanculum elapsus Acan-
thum fuga devenit. Polybius l. 6. stratagem. Hic fluxus
sanguineum mentiens ad Medecinam quidem propriè non
pertinet. est tamen ubi technas hasce nosse, & Magistra-
tus de ijs monere, necessum est.

Curatio. Fluxus hepaticus, jeco-

1 raria quæ dysenteria vocatur, quomodo sit curandus, dicetur ubi de imbecillitate jecinoris.

2 At cruenta dysenteria initio sanguinis missionem

15. Quum enim ex sanguinis naturam onerante copia proveniat, sine illius imminutione, frustra omnia, quæ sanguinis fluxum sistunt, adhiberentur, aut exhiberentur.

15 requirit. quæ ex communi brachij vena facta, ac etiam repetita, si repletio corporis magna fuerit, si non cesset, & superfluere videatur; adhibenda erunt remedia, quæ adversus sanguinis immodica profluvia commendantur: ut sunt rosæ rubræ, balauſtia, berberis fructus, semen myrti, sem. acetosæ, acacia, hypocistis, sanguis draconis, gummi arabicum, gummi tragacanthæ, rad. tormentillæ, bistortæ, pimpinellæ sanguisorbæ, mastix, thus, bolus armenus, terra lëmnia, lapis hæmathites, corallium, succinum, cornu cervi uſtum, ebur uſtum

16. Nam Spodium Græcorum metallicum est; quod foris admoveri, non intus dari, debet.

quo pro spodio 16 Officinæ utuntur. Ex his possunt variæ med. formæ componi. ex nonnullis possunt fieri pul-

pulveres qui cum astringentium herbarū decocto aut aquis destillatis exhiberi queant, veluti plantaginis, polygoni, pyrolæ, equiseti, bursæ pastoris, & similium. Si verò & pulveribus addatur conf. rosarum rubr. vel syr. de rosis aridis, vel myrtinus fiet utilis mixtura live conditum.

Ad eundem modum licebit uti troch. de carabe¹², & de berberis, & de spodio nuncupatis. Sic & aquæ destillatæ supra memoratarum herbarum commendantur, præsertim addito aliquo dictorū syruporum. Magis tamen prosunt earundem decocta¹³ additis supradictis rad. vel aliquibus illarum. quibus si accesserint consolidæ majoris rad. decoctum erit præstantius. licet enim astringentem non habeant manifestam, tamē ad omnem sanguinis fluorem reprimendum lentore suo conducunt. Conducit & fructuum astringentium usus,

17. *Vt liquorib. hisce veluti vehiculis pulverum vires ad loca affecta deducantur.*

18. *Troch. de Charabe, & de Spodio, ijs qui de Berberis dicuntur magis adstringunt; de Carabe propter papav. nigrum, & opium, etiam leviter narcotici sua vi dolores minuunt: de Berber. verò calidiores, & cordis dejectas vires magis refocillantes existunt propter spicam, & Galiam muschatam, quæ recipiunt.*

19. *Quia adstringentes partes, quod terrestres sint, in destillationibus vix adscendunt.*

G g

20. *Qua vino permixta, quidam à fluore sanguinis curati fuere. Sub ferri verò nomine etiam chalybs intelligendus. Itaque & aquæ per ferri fodinas labentes, quales Spadanæ creduntur esse, cum fructu ægrorum exhiberi possent.*

21. *Quod calore & tenuitate sua fluxiles humores faciat.*

atque ex ipsis paratorum syruporum, conditorum &c. de quibus in curatione Dienteriæ dictum est. Prodest verò & aqua in qua ferrum ʒ candens sæpius extinctum: quam sorbitionibus & potionibus admisceri in omni sanguinis per alvum fluore, utile habetur.

Victus autem rationem oportet esse solito tenuiorem, ne sanguinis copia iterum augeatur. à vino abstinendum, & in quiete tantisper manendum donec fluxus sanguinis cessarit. quo cessante si suspicio sit aliquem in intestinis concretum sanguinem hære, leviter abstergente enemate alvus diluenda: veluti ex hordei non purgati, vel furfurum ℥ 1. vel juris carnis ovillæ tantundem; additis ol. amygd. dul. vel chamæmelini ℥ 2. & tantundem mellis rosacei, sacchari rubri ℥ 1. diacathol. ℥ β. aut ℥ 6. & salis nonnihil. Vel si laborans recipere recusset enema; dandum rhab-

bar-

barbari infusum cum syr.
ex infusione rosarum, vel
diacatholicon, vel simile
leve medicamentum.

22. Quæ sine acrimonia,
aut vellicatione id quod
in Intestinis continetur,
educunt, & levem post
se adstrictionem relin-
quere solent.

23. Ne sanguinis impe-
tus ad loca casu, vel
percussione læsa, fiat.

24. Foris, quæ phleg-
monem repellendo inhi-
beant, & dolorem se-
dent. Intus quæ sangui-
nis fervorem minuant,
ne ex venis effluat pro-
hibeant, atque oscula
venarum firment: quæ-
que, si forte quid jam
è venis exciderit, ne in
grumos concreascit im-
pediant; aut si jam gru-
mosus factus sit inciden-
do &c. dissolvant.

25. Vires enim non ul-
tra jam constant; nec
sanguinem istum retra-
here in venas, aut possi-
bile, aut utile est.

Gg 2

26. Vbi corruptus sanguis jam eductus fuerit.

27. Dum vires adhuc sinunt. verum paucus, detrahendus. Et hoc bene successisse R. Dodon. testari solebat. Laudat & Aëtius ubi vehemens sanguinis impetus, inflammatio magna, & corpus sanguine plenum, ut ijs, quib. consuevit evacuationes sup-

presse sunt &c. Leet. 96.
April. 24.

inflammationem namque & innatum calorem refrigerat; succeditq; somnus, optimum Dysentericis remedium. Archius apud Aët. Alijs partib. exulceratis venam secamus: quidni & intestinis? faciunt id & Turcæ. Prosper Alpin. Vide Botallum, Trallian. Althom. Ammatum. Massar. &c.

28. Vires enim jam prædebilitatas esse necesse est.

tempore simul coquent quædam astringentia: ut r. s. aridæ, vel fructus berberis, vel myrti semen, v. oxalis herba, aut plantago, aut pyrola, vel alia simili aut addi omphacium, v. succus malorum puniceorum, vel cydoneorum. Excedente verò & eodem fluore, & sanguine florido profluente; facienda & adhibenda erunt omnia, quæ in dysenteria cruenta mondicta.

In dysenteria autem propriè dicta siquidem à bile facta sit, & ab initio invaserit, & febris adsit, viresq; constent; sanguinem²⁷ detrahare mox primis diebus etiam convenit. Sed si alteri morbo successerit²⁸ à sanguinis missione abstinendum; præsertim si is antea detractus fuerit. Sic etiam si ab atra bile, vel à falsa pituita originem habuerit; sanguinis quoq; detractioni parcendum erit.

Initiò verò & purgans aliquod exhibendum, à bilioso

ioso nempe humore, acri-
 ac mordaci dysenteria ori-
 ginem habente. quod tale
 esse debet ut astrictionem
 post se relinquat, quale est
 habarbarum, & præcipuè
 nonnihil tostum²⁹. torreri
 autem non eousque debet
 ut aliqua ejus pars adura-
 tur, sed ad ignem tantum-
 modo tantisper resiccand-
 um ut friabile reddatur,
 & facile in pulverem atteri
 queat.

Vtendum deinde astrin-
 gentibus & fluxum repri-
 mentibus³⁰, ut in dysente-
 ria cruenta. quibus tamen
 misceri refert lentam ha-
 bentia substantiam, qua &
 acrimonia humorum ob-
 undi, & intestina obliniri
 queant. exempli gratia.
 acc. cons. rosarum rubr. &
 carnes jujubarum, & car-
 nes cydoneorum, aut po-
 tius gelatina eorundem. ijs-
 que admisceantur troch.
 de spodio. aut de berberis
 vel utrique, & alia astrin-
 gentia. ex quibus cum syr.
 myrtino, vel de rosis aridis

29. Potius resiccari de-
 bet, ut aliquid purga-
 tricis facultatis pereat.
 Rondeletius torreri ve-
 rat. intelligit autem, no
 aduratur. Massaria nun-
 quam, & nusquam med.
 danda putat, quæ quo-
 modocunque possint al-
 vum ducere.

30. Quod faciunt, va-
 sa per quæ mittuntur
 humores ad Intestina
 coarctando; & Partem
 ad quam feruntur, Inte-
 stina nempe, corrobo-
 rando.

fiat conditum. Sic & pulvis trochif. vel aliorum astringentium exhiberi potest cum syr. de jujubis, aut cum decocto rad. althææ, aut sem. malvæ. Possunt & decoqui rad. tormentillæ, bistortæ, & alia astringentia. additis rad. althææ, vel consolidæ majoris cū aqua simpl. aut quod melius, cum aqua in qua ferrum candens sæpius extinctum. atque hujuscemodi decoctum condiri potest cinnamomo, & addita glychyrida, vel uvis passis dulcius reddi, ut palato sit gratius.

Enemata.

31. *Quia enemata inferioriorem Coli partem; aut saltem Colum rarissimè transcendunt.*

Exhibenda verò non modo talia sunt, sed enemata injicienda ex hujuscemodi med. composita; quorum præcipuè usus requiritur quando magna & inferiora intestina exulcerata sunt. quum enim assumpta eo pervenire nequeant nisi multū permutata, per enemata ipsis magis venit succurrendum, quam per assumpta; quæ tamen negligi non debent. Tenuibus intestinis

testinis quæ assumuntur plus profunt: minus utilitatis enemata conferunt. Gal. 6. de loc. aff. Enemata autem initio refert esse abstergentia³², ut ex decocto hordei non purgati addito melle refac. & nonnihil sacchari rubri, & uno aut altero ovi luteo, ad doloris lenitionem. Post huiusmodi enemata, injicienda alia astringendi vim habentia ac simul intestina oblinentia, & dolores³³ lenientia: qualia componuntur ex ptisanæ³⁴, tapsi barbati, plantag. rosarum rubrarum, balaustiorum, calicum glandium, sem. myrti, & similium decocto; addito sem. cydoneorum, aut sem. malvæ, lentorem ipsis communicante. deinde & sem.³⁵ lini urgente dolore: nam & ad dolores mitigandos istud plurimum, teste Aëtio, confert. adduntur ovi lutea, eadem de causa. ad huiusmodi decocti ¶ 1. adduntur syr. myrtini, vel de rosis aridis,

32. Ne acres & corrupti humores, per subsequente adstringentium usum retenti, majorem erosionem faciant.

33. Qui instar cucurbitæ ad locum affectum aliquin trahunt humores magis fluxiles, quales præsertim biliosi.

34. Qui resiccandi vim habet, & dolorem sedare potest.

35. Quod expertum se feliciter R. Dodon. testabatur.

36. *Vox ne Italarum;
sed peregrina potius vi-
detur. expertam inter-
pretantur. satis adstrin-
gens est.*

37. *Quia diu retineri
non solent quamdiu ma-
lum non remittit.*

Lect. 97. Aprilis 27.
Vicus ratio.

aut de jujubis ad intestina
oblinenda § 2. & si opus
est majore astrictione ad-
ditur & ³⁶ michletæ Nicol.
plus minus § 1. vel aliud si-
mile. quandoque verò &
bolus armenus lotus in
aqua plantaginis. Olea au-
tem, vel alia pingua con-
sultò omittuntur. quia ul-
cera reddunt sordidiora, &
intestina humectant, quæ
fieri non expedit. Reite-
randa autem sæpius ³⁷ hu-
jusmodi sunt enemata, &
diutinè retinēda, quo enim
diutius retinentur, hoc plus
utilitatis ab ijs laborans
consequitur.

Victus ratio in dysente-
ria à bilioso humore talis
esse debet, ut bilis acrimo-
nia retundatur & alvus si-
mul astringatur. Ptisanæ
cremor, vulgò hordeatum
vocant, cōmendatur, præ-
sertim aliquot amygdalis
dulcibus una admixtis. Cō-
veniunt cydonea quovis
modo appatata, & pira co-
cta, tum quæ ex fructibus
astringentibus componun-
tur.

tur. Carnium usus non admodum ³² utilis est. in longiori tamen morbo dandæ sunt caponum, aut ³⁹ perdicum carnes cum amygdalis dulcibus contusæ. & cum aqua chalibeata decoctæ, addita etiam ptisana. Dandus autem cibus non multus est una vice, sed potius sæpius offerendus. Laudatur & ab Aëtio ac Alexandro ⁴⁰ lactis usus post 3. aut 4. priores dies, si febris permittat; cui utile fuerit aliquid sacchari, & aquæ chalibeatæ admiscere. Sic & ex lacte cum oryza, panico, milio, amylo, aut etiam cum pane puro pulres factæ utiles habentur. Potus sit ptisanæ decoctum additis passulis & conserva

38. Ne febrem augeant, auctis humoribus putredini obnoxijis.

39. Quæ reliquis sicciores existunt.

40. Quod acrimoniam humorum obtundat, intestina muniat, ac non nihil roboret.

Potus,

41. Ob febrem quæ pleurumque conjungitur.

asperat, & humores reddit acriores. Somnus omnino admittendus, & si non succedat, etiam provocandus: nam ut Aëtius ait, optimum dysentericis somnus est remedium.

42. *Intestinorum enim veluti cancerosam exulcerationem conjunctam habere solet.*

Quod si verò dysenteria ab atra bile inceperit, tamen si talē Hipp. lethalem⁴² affirmet 24. aph. 4. nihilominus tamen huic quoque occurrendum est; & ijsdem quidem medicamentis, tum & simili victus ratione, quibus dysenteriae à flava bile.

illa.

Differt autem hæc non parum ab illa dysenteria, quam lienosis supervenire bonum judicavit Hipp. 48. aph. 6. talis enim non ab atra bile per adustionem genita, sed à melancholico succo originem sumit, à quo se lien exonerat. Nec hanc dysenteriam mox lethalem esse pronuntiavit; sed postquam longiori ac diuturniori factæ hydrops successerit, aut lienteria: tum demum laborantem mori scripsit.

Huic

Huic autem primo tempore non esse occurrēdum

43. satis ab Hipp. monemur, sed hydrope, aut lienteria succedente; remedia haud dubiè talia adhibenda, qualia affectus qui successit requirit.

43. *Motus enim Natura, quo peccans humor à nobiliori ad minus nobilem partem expellitur, nequaquam à ministro Naturæ medico impedendus est. Quæ-*

Dysenteria. dam fit soluto morbo aliquo, quam curare non oportet, ne majus aliquod malum retento humore fiat. Autor libri qui Medicus inscribitur ex Hyppocr. sentētia, cap. de humoribus.

Ab humore autem pituitoso contingit & dysenteriam, licet rarius, excitari, nam & falsa mordax & corrupta pituita intestina vellicare, atque exulcerare potest. Comitantur quandoq; flatuum multitudo, & procedente tempore etiam crassa non rarò pituita simul cum sanguinis grumis descendit. Initiò expurgari etiam ventrem in hac cōvenit. Rhabarb. tostum, licet præcipuè cholagogum, tamen & in hoc affectu utile est: nam intestinis & proximis venis inhærentia, qualiacunq; ea sint, educit. Post purgationem

uno aut altero die 44. theriaces ʒ β. aut ʒ 2. dedisse cum aqua tormentillæ & ʒ β. syr. de limonibus, non

44. *Nam dolores sedat, cruditates minuit, & fluxus omnes moderatur, ac minuit.*

parum profuerit. Reliqua med. non refrigerantia sed calidiora, nec fortiter astringentia esse refert. Aromaticum rosatum, diagalanga & similes compos. conveniunt; cū quibus non nihil conserva rosarū rubr. admisceri poterit, addito syr. myrtino, vel de rosis aridis. Vtile & in hoc affectu diacydonion cum speciebus, vel illud Gal. de quo prius dictum. & maxime morbo jam inveterato. Enemata in hoc fluxu parū profunt, & minimè conducunt astringentia. subinde verò etiam nocent, dum crudos humores retineri efficiunt, & flatus remorantur. Victus ratio temperata esse debet. lac ex amygdalis dulc. convenit. ex lacte pultes antè dictæ etiam utiles sunt, & carnes pullorum gallinaceorū, ac perdicum assæ, vel cum amygdalis contusæ. Potus sit decoctum sem. anisi cum cinnamomo & cons. rosar. rubr. aut vinum tenue decocto sem.

sem. anisi dilutum. Ventrem ung. aut ol. ⁴⁵ astringente inungi non admodum prodest. Fomenta erunt potius adhibenda ex absinthio, rosis rubr. florib. chamæmeli in sacculo confutis: qualia, præter quod concoctionem adjuvant, flatus etiam discutiunt & dolores leniunt.

45. Propter rationem jam de Clysteribus allatam.

Quando vehemens med. purgans veluti scammonium, aut colocynthis dysenteriae causa fuerit, ⁴⁶ the- raices usus imprimis utilis est. Si verò nec sic fluxus cesset; offerenda sunt, quæ singulorū sunt, remedia, veluti contra noxā à scammonio danda sunt lentam sive lubricam habentia substantiam: ut sunt mucago sem. cytoneorū, aut sem. psyllij, aut sem. malvæ, vel etiā rad. althææ, & caro prunorum aut jujubarum. quorum uni aut pluribus cum mastiche, vel caro cydoneorum admiscenda. atq; sic exhibenda, & quidē sæpius, donec fluxus cessarit. Vnctio verò

Lea. 98. Maij. 7.

46. Non solum quod quatenus Narcoticoam ex opio vim habet, omnes actiones in excessu peccātes inhibeat; quodque contrarium humoribus motum, à centro nimirum ad circumferentiam inducat; sed potissimum quod quatenus Antidotum est, Purgantib. validiorib. quæ proprie Pharmaca dicuntur & ad venenorum naturā aliquatenus accedunt, adversetur, eorumque Alexipharmacum sit. Vide Gal. 12. Meth. c. 7.

47. Adeo ut historicus
de dysenteria Leonis
Cæsaris, qua in tantam
extenuatio-
nem deven-
rat ut corpus ejus unde-
quaque lumen transmit-
teret, dicat; Η' λεγξε
τὸ πάθος τὴν Ιάτη-
κὴν τέχνην ἐν κινδύνοις
ἀπακλόν ὑπάρχειν Ca-
dren. Debuisset dicere;
In quibusdam periculis
Medicinam nihil posse.
48. Quando putredinis
humorum gradus valdè
intensus. Talis sæpè in
castris uno in loco diu-
tius harentibus, grassa-
ri solet. Plato Theate-
tum Corintho ex ca-
stris Athenas ob dysen-
teriam & vulnere re-
versum narrat.

ventris cum oleo mastichi-
no etiā conducit, aut ex cy-
doneis coctis catapl. cum
oleo mastichino. Sic & no-
xa à colocyntide, corrigi-
tur aqua mulsa, uvarū pas-
sarū decocto & ol. amygd.
dulcium, ut refert Mezues.
Prodest & lactis tepentis
potio. quod dolores lenit
& intestina abrafa curat.

Prognosis.
Omnis autem dysenteria
gravis ac difficilis 47 est
morbis, & frequenter 48 con-
tagiosus. quæ si ab atra bile
inceperit, deterior est, & ut
Hipp. ait lethalis 24. aph. 4.
nam ab atra bile ulcera
omnia incurabilia habentur.
veluti cancer ulceratus,
qui ullo remedio nunquam
curari potuit. Lethale au-
tem & in dysenteria ab
Hipp. judicatur, si cum ex-
crementis veluti carunculæ
exeant. 26. aph. 4. carun-
culæ verò Hipp. dicuntur,
majusculæ partes interio-
ris tunicæ intestinorum. ta-
les si cum excrementis per-
misceantur, magnitudinem
& profunditatem ulcerum
osten-

ostendunt: qualia carne iterum impleri ac cicatrice obduci posse, pro impossibili habetur; ⁴⁹ atque idcirco dysenteria, per quam tales excernuntur, exitialis iudicatur.

Malum quoque in dysenterijs longis cibi fastidium esse Hipp. affirmat. aph. 3. lib. 6. & cum febris pejus. Quando videlicet is, qui diu dysenteria laboraverit & antea mediocriter cibum appetiverit ac sumpserit, postea eundem fastidit. Signum est enim, vel pravos humores ventriculo ac ostio ejus communicari; vel per consensum ipsis laborantibus appetentiam perire, quæ ad vitam est necessaria. Si verò & febris accesserit, quæ antea non affuerat, aut si, quæ exigua fuit, intendatur, ostendit vel putredinem circa ulcerem majorem factam, vel inflammationem aliquam effectum dignam supervenisse: quorum utrumque etiam pejus. Quamobrem si ad

⁴⁹. Aretæus quidem inferioris intestini (Colon credo intelligit) interiorem tunicam connectione solutâ, foras exire; reliquam cicatrice solidari, ac hominem id passum sine noxa vivere posse credidit. l. 4. c. 5. Gal. itidem id factum sæpè se vidisse testatur, ac nihilominus superstites agros fuisse, 4. de usu part. c. 17. sed quum in exitialib. dysenterijs id fieri dicat, 5. de usu part. c. 12. ad tempus tantum ea, quæ relicta superest, agros sustentari, sentisse videri potest.

cibi fastidium etiam febris accesserit; salus omnino est desperata. Vires enim corporis dissolvuntur, & tandem superveniente sudore frigido ægri moriuntur. Quando autem dysenteria furori ac mania supervenit bonum esse Hipp. ait 5. aph. 7. per humorum enim transmutationem, & à cerebro ad intestina translationem, expectanda mentis sanitas & furoris solutio: non tamen omnimoda sanitas: nam & dysenteria, si diutius perseveraverit, etiam in periculum ægrum adducit.

Solvitur autem illa potissimum mania, quæ primaria ac propria affectione cerebro laborante, ex biliosis humoribus eo perlati nascitur. non illa, quæ per consensum fit: qualis in febribus ac morbis acutis subinde accidit. Lienosis & dysenteriam supervenire idem affirmat bonum esse de quo jam ante, ubi de diarrhoea à liene, latius dictum.

De

De Tenesmo.

Lea. 99. Maij 8.

Tenesmus est frequens desidendi cupiditas ad quem pauca muccosa, raro cruenta, vel nulla sequuntur excrementa. Symptoma est recti intestini, quod dysenteriam sæpenumerò comitatur, & sæpius eam quæ à biliosis ac acribus & mordacibus humoribus oritur. tunc enim biliosi humores vel seorsum, vel cum excrementis ad intestinum rectum delati illud irritant, & cupiditatem excernendi irritant, hærentiumque illic excrementorum opinionem, & ea deijciendi desiderium movent. à quibus humoribus & quandoque rectum intestinum exulcerari contingit, sed tamen rarius. & tunc propriè Tenesmus dicitur.

Contingit verò Tenesmus fieri propter recti intestini inflammationem, veluti quandoque internæ hæmorrhoides vehementius dolentes inflammantur.

1. Παρὰ τὸ τεῖνεσθαι τομύριον, ὁπέπονθεν, καὶ πρὸς ἑκκρῆσιν βιάζεσθαι. Hincolim βιασμός dicebatur.

2. Quidam in hoc lapides excrevere; quod tamen non vidi. Gal. 6. de loc. affect. c. 2.

3. Affine enim malum est. Nicandri comment. Sæpè etiam præcedit.

4. Tali Tenesmi specie T. Pompon. Atticū correptum vitam inedia finivisse, Nepos refert, quum prius per lumbos fistula puris erupisset. In vita Attici. Lumbos causa, autē honestè vocat partem quæ circa intestinū directum est. Paulus hanc inflammationem œdematosam esse scribit.

H h

3. Pondere enim, & aliquando etiam asperitate Sphincterem vesicæ quidem immediatè, Recti verò intestini mediatè, per illum scilicet, irritando, frequentem desurgendi cupiditatē excitat.

6. Quod à Græcis non annotatum, usus tamen ostendit, & Avicenna quoque recensuit.

tur. tunc enim assiduum desiderandi etiam adest desiderium, de quo latius suo loco. Sed & duris excrementis, quæ σκύβαλα dicuntur, in intestino recto habentibus desiderandi cupiditas & inanis quidam conatus succedit. Calculo etiam magno in vesica existentē frequenter etiam tenesmus

comitatur, cui non est remedium nisi calculo exciso.

Tenesmus igitur qui cum dysenteria molestus est, absque exulceratione intestini fiat, calidis lenitur fomentis: & citius siccis, quam humidis. intestinum enim rectum quum substantiam habeat membranosa, & mucoso humore imbuitur, calido & sicco foveri gaudet. Fomenta ista fieri possunt ex furfuribus, floribus chamæmeli, milio, aut simili aliquo calfactis, & in oblongo tenuique sacco impositis, ac ano admotis. Sic & asseres calidi, vel bacilli calentes ex foco sumpti panno aliquo involuti pro-

profunt. Potest & tegulæ,
aut ferro, aut lapidi ignitis
vinum inspergi, vel solum,
vel cum aceto mixtum,
ejusque fumus calens reci-
pi. Fomenta verò etiam
ex flor. chamæm. meliloti,
anethi, sem. ammios, aut cu-
mini in aqua aut vino de-
coctis, subinde conducunt:
potissimum quando flatus
simul molesti sunt. Com-
mēdantur & exiguæ glan-
des, licinia vulgò appel-
lant ex licio, thure, ladano,
& alijs astringentibus ad-
dito opio, si dolor vehe-
mens, & croco opij corre-
ctorio. sed ab his abstinē-
dum quamdiu licij loco
Officinæ succo periclymi-
ni * perperam utuntur, sed
quando pro licio, vel ma-
tiche, vel hypocystis vel
aliud astringens sumitur;
utilis erit hujusmodi glan-
dium usus.

Ab exulceratione si tenes-
mus fiat, eadē sunt rem. ad-
hibēda, quæ adversus inte-
stinorum exulcerationem.
Si ab excrementis duris,

7. *Alias enim omittē-
Narcotica satius erit,
ne Sphincteris Paraly-
sin faciant.*

8. *Vehementer enim ca-
lidus & incidens est:
ideoq; irritando sphin-
cterem, malum auget.*

erunt hæc humectantibus
& mollientibus enemata
mollienda, ut ex decocto
malvæ, bis malvæ, flor. chamæ-
mæmeli, cum ol. amygd.
dulcium, vel viol. vel chamæ-
mæmelino. Quod si ver-
o admodum dura fuerint ut fistu-
la clysteris nequeat imponi
parandum erit ex supradictis
balneum, in quo æger
tandiu sedere debet, donec
fæces emollescant. &
tunc neque sponte expun-
gentur, vel enema quale
prius dictum est, vel ol. viol.
vel amygd. dulc. per syrin-
gem injiciendum, aut le-
ve aliquod medicamentum
propinandum.

Prognosis.

9. *Accedit quod expul-
sio fæcum alvi non so-
lum ope facultatis ex-
pultricis Intestinorum,
sed & actione musculo-
rum Abdominis pera-
gatur; quorum contra-
ctione fæcus itidem de-
pellitur.*

Tenesmum autem gra-
vidæ superveniens abor-
tum facere Hipp. refert 27.
aph. 7. Veluti enim recto
intestino inflammato vesi-
ca in viris, sic uterus in mu-
lieribus per consensum af-
ficitur. quapropter gravi-
ter affecto intestino recto,
& uterus propter propin-
quitatem simul laborat,
unde sequitur abortus.

De

De Purulento
Secessu.

Inter intestinorum symptomata, annumerari posse apparet & fluxus quosdam foetidos ac graecolētis puris; quod subinde bis vel ter per diem nullis excrementis permistum excernitur.

Præcedit hunc affectum in mesenterio inflammatio, qua in abscessum convergit tandem pus per venam aliquam proximam in cacitatem intestini influit, ac inde foetidum excernitur.

Remedium huic malo secundum repertum, sed hoc vitio laborantes, quum reliquarum partium sanitate fruuntur, etiam multis annis superesse possunt.

Uine mixti per alvum excrevit: subsequentibus nigris, & viridibus dejectionibus. quibus dolores nonnihil minuantur. Dedimus rhabarb. & similia lenia purgantia. & post illa sine calore detergentia & leniter astringentia, ut decoctum hordei cum betonica, & glycyrriza, addito mel-rosac. Foris linimentum ex ol. rosac. & chamamel. cum auco cerato santalino. Convaluit.

1. Cujus unus meminit Fernelius παθολογ. l. 6. cap. 7. Apud Rhazin tamen ista reperiuntur: Rupto in corpore abscessu maturo sanguini mistum pus confertim prodit; si is in ventre, aut locis laxos rectosque meatus ad ventrem habentibus, fuerit. Sin minus, ut ex thorace, paulatim prodit. In divisionibus c. defluxu ventris.

2. Cui dolorem adesse quamvis Fernel. hoc negat, observavimus quandoque R.D.

3. Quidam diu de tensione sub liene ad umbilicum usque conque-
stus, & febris laborans, post frigus extremorum puris libras octo san-

Lea. 100. Maij II.

De Colico Dolore.

1. Seu plenioris Intestini, ex quo, & nomen habet, in ea maximè parte quæ cæca est.

2. Prout nempe humores pituitosi, atque hinc orti flatus, locum mutant.

3. Hinc illa ; πρεδὴ
 & πρεδὴ &c. πρεδὴ
 & πρεδὴ &c. In antho-
 logico epigramm. Quin
 & Urine aliquando re-
 tinentur; imò & Causa.
 eromuntur.

4. Tensione etiam à flatibus, qui ex talibus humoribus produci solent.

5. Ut limonibus, cucumeribus. ex quibus Tiberius in Colicā incidit. Plin.
 26. c. 1.

6. Quod excretionem impediunt tam humorum, quam flatuum.

7. Ostendit hoc curatio; ut in illo nobis noto P. Sautxo qui colicam sibi familiarem haustu frigida curare solebat.

Colica, affectus est crassioris intestini, quocumque colon dicitur, cum torminibus & magno ventris dolore. qui frequenter non uno loco hæret, sed modo in una, modo in alia parte vehementior existit, accedente alvi tanta constipatione, ut neque excrementa excerni, nec flatus emitteantur: quem nausea, & sæpè vomitus comitantur.

Causa efficiens hujus doloris frequenter est crassus ac pituitosus humor lento re suo intestinis adhærens, & excedente frigore & dolore inferens. Quandoque cruda olera, aut fructus crudi & præcipuè astringentes: ut pira, corna, mespila, & similia, à quibus assumptis flatus gignuntur, qui quum exitum non habeant, molestiam ac dolorem inferunt. Sunt & quandoque calidi, acres & biliosi humores, vel inflammatio aliqua doloris colici causa

causa: sed tamen raro.

Annumeratur & à nonnullis coli doloribus & is, quem fæces & excrementa supra tēpus, & præter consuetudinem diutius retenta faciunt.

8. *Vide Cels. 4. c. 13. & libr. qui Medic. inscribitur. c. de humoribus.*

Non possunt autē, quum densæ substantiæ sint intestina, ab alijs quam tenuibus humoribus inflammari.

Signa.

Similis colico nephriticus in multis est dolor, sic ut difficulter ab eo dignoscatur: præsertim quando colicus dolor, uno loco hæret. tunc enim non nisi post aliquot dies diffcremen observari potest; quando videlicet in urinis sabulosa, aut arenæ apparent, vel sanguinis grumi. tunc demum enim manifestum fit dolorem esse nephriticum. sic & quando dolor non uno loco hæret, sed modo hanc, modo aliam partem ventris occupat, eorum affectum esse manifestum fit. Ex frigidis humoribus dolorem tactum ostendet corporis temperamentum frigidius, sitis exigua, vomitus pituifosi, constitutio aëris frigida ac potissimum humida.

9. *Calculi descendunt quidem, sed non nisi secundum ductum Vreterum, ad alterum raro locum, vel sursum moveri non possunt.*

& quæ præcesserunt ut vi-
otiosa, satietas, repletio fre-
quens, ciborum potuumque
frigidorū & difficilis con-
coctionis frequens usus
ventriculi cruditas. A re-
center assumptis frigidis
contractum esse dolorem
ex relatione laborantis cog-
noscitur potest. Ex calido
autem & bilioso humo-
re, vel inflammatione fa-
ctum coli dolorem, habitus
universi corporis biliosus,
vita laboriosa, vomitus bi-
liosus, multorum calidorum
usus, & ab his quod perci-
pitur nocumētum, demon-
strant. Quibus si febris
continua accesserit, inflam-
mationis suspicionē affert.

Curatio.

Ex pituitoso
humore.

■ *Ægri tamen sæpe
admittere nolunt. uti
nec Plotinus Philosoph.
quamvis hunc affectum
sæpius pateretur. quod
senem talem curandi ra-
tionem haud decere ar-
bitraretur.*

Curatio autem colicæ
ex frigido ac pituitoso hu-
more partim per vacua-
tionem, partim per ea fit
quæ excalfaciunt. Initio
enemata * injici conveni-
ex bismalvæ, flor. chamo-
meli, centaurij minoris, pu-
legij, origani, ruthæ, & sem-
ammios, cumini, fesselios
ac similia decocto, in cu-
jus

us ff. 1. dissolvendæ ꝑ 2. 10. In Hierarum & no-
vel 3. ol. anethini, ol. sem. minibus, & descriptione
ini, ol. liliorum, ol. chamæ- multum variant libri
melini, vel etiam rutacei, si medicamentarij. Nos
dolor vehemens. & adden- Pachij Antiochi audito-
da ꝑ 1. diaphœn. elect. In- ris Philonidis Hieram
di, bened. laxativæ, & non- hoc nomine intelligen-
nihil hieræ picræ, aut hieræ dam credimus; qui non
diacolocyntidos, quæ primus quidem hanc in-
fortior, & nonnihil salis. venit (nam ante illum

Dolore nonnihil sedato, Archigenes, ac Ruffus
& facibus aliquot expur- descripserant) sed pon-
gatis, purgantia propinan- deribus, & quibusdam
da: veluti unum aliquod ex simplicibus mutatis, usu
supradictis elect. vel spe- illustravit. nulli autem
cies diaturbith, vel pill. ag- se vivo compositionem
gregativæ, aut similes, aut dedit, sed per libellum
aliquod aliud med. quod ad Tiberium Cæsarem
humores pituitosos educat. misit; qui publicis illam
bibliothecis posuit. unde

Scribonius Largus ad manus suas pervenisse dicit. Ex-
hiberi etiam intus potest à ꝑ ij. ad ꝑ v. quæ tamen dosis
satis magna est. In clysteribus non facilè peccatur in dosi
purgantium Electuariorum. Non est autem alius Pa-
chius, alius Antiochus ut ex Aetio vides putasse Renod.
Vixit ante Gal. atque Asclepiadem. nam Gal. Colicam
Pachij Antiochi ex Asclepiade libro 9. de med. secund.
loca, inseruit. Misisse autem ad Tiberium verisimile, quod
illius principatu id malum irrepsisset, nec quisquam prior
ipso Imperatore id sensisset. Plin. l. 26. cap. 1. De quo
morbo & illud Suetonij capiendum, quod convulso latere
in graviores illum morbum incidisse dicit.

H h 5

Ex calfacientibus con-
veniunt diagalanga, dia-
cyminum, dianifum, diaca-
lamentum, diaspoliticon,
theriaca, mithridatium, sic
& gingiber, piper, sem. ani-
fi, fefelios, ammios, cymini,
& alia ejus generis.

Venter verò ungendus
est ol. rutaceo. liliorum, aut
simili. quod si cum stillati-
tio vini liquore aqua vitæ
vulgò dicta, recoquantur
efficaciora redduntur.

Ab usu fri-
gidorum.

Similia remedia etiam
adhibenda sunt, quando
post frigidorum usum co-
licus dolor ex flatuum re-
tentione invasit: nisi quod
non adeò fortia debeant
esse remedia. quandoq; ex
supradictis elect. unum ali-
quod, ut diacyminum suffi-
cit. Si opus fuerit enemate,
quantitate purgantium im-
minuta addi ipsis convenit
aliquod elect. de baccis
lauri flatus discutiens.

Victus ratio in utroque
affectu cal. & sicca esse de-
bet. abstinendum ab om-
nibus frig. seu fructibus seu
oleri-

oleribus quibuscunq; . Op-
imum, ac generosissimum
vinum conducit.

Si coli dolor ab inflam-
matione, aut acri materia
fiat ac biliosa; curatio supe-
riori contraria instituenda
est. Inflammatio sangui-
nis missionem requirit, quæ
facienda è communi vena
aut interna dextri brachij;

Leſt. 101. Maij 12.

Ab inflammatio-
ne et acri ac bi-
lioso humore.

sed tamen non 11 copiosa.

11. *Quia Intestina ve-
nas suas ex Porta, non
ex Cava, cujus rami se-
cantur, habent.*

Si soli biliosi humores ci-
tra inflammationem dolo-
rem excitaverint, à sangui-
nis missione erit abstinend-
um: reliqua remedia fri-
gida & humida esse con-
venit. Enemata erunt pa-
randa ex fol. malvæ, bif-
malvæ, mercurialis, betæ,
violaria, lactucæ & simi-
lium: cum quibus & furfu-
res absterfionis causa ad-
misceri possunt: & sem. lini
aut malvæ ad dolorem se-
dandum. ad hujuscemodi
decocti ʒ 1. addenda ʒ 2.
vel 3. ol. violacei, aut rosa-
cei, vel utriusque: ovi lutea
2. aut 3. sacchari rubri ʒ 1.
aut 2. diacathol. vel similis

12. Nostrum enim quo
 vescimur butyrum, cum
 sale parari consuevit;
 ut stimuli loco servire,
 nec acrimonia, quum
 pinguedine obtundatur,
 ledare, possit.

13. Quod multò tutius.
 nam mixta calida qua-
 dam materia, quum re-
 liquæ partes sunt frigi-
 dæ, sæpe decipitur me-
 dicus. à refrigeran-
 tibus in dolore colico
 semper abhorrendum: ac
 ubi communia non pro-
 ficiunt, balneorum usus
 sæpe utilis.

A retentis fecibus.

compos. lenitivæ $\frac{3}{4}$ β. aut
 36. & nonnihil butyri vul-
 garis loco salis. Purgan-
 tia med. sint ex ijs quæ bi-
 lem expurgant: ut infusum
 rhabarbari cum syr. ex in-
 fusione rosarum, aut cum
 manna, vel diaprunum so-
 lut. aut diacathol. cum de-
 cocto cichorij, vel aliorum
 refrigerantium. Ad ventris
 inunctionem convenit ol.
 rosaceum, vel butyrum lo-
 tum, cui addi potest ol.
 chamæmelinum ad dolo-
 ris sedationem. Balnea in

hoc affectu conveniunt
 ex decocto malvæ, bismal-
 væ, violariæ, additis flori-
 bus chamæmeli.

Victus ratio humida &
 frigida esse debet. cremor
 ptisanæ utilis est: & lactu-
 ca sive cruda, sive cocta, &
 alia ejus generis. Laudan-
 tur & pedes & extremæ
 partes vitulorum, ovium ac
 similibus. Potus ptisanæ de-
 coctum, vel tenuissima ce-
 revisia, vel aqua frigida, ijs
 qui assuevêre.

A retentis fecibus si coli
 dolor

dolor fiat, injiciendum enema molliens ex decocto malvæ, bisinalvæ, flor. chamæmeli & furfurum, addito ol. amygd. dulcium, aut chamæmelino, velut in teneſmo à fecibus retentis, & ſi opus fuerit balneis ſimilibus utendum.

Vtile verò fuerit & his purgans aliquod medicamentum dare quale in colico dolore ex humore pituitoso.

Colicus dolor diuturnus, aut ſæpius recurrens, non rarò in paralyſin brachiorum & manuum terminatur 14: conſequitur non rarò & crurum impotentia. de cujus curatione ſupra dictum eſt, ubi de paralyſi. Supervenit verò & quandoque colico dolori quando admodum vehemens, convuſio ac comitialis morbi acceſſio: & talis dolor gravis, & admodum periculofus. Sic & colicus dolor à bilioſis humoribus factus, facile in dyſenteriam commutatur: acris

14. Hipp. lib. de humor. in fine, & 6. epid. ſect.

3. in articulare morbum terminari obſervavit. Rationem reddit Langius, quod nervi quidam à ventriculo ad

Prognofis. brachia fe-

rantur: quæ nulla. alij, quod feratur ad cerebrum humor (cerebrum autem inteſtinis συμπαχεῖν; indicat comitialis morbus à colica ſuperveniens quandoq;) unde ad nervos brachiorum dilabitur. quod probabile aliquo modo.

Paulus per criſin fieri ait, poſt colicam à calidis humoribus; tum etiam epilepſiam, verum ego ſolum poſt colicam à frigida cauſa utrumq; affectum obſervavi R. D.

enim & biliosus ac mordax
quum sit humor, intestina
radit & exulcerat. quomodo
aph. 23. lib. 7. testatur
Hipp. A sincera, inquit, de
jectione, dysenteria: sine
ram siquidem dejectionem
appellat, merè biliosam.
Exemplaria quædam ha-
bent additam dictionem,
malum: sed Gaza, Leonice-
nus, & Cornarius in sua
versione non habent.

Lect. 102. Maii 28.

De I Ileo.

1. Quod anfractus inte-
stinatorum εἰλῆνται; vel
quod flatus ἐν ἐλῆξει
eorundem coarctentur
sic dictus. Hinc & Vol-
vulus appellatur. Bar-
bari, qui Miserere mei
&c. appellarunt, ad
ἐλεῶ respexerunt.

2. Χορδαῖος, quum lo-
cus circa umbilicū pro-
minet, à Veteribus dici-
tur. quod qui locum af-
fectum tangit, quasi
chordam tangat.

3. Quia quum intestina constringantur, nec excrementa,
descendere queant, necessariò sursum feruntur.

assum-

Ileos tenuioris intestini
morbus est, acutissimos
dolores ac gravissima ven-
tris tormina invehens, præ-
sertim circa umbilicum, ip-
sius umbilici & vicinarum
partium tumore: quando-
que accedente. Adest alvi
obstructio, & subinde tan-
ta, ut etiam ab injecto cly-
stere nihil subsequatur: co-
mitatur verò & nonnun-
quam: vomitus non modo

assumpti cibi, aut vitioso-

rum humorum, sed & mor-

bo in deterius abeunte,

ubinde ipsorum ventris

excrementorum.

Causa doloris ilei, tanta

est intestinorum obstru-

ctio ut deorsum excremen-

torum descensum impe-

liat. Obstruuntur autem

intestina vel à crassis ac

viscidis humoribus: vel à

tuberculo aliquo, veluti in-

flammatione: quandoque

erò etiam à fecibus alvi

induratis, & alicubi in in-

testinorum revolutionibus

compacti: veluti propter ra-

nicem, quando intestina

extra locum suum delapsa

sunt, atque in ijs dura ex-

crementa hærent. Adju-

at⁷ ad has causas non pa-

rum intemperies frigida, &

militer frigidorum usus,

intestina coarctans atque

constringens.

Inflammationem autem

intestinorum co-

gitatur non modo calor

circa umbilici partes, sed

dest & febris continua.

4. Ac tum duodenis

Hippocrati dicitur. 3.

prorhetic. comm. 66.

Gal.

Causæ.

5. Quam ad gangrenam

vergentem aliquando vi-

dimus. Vide Archige-

nem apud Aëtium. qui

tale quid etiam vidit.

Inflammationis autem

causa quandoque existit

Intestinorum violenta

nimis tentata, aut etiam

facta repositio.

6. Vide Hippocr. 3. de

dieta circa finem.

7. Non facit per se, sed

si causa ilei adsit eam ju-

vat. sic etiam vinum fri-

gidum lædit.

Curatio.

I. Ex inflam-

matione.

8. *Vel etiam in talo, aut poplite, inquit Trall. Poplitæam tamen secare nunc in usu non est.*

9. *Ne faeces duriores comprimendo locum inflammatū, dolorem augeant. Præbent autem Enemata alium etiam usum; fomenti nimirum calorē Phlegmones temperantis, dolorem mitigantis, & leniter discutientis &c.*

10. *Diu enim locum affectum contingere non possunt.*

Hac præsentē, à venæ internæ dextri & brachij sectione curatio auspicanda. Deinde exhibenda & ad movenda, quæ inflammationem sedare, dolorem mitigare, & alvum lubricam reddere queunt: ut sunt enemata ex malva, bis malva, mercuriali, folijs betæ & violarum, additis exiguo flor. chamæmeli, & fursuruto, in quorum decoctionibus 1. addendæ 3. vel 3. oleorum: partim humectantium ut amygd. dulc. sesamini, vel horum loco butyri: partim refrigerantium ut ol. violarum: & dissolvenda 3. 1. medullæ cassiæ fistulæ, aut tantumdem el. lenitivi, aut diacathol. ovorumque lutea duo aut tria & leniendi doloris & lubricandi intestinorum causa. & talia quidem enemata non semel, sed sæpius erunt injicienda. Exhiberi verò & convenit lenientia, ac refrigerantia med. qualia in coli inflammatione. Similis quoque

que victus ratio obser-
vanda.

I I. Ex crassis
humoribus.

Quod si autem à crassis
ac viscidis humoribus ilei
dolor originem habuerit,
cujus testimonium dare
potest febris vel nulla vel
intermittēs, enemata etiam
conducunt, sed fortiora :
& talia, qualia in colico
dolore à frigidis humori-
bus. Plus autem confe-
runt medicamenta assum-
pta: ut diaphcenicon, elect.
indum, vel tale aliquod, vel
pill. aggregat. aut de 8. re-
bus, sed potissimum pillulæ
iliacæ 13 à Rhazi. 9. ad Al-
manz. descriptæ: quæ acu-
tissimos atque gravissimos
ilei ex crassis viscidisq; hu-
moribus dolores una, aut
altera assumptione curant,
bona observata victus ra-
tione: quæ talis esse debet
ut alvus reddatur facilis. ad
quod faciunt humida ali-
menta, ut jura gallorum,
caponum, & aliarum car-
nium præsertim musculo-
rum; quæ intestina & lu-
brica reddunt & dolores

11. Ileus enim nihil
aliud quam doloris Co-
lici intensio Tralliano
videtur. loco enim, non
causâ differt hæc Ilei
species à Colica dia-
thesi.

12. Quia superiora affi-
ciuntur Intestina, Ileum
nempe potissimum.

13. Descriptio talis est.
℞. Colocyntid. sagape-
ni, ana ʒ x. scammonij
ʒ iiij. ʒ j. f. catapotia.
Dantur obuli. v. seu au-
reus β. Raz. 9. ad Al-
manz. c. 71.

leniunt. Ab omnibus non modo potentia, sed & actu frigidis abstinendum.

Et si quando manifesta frig. crassorumque humorum adsint signa; uti etiam licebit aromatis, alijsq; calfacientibus ¹⁴ uti in colico dolore ex causa frigida.

14. Quæ simul incidere, & concoctionem humorum istorum promovere, & discutere possint: nam quæ potenter calfaciunt, nec simul etiã discutunt, sæpe dolorem augere solent. Gal. 12. Meth. med. c. 8.

Contingit autem frequenter ut humores crassi viscidique, ilei dolorem facientes, non sint frigidi; sed ad bilis crassæ ac vehementius tostæ, quam Vitellinam appellant, accedant naturam: qui ubi in ileo impacti sunt magnos quoq; dolores inferunt, & putrescentes febrem excitant tertio die recurrentem. sunt autem tales humores non modo crassi ac viscidi, sed & fœtidi admodum ac graveolentes. Apparentibus igitur talibus excrementis una cum febricitiana, abstinendum erit ab omnibus calfaciëntibus potenter, & utendum alvum lubricantibus, & dolorem sedantibus supra dictis.

Quando

Lect. 103. Maii 29.

III. A fæcibus induratis, et prolapsu Intestini.

Quando autem propter ramicẽ ilei sit dolor, quum videlicet intestinorum aliquod vel in scrotum est delapsum, vel alicubi extra peritonæum excidit, & repletum sit induratis fæcibus sic ut introrsum & in suum locum reponi nequeat; enemata indere convenit mollientia, ut ex decocto carniū, aut ficuum, fol. bisinalvæ, flor. chamæmeli, meliloti, & furfurum: cui addenda sunt alvum lenientia prius dicta, & ol. amygd. dulc. cum ol. ¹⁶ sem. lini, ut videlicet fæces emollescant: quibus remollitis (si non succedant) glans supponi potest, quæ ipsas extrahat atque educat: ut ex speciebus hieræ picræ, vel potius hieræ Logadij, aut similis, aut fortior clyster, priori tamen educto ¹⁷, injiciendus erit. Balnea vero, vel illorum loco fomenta adhiberi etiam poterunt, veluti in colico dolore à retentis fæcibus.

15. Retinentur autem potissimū quando Ruptura magna est, sed quæ Intestinū coarctet, tumque fæces paulatim exsucci sunt & indurantur.

16. Quod in hoc casu singulare, nam & molles fæces, & vias aperit.

17. Nam si prius injiciatur, metus erit ne prius, succedente posteriore, ad stomachum propulsum evomatur. In alijs tamen morbis si 24. horis non egerit, spes est esse distributum enema, & ita aliud injici potest.

18. Non enim hic afficitur tenue intestinum. illa enim vix ex loco suo excidunt: sed propter similitudine tantummodo symptomatum ileos dicitur hic Affectus. ideoque imaginem Ilei quidam vocant.

19. Propter retentionem Excrementorum, accedentem febrem & dolorem intensissimū. Multi subito moriuntur, in illa quæ ex Inflammatione fit; quidam etiam ^{Prognosis.} intra tertiam, aut quartam horam, ut Archigen. apud Aët. scribit.

20. Præsertim si febris & singultus jam oborta, viresq; debiles sint: repositis enim intestinis, intra 6. vel 8. horas moriuntur.

Intestinis autem à fæcibus expurgatis, laborandum est ut introrsum repellantur, & in locum suum restituantur. Medicamenta purgantia ¹⁸ per os exhibere parum cōducit, subinde etiam nocet: propellunt enim excrementa deorsum, atque in intestinum, quod à loco suo excidit, impellunt, quod deinde magis repletum difficilius introrsum imponitur, atque in suum locum reducitur.

Abstinendum verò & in hoc ilei dolore ab omnium frigidorum usu: & victus ratio talis esse debet, ut alvus reddatur liquida ac facilis.

Acutus autem morbus ¹⁹ ileos est ac periculosus. Gravissimus verò etiam qui propter ramicem ²⁰, & in intestinis duriores fæces hærentes accidit. Hippocr. autem in ileo vomitum, vel singultum, vel desipientiam malum esse tradit, vel convulsionem. aph. 10. lib. 7. Vomitus siquidem in ileo non

non semper adest: frequen-
tius in colicis accidit dolo-
ribus. in ileo autem si acces-
serit, malus est: quia ferè
vix alios quam exitiales do-
lores comitatur, ut Galen.
testatur. Non omnis autem
vomitus æquè malus est:
nam eorum, quæ assumpta
sunt, vomitio minus mala:
Humorum verò corrupto-
rum & foetidorum, alvique
excrementorū maximè le-
thalis est: sic ut teste Gal. 6.
de loc. aff. à tali ilei affectu
vix unquam potuerit ali-
quis sanus evadere. De-
speratus etiam affectus est,
quando singultus superve-
nit: accidit verò propter
vitiosos ac mordaces hu-
mores, qui ab intestinis te-
nuioribus ad ostiolum ven-
triculi regurgitant, atque
ipsum irritant: omnia enim
acria, corrupta, ac foetida
ventriculo inprimis mole-
sta sunt. Fieri verò & sin-
gultus potest propter exce-
dentem, & nimiam vom-
itionem. Sive autem ab hac,
sive ab illa causa fiat, ma-

21. *Magna enim similitudo substantiæ intesti-
norum & nervorū, præ-
sertim tenuium, quod in
testudinum nervis appa-
ret.*

22. *Si ex vermibus do-
lorem, ileum appellat,
quod quidam faciunt,
verum dicit: alioqui
pueri non sunt obnoxij
facile ileo.*

lus est: præsertim si vire
sint imbecilles. Mala ve-
rò & desipientia in ilei do-
lore: fit enim quia maligni
vapores, vel etiam humo-
res ad cerebrum perferan-
tur: aut propter oris ven-
triculi affectum, cui cere-
brum consentit. Sic & con-
vulsio valde lethalis habe-
tur, quæ supervenit non
modo compatiēte cere-
bro, sed & nervoso gene-
re. In Coacis verò etiam
surditatem supervenientem
ileosis, malum esse scribit.
ostendit enim & hæc, quod
mali ac vitiosi humores ad
cerebrum perferantur. Aë-
tius ilei dolorem famili-
arem ait puerili ætati, & be-
neficio naturalis humidita-
tis hos evadere: senibus
verò minus esse familia-
rem, eosque si in hunc inci-
dant rarò convalescere. In
Coacis autem ileos inter
morbos numeratur, qui
ante pubertatem non fiunt:
sed ab anno 14. ad 42. su-
perveniunt: quo tempore
naturam omnium morbo-
rum

rum feracem esse Hippocr. ait.

De Vermibus.

Lect. 104. Iun. 4.

TRia vermium sunt genera¹. Quidam teretes ac oblongi instar terræ lumbricorum : alij lati & admodum prolixi : reliqui parvi qui ascarides dicuntur.

1. Sunt & alia vermium genera observata, sed quum omniū eadem ferè curatio sit, non sumus ea in re curiosi.

Oblongi in tenuibus intestinis, vel in monocolo generari existimantur : origo est ex crassis, pituitosis, putrescentibus humoribus, qui ex cibis corruptioni obnoxijis generari in intestinis cum excrementis hærent, & à valido calore naturali in lumbricos commutantur : frequentissimi isti

1. Teretes.

2. Vbi facile humores subsistunt : quia veluti sacculus est. In ventriculo autem non possunt gigni : quia tanta putredo magnum aliquod incommodum inferret. Dixit id Aristot. 1. de affectionibus mixtorū. Vide Scalig. qui in ventriculo gigni posse existimat.

26. exercitat. contra Cardan. Autor libri de Cathartici Gal. adscripti omnes teretes in ventriculo gigni asserit. Paracels. hinc in Intestina descendere ait. Iucutanam lues 80. ante Hispanor. adventum annis invasit, in qua multi ingentem vermium vim evomerent ; quibusdam alvo perrosa foras proruperunt. In puerulo per umbilicum vermen prorupisse novimus, qui tamen convaluit.

3. De tinea, lumbricif-
que accepimus, inquit
Plin. inesse Ægypti,
Arabie, Syriæ, Ciliciæ
populis. è diverso Thra-
ciæ (sic enim ex The-
oph. legendum) Phry-
giæque omnino non nas-
ci. Minus id mirū, quam
quod in confinio Atticæ,
Beotieq; Thebanis in-
nascentur, quum absint
Atheniensibus, lib. 27.
cap. ult.

4. Sunt nonnulli qui
dulcia primū exhibent.
& nonnunquam turgidi
excernuntur à vino cre-
tico seu malvatico, &
ab uris passis: legitima
tamen ea curatio non
est. Vide Lemnium de
natura, l. 1. c. 21.

in corporibus puerorum
gignuntur, rarò in aliorum
qui majorem ætatem ha-
bent 3. Signa istorum ver-
mium non admodum cer-
ta, sunt: alijs enim alia ac
diversa symptomata super-
veniunt: quibusdam nau-
sea adest ac cibi fastidium,
alijs appetentia inordina-
ta, & modum excedens:
dolor, veluti à morfu non-
nullis circa ventriculum,
alijs circa umbilicum pun-
ctorij dolores: singultus
quandoq; accedit, non ra-
rò & febres adsunt erro-
neæ: in somno tremor ali-
quando accidit, maximè
pueris in quibus pruritus
narium & malarum, five
genarum pars sub oculis
livens vermium in corpo-
re latentium signum ha-
bebit.

Occidunt autem teretes
vermes quæcunque amara
sunt: ut abrotani, absinthij
folia & semina, centau-
rium minus, persicæ arbo-
ris folia, ruta, gentianæ &
aristolochiæ radices, lupi-

ni, myrrha, semina s. santonina, tanaceti, & præcipue sementinae, quod vulgò semen contra lumbricos vocatur: aloë, colocynthis, & cucurbita s. silvestris & similia amara. Sunt verò & alia, quæ à tota substantia vermibus resistunt: ut cornu cervi, unicornu, laeis bezoar, bolus armenus, semen oxalidis, semen co-riandri, cytri, portulacæ, & ipsa herba: sic & corallina, & carduus benedictus, & agrostios radix: & ex compositis theriaca & nithridatum. Pleraq; horum teri & in pulveris forma exhiberi possunt cum aqua cardui benedicti, aut portulacæ, aut graminis; addito etiam syr. de limonibus vel de acetos. citri si febris adsit: nisi enim calida, veluti sem. sementinae, vel absinthij aliquo refrigerante contemperentur, febre augment & calorem eorum intendunt. Nec satis verò est vermes occidisse, sed & si alvus per se li-

5. *Quæ quorundam chamacyparissus est.*

6. *Quæ Cucurbita Barbara & Pyriformis ab alijs appellatur.*

7. *Crudi utilitatem maximam expertus sum. si resiccare velimus, torrendum est. hic crudum magis convenit: quia proprietas uestione tollitur.*

8. *Propter salem quem in se habet. nam si aquæ calidæ immersa paulum fuerit, tota albescet velut sale conspersa.*

9. *Quæ & muscus marinus dicitur.*

10. *Alioquin in intestinis putrescentes graviora symptomata excitant.*

quida non fuerit supradictis admiscendum aliquod quod mortuos ¹⁰ vermes expellat: ad quod rhabarbarum additum conducit. Poterit itaque pulvis aliquis hunc in modum componi & sem. sement. vel alterius amaræ ꝓ 1. ramentorum cornu cervi, vel unicornu, sem. citri, sem. oxalidis ana ꝓ 1. rhabarb. ꝓ 2. misce f. pulvis. cujus plus minus ꝓ 1. dari potest cum aliqua supradictarum aquarum. Poterit verò & talis aliquis pro ijs parari, qui ab amaris abhorrent. & ramentorum cornu cervi, aut corallinae ꝓ 1. sem. coriandri & citri ana ꝓ ꝑ. rhabarb. ꝓ 1. detur pro vice: aucta etiam rhabarb. quantitate ubi vires robustiores & ætas major. Inter ea .a. quæ exhiberi possunt, utilissima quoque est aloë vel ex hac composita hiera picra: quæ non modo interficit vermes, sed & mortuos, subinde etiam vivos expellit, tum & subinde assumpta vermium genera-

nera-

generationi obsistit. Ex supra
 ora verò enumeratis simplicibus possunt & for-
 nenta, ol. unguenta & cataplasma fieri quæ umbilico & ventriculi regioni admodum vermes interficiunt ac expellunt: sic absinthium cum aceto tostum pueris ubinde profuit: præsertim addito ol. ex absinthio, aut rutaceo, aut ex amygd. maris: quale ol. etiam foris umbilico ventriculoque illitum, quandoque confert. Qui ex hisce componere volet cataplasma, herbas, radices & semina ex supradictis quæ volet accipiat, & colocyntidos medullam: atque hæc in aceto donec molluerint coquat: deinde cotus addat farinam lupulorum, aloë, myrrham, vel alicujus animalis veluti ovis aut ovis, & ol. absinthij, rutæ, vel amygd. amar. quantum ad cataplasmatum compositionem requiritur. Qui verò maluerit unguento, aceto ex decoctis herbarum reliquo, addet aloë,

11. Quia putredini & quæ illam procedit, cruditati resistit.

12. Rara enim & perspirabilia sunt corpora puerorum. unde medicamentorum, licet exterius adhibitorum, vis facilius penetrat.

myrrham, fel, oleum absinthij, rutæ, amygd. amar. & ceræ q. s. & tali unguento uti licebit, vel solo, vel cum theriaca permixto, atque sic emplastri modo umbilico imponi, vel absque theriace umbilicum & ventriculi regionem isto inungere.

Lect. 105. Iunii 5.
II. Lati.

13. Intra hominem gignuntur tæniæ tricenum pedū aliquando & plurimum longitudine, Plin. l. 11. c. 13. Atqui Intestinorum omnium longitudo tanta non est. Sed respexit forte Plin. aut is ex quo hæc descripsit, ad longitudinem imaginatione compositam ex omnibus abruptis, & per intervalla prodeuntibus patribus; quæ duas, aut tres quandoque ulnas excedunt.

Causæ.

14. Vnde & Tæniarum nomen illis inditum.

15. Aëtius ex Herodoto, ni fallor. Serm. 9. c. 40.

Latus lumbricus non est tereti, aut terrestri lumbrico similis, sed est instar oblongæ, albidæ, tenuis, & angustæ fasciolæ: ¹⁴ qualis illa est, qua mulieres suas comas obvinciunt, qui intestinorum substantiæ secundum longitudinem sic adnascitur, ut existimetur à nonnullis ¹⁵ interior membrana intestinorum in talem lumbricum conversa, quod veritatem non habet: nam illæsis intestinis excidere potest.

Generatio hujus est ex crudis & admodum crassis pituitosis humoribus intestinis secundum longitudinem adhærescentibus. Hipp. connasci pueris existimat

timat & cum ipsis augeri,
 itque pubertatis tempore,
 ut serius intestino adæ-
 quari, & quandoque lon-
 giorē ac majorē factum
 um stercore exire, atque
 articulas ejus excidere
 magnitudine seminis cu-
 urbitæ, unde & cucurbi-
 nus lumbricus dicitur.

Qui autem hunc lumbrici-
 um in corpore gestant ut
 lurimum pallidi sunt, im-
 ecilles, & ad opera tardi:

Signa,

quandoque inordinata
 uadam appetentia labo-
 rant: nonnūquam cibum
 ustidiunt: sed tamen in-

16. *Propter frigidita-
 tem humorum qui in
 corpore existunt.*

erta hæc sunt signa. Cer-
 tissima autem & minimè
 allacia indicia sunt lumbrici-
 ipsius particulæ semini
 cucurbitæ similes, vel ma-
 jores, cum excrementis
 exeuntes.

17. *A cruditate humo-
 rum os ventriculi obli-
 nentium, & suctionis,
 sensum impredientium.*

Ad curationem horum
 vermium requiruntur simi-
 lia remedia, qualia ad supe-
 riora: quæ tanto fortiora
 esse debēt, quo firmitus lum-
 bricus isto intestinis adhæ-
 rit: nec amara sufficit

Curatio,

18. *Dulcia med. non
conveniunt, ut est dia-
phænicon.*

19. *Non febricitanti-
bus? febris tamen raro
adeſt, morbus enim ali-
quot annorum eſt. qua-
lis ſi febris conjungere-
tur, eſſe non poſſet.*

eſſe medicamenta, ſed ſi-
mul ſatis valenter purgan-
tia eſſe oportet, ut ſunt hie-
ra Logadij, aut hiera Ar-
chigenis, pill. aggregat.
pill. de nitro, & ſimiles quæ
colocyntidem admittunt.
Convenit quoque diatur-
bith, & elect. Indum¹⁸. Fo-
menta, unctiones, cataplaſ-
mata adverſus hos vermes
nihil conducunt. Lauda-
tur verò & ab Aëtio ac
Paulo compoſ. ex nitri, pi-
peris, & cardamomi parti-
bus æqualibus, cujus 3 i.
cum vino¹⁹ aut aqua exhi-
bita fertur conſeſtim lum-
bricos iſtos educere. Sig-
num curationis eſt, ſi ver-
mis rotundus & in pilæ
modum convolutus, excer-
nitur, ut Hippocr. ait. quan-
do enim partes ſolummo-
do, etiamſi duorum aut 3.
ſint digitorum, prodeunt,
reliquo intus manente, non-
dum curatio perfecta: licet
niſi multo poſt tempore,
particulæ aliquæ excidant.
Viſtus ratio in hoc affectu
eſſe debet ad caliditatem
in-

inclinans : allium in cibo
commendatur : piper, &
alia aromata & sem. cymi-
ni ad ciborum condituram
conducunt. Fugienda quæ-
cunque facile corrumpun-
tur, ut cerasa, pruna, persi-
ca, armeniaca, & similes
fructus, tum & omnes
crudi. Legumina immatu-
ra, & quæcunq; frigidos
generant humores. qua-
lis etiam victus ratio con-
venit ijs, in quorum intesti-
nis teretes generantur ver-
mes.

Ascarides ** exigui sunt
vermes, in crasso intestino
ab humore aliquo ibidem
putrescente, aut à stercore
illic retento geniti, qui
subinde cum alvi excre-
mentis exeunt, aut post il-
lorum exitum circa annum
hærent.

Adversus hos profunt &
amara quovis modo per
inferiores partes adhibita.
possunt fieri glandes ex
aloë, aut hiera picra cum
melle cocto, addito sale, ni-
tri, vel sale gemmæ. Con-

20. *Poma, pira cocta
non adeò facilè cor-
rumpuntur, unde non
ita valde mala.*

21. *Theophrast. 4. de
stirpib. c. 17. testatur
ex leguminib. lupinos
ervum, cicer sola & ζωσ-*

III. AS. *αἴ; propter
carides. acrimoniam
& amarorem. Athe-
næus l. 2.*

22 *Ab ἀσκαρίδω dedu-
ctum hoc nomē, vel pro-
pter mobilitatem isto-
rum, vel quod caseorum
vermiculis quodammo-
do similes, qui non tan-
tum agiliter moventur,
sed & saliunt.*

23. *Non opus clystere
quia una aut alia ꝑ re-
ctum intestinum imple-
tur. quod sufficit.*

Prognosis.

ducunt & lotiones ex decocto aristolochiæ, vergentianæ, vel bryoniæ, & absinthij, centaurei, rutæ ac lupinorum: ex quo decocto aliquid etiam cum syringa in anum injici potest: addito, si placet, ol. absinthij, aut rutaceo. Cum quibus ol. & anum inungi etiam expediens est.

Teretes autem lumbricos in acuti morbi principio excerni, malum est: non etenim à forti ac vincente natura, sed à vi morbi & causa ejus perniciofa expelluntur: nam ut Gal. lib. 4. cōment. aph. 24. Quando aliquid initio morbi excernitur, id propter dispositionem in corpore præter naturam contingit: quo tempore natura à causis morbum efficientibus gravatur. atque idcirco in initio alicujus acuti morbi lumbricos exire, malum habetur. Pejus verò si non per alvum, sed vomitione reddantur. ostendit enim majorem naturæ à causis mor-
bificis

bificis oppressione. In progressu verò morbi concoctionis signis apparentibus, veluti circa statum, aut in ipso statu; & præsertim in die decretorio expelli lumbricos bonum est, ut Hippocr. lib. 2. prædict. ostendit. Lumbricos, inquit, teretes eunte morbo in judicationē descendisse idoneum est. tunc enim à vincēte ac superante morbum natura rejiciuntur.

De Hæmorrhoidibus.

Leet. 106. Junij 7.

HÆmorrhoides : ap- 1. Αἰμόρροϊς φλεβᾶς
pellantur : venæ illæ vocat Hippocr. magnas
ad sedem sive anum per- venas, quæ divisæ mul-
tingentes, quæ quando pa- tum sanguinis fundunt.
2. de fract. comm. 24.

Eandem ob causam forsā venæ circa anum sic vocari cæperunt, quod apertæ multum sanguinis fundant; vel quod præ cæteris aperiri consueverint. 2. Quæ omniū ferè consensu ex vena porta deducuntur, Internæ nempe, & vasa sunt tunicarum directi Intestini. Ista autem venas comitari ramos Arteriæ Cœliacæ notarunt Anatomici recentiores. Externæ verò à cavæ ramis exoriuntur, & musculorum sunt Sphincteris motum peragentium.

K k

3. Qualitate, aut Quantitate, aut Motu ad illas partes, peccantem. sæpe copiosissimum: ut in illo, qui per 45. dies quotidie & ij. (nisi error scriptoris, aut typographi sit) excrevisse narratur.

4. Sive intrinsecæ sint, sive extrinsecæ.

Cæcæ hæmorrhoides.

5. Aloës vel minima particula sumpta venas hæmorrhoidales ilico aut turgidas facit, aut aperit, quod validiora alia medicamenta non faciunt, ut turbith, esula &c.

tent, sanguinem: fundunt. dicitur & ipsum sanguinis per has profluvium, hæmorrhoids: sed frequentissime venæ sanguifluæ hæmorrhoidum nomen obtinent. Sunt autem hæ duplices: quædam etenim interius latent, aliæ extrinsecæ conspectui patentes.

Tument quandoque hæmorrhoides: & si tunc sanguis nullus per has profluat, cæcæ dicuntur: à quibus verò sanguis fluit apertæ nominantur.

Dolorem autem frequenter cæcæ hæmorrhoides & quandoque, admodum vehementem inferunt; præsertim quæ intrinsecæ sunt: & tunc quidem quando acri ac mordaci aliquo admoto exacerbantur, veluti enemate quod salem multum, aut hieram picram, vel etiam fortiorē aliquem hieram permixtam habet, aut simili aliquo supposito-rio imposito. Intendunt verò & dolorem duræ alvi fæces quando excernuntur.

Dolo-

Dolorem autem intrinsecus latentium hæmorrhoidum etiam vehementiorem & cum calore conjunctum cito sedat⁶ ol. violac. $\frac{3}{4}$ i. aut i β . mensura cum parva syringa per sedem injectum, si frequentius imponatur. Nonnulli hujus loco ol. rosac. utuntur: sed illud minus efficax est. Prodest verò ol. ex violis etiam ad exteriores tumentes ac dolentes hæmorrhoides, cui ovi luteum crudum quandoque admiscetur ut melius adhærescat. additur verò & ol. sem. lini quando nullus calor adest, aut unguentum populi calore præsentem. Utile quoque fomentum ex floribus chamæmeli, meliloti, fol. bismalvæ, & violariæ herba, aut violis ipsis. Sic & cataplasma imponi potest ex radicib. bismalvæ decoctis, addita sem. lini & fœnugræci farina, & butyro recenti, aut ol. violaceo. Quod si duræ alvi

fæces hæmorrhoidum do-

6. Nam præterquã quod tam quam rosaceum refrigeret, insuper etiam mollit, quod rosaceum non præstat: quum astrictionem quandam habeat.

7. Velut quidam faciunt, ex radicibus cynoglossi. quæ efficax est ad sedandum dolorem auxilium.

Kk 2

*§. Cerevisia Gedanensis
quippe crassum succum
ingenerans hic minus
convenit.*

lores intendant sive cæcæ,
sive apertæ illæ sint, enema-
ta alvum lenientia injicere
convenit : ut ex decocto
carnis absque sale, vel ex
decocto florum & herba-
rum jam dictarum cum ol.
amygd. dulc. & butyro, &
uno aut altero ovi luteo :
quale fæces emollit & ea-
rum absque dolore exitum
procurat. Quibus au-
tem enemata displicēt, his
subinde danda est manna
aut medulla cassiæ fistulæ,
aut musculosarum carniū
insulsa juscula^s, aut similia
quæ alvum lubricant & fa-
cilem reddant, observata
idem faciente victus ra-
tione.

Conducit verò sæpè
non modo dolorem lenire,
sed & sanguinem ex ipsis
hæmorrhoidibus evocare
frequenter expedit : veluti
quando admodum tument,
& laborans affectui alicui
sit obnoxius, qui sanguinis
per hæmorrhoides fluore
curari, aut mitior reddi po-
test ; vel quando solitæ
fluere

fluere, præter consuetudinem diutius sunt repressæ. tunc enim sanguinis fluxum per hæmorrhoides provocari maximè expediens est: prius tamè quàm id fiat, si corpus valde repletum fuerit, sanguis erit detrahendus, excubiti vena media, aut interna. neque verendum sanguinem hoc modo revellendum; licet enim sursum videatur retrahi: non cessabit tamen idcirco natura quod reliquum erit impuri ac melancholici sanguinis, per hæmorrhoides ablegare.

Aperit autem hæmorrhoides aloë ¹⁰ assumpta, & quæcunque cum hac componuntur. evocat verò & ex his sanguinem frictio frequens cum aspero aliquo, veluti rudi panno lineo, aut cum fici aut symphyti folijs. Aperit verò & has ceparum succus felle bovino admixto, cum lana aut gossypio appositus. Item & cyclamini succus per se, aut cum melle illi-

9. *Ne malum aliquod partibus inferioribus eorruente sanguine, inferatur.*

10. *Gal. ob acrimoniam facum putat fieri. quod tamen verum non est quum feces multò acriores non provocent.*

tus. Quod si verò istis hæ-
morrhoides non aperian-
tur, sanguisugam unam aut
alteram tumētibus hæmor-
rhoidibus apponere con-
ducet. Vel si hæ ad manum
non sint, scalpello ipsas ape-
rire utile erit, sic enim san-
guine profluente & dolo-
res cessant, & à vitiosis hu-
moribus venæ expurgan-
tur. Hæmorrhoidibus au-
tem obstructis & dolenti-
bus victus ratio convenit
attenuans, ut ex carnibus
volucrum circa aquas non
versantium, & talis, qualis
in curatione quartanæ ac
melancholiæ. Potus sit vi-
num album & tenue, vel
cerevisia tenuis ex bonis
frugibus cocta.

Lea, 107. Iunij 8.

Aperitæ.

Apertæ hæmorrhoides
à quibus sanguis profluit
sinendæ, neque has reprimere
expediens est: nisi su-
perfluant aut modum ex-
cedant: per has enim à
nonnullis morbis vel præ-
servari vel liberari homi-
nem contingit: nam ut
Hipp. 6. epid. part. 3. hæ-
mor-

morrhoidibus laborantes
neque pleuritide, neque pe-
ripneumonia¹¹, neque pha-
gædena, neque furunculis,
neque thermintis, neque le-
pra corripuntur¹². Sic &
liberari ac sanari per hæ-
morrhoidum fluorem con-
tingit insania aut melan-
cholia laborantes, eodem
teste. Insanis, inquit, si va-
rices vel hæmorrhoides su-
perveniant, insaniæ solutio,
aph. 21. 6. Item melan-
cholicis & nephriticis hæ-
morrhoides supervenien-
tes, bonum 11. aph. 6.
Nam in utrisq; melancholi-
ci humores insaniæ ac me-
lancholiæ efficientes cau-
sæ, per hæmorrhoides ex-
purgantur. Nephriticis ve-
rò eadem cōducunt ratio-
ne, qua à pleuritide ac pe-
ripneumonia præservant:
sanguinis videlicet quan-
tatem minuendo. nec
enim soli humores melan-
cholici (licet hi præcipuè)
sed tum & alij, ac subinde
purior sanguis per has ex-
purgatur. Atque propter

11. *Quia copia fervidi sanguinis depletur.*

12. *Quia causa horum malorum, in melanco-
liam, vel atram potius
bilem adustione conversi
humores, per hæmor-
rhoidas evacuatur.*

13. Rursum Hæmor-
rhoidibus assuefaciendi
non sunt, quibus sanguis
ater nō colligitur, quum
utrinq; excessum utrin-
que habeant periculo-
sum.

has rationes hæmorrhoidum
fluor, nec statim, nec
temere est sistendus, nisi
superfluat 13. Quando autem
tem superfluit, sanguis
tenui ac seroso profluente
& vires redduntur imbe-
cilliores, faciei color palli-
dior, & respiratio quando-
que difficilior, tunc eas sisti
convenit.

Sistunt autem hæmor-
rhoides astringētia: ut sunt
rosæ rubræ, balauſtia, cor-
tices granatorum, calices
glandium, plantago, equi-
setum, verbascum, rubi fo-
lia, galla, nuces cupressi,
sem. berberis, sem. myrt. &
similia. Item hypocistis,
acacia, sanguis draconis,
alumen, vitriolum & simi-
lia. Ex quibus lotiones, fo-
tus, & cataplasmata fieri
possunt: ut Rosar. rubra-
rum, balauſtiorum, cort.
granat. cal. glandium ana
℥ 2. fol. verbasci siccorum,
fol. rubi, aut myrti ana M. β.
nucum cupressi, gallarum,
sem. berberis ana ℥ 1. alu-
minis ℥ 2. f. omnium de-
coctio

coctio in aqua plantag. vel
 aquifeti, vel in aqua chali-
 ceata ad consumptionem
 medietatis: colato adde
 mellis rosati, aut syr. ex ro-
 sis aridis ʒ i. cum hoc
 subinde abluantur, aut fo-
 veantur hæmorrhoides.
 Potest deinde imponi tale
 cataplasma. & Hypocist.
 cicaciæ, sang. draconis,
 churris ana ʒ i. cum ovi al-
 bo & modico ol. rosacei,
 aut myrtini misceantur.
 Huic verò & addi pote-
 unt emplasticam ac resic-
 cantem vim habentia, ut
 bolus armenus, terra sigil-
 lata, vulgaris mumia.

Cataplasmatibus verò loco
 etiam symphyti trita radix
 apposita confert: jam &
 atramentum scriptorium
 cum gossipio impositum
 sistit fluorem hæmorrhoi-
 dum.

Veteres nimium diu pro-
 luentes hæmorrhoides ex-
 trahere, filo constringere,
 dein resicare, aut urere so-
 lebant; & postea cicatri-
 cem ipsis inducere, ut

14. Nam ex gallis, vi-
 triolo, & gummi Ara-
 bico componitur, que
 omnia frig. sicca, atque
 adstringentia sunt.

15. Cicatrice enim claudunt. quæ ipsis partibus solidior ac firmiter est, nec per Naturæ motum rursus aperiri potest.

Aphorismus interpretatus.

16. Quæ sepe non proficientibus lotionibus & reliquis medicamentis sanitatem restituit.

Hipp. lib. de hæmorrh. ac Aët. & Paulus faciendum docent. Atque sic curata non amplius aperiuntur sed occlusæ permanent. fluxu earum perpetuo suppresso, quod bonum non est: nam ut Gal. 6. epid. ait, periculosum est si hæmorrhoides in totum suppressantur: atque idcirco Hipp. unam servandam consulit. per quam videlicet melancholicus sanguis expurgari possit: *Adiuturnis*, inquit, *sanato hæmorrhoidibus, si una non ferretur periculum est aquam intercutem vel tabem advenire*, 12. aph. 6. Verum hæc sententia locum non habet quando per ea, quæ prius sunt dicta, hæmorrh. sistuntur: non etenim sic obstruuntur quin suo tempore, quum natura se se exonerare cupit, iterum aperiuntur ac dehiscant.

Victus autem ratio nimium profluentibus hæmorrhoidibus convenit crassos, ac lentos ingenerans humores. ad quod faciunt

tiunt ea, quorum jus gela-
linæ instar concrefcit, ut
sunt pedes & extrema
ovium, porcorum, boum,
& similibus animalium: item
& carnes vitulinæ præfer-
tim musculosæ. Vinum
dulce, non tenue, quale
Creticum & Passum. Ce-
revisia crassa, qualis ¹⁷ Ge-
danensis vel alia similis.

*17. Quæ præterquam
quod crassum facit suc-
cum alvum etiam lubri-
cat, quod utile est.*

Prognosis.

Caterum quemadmo-
dum Hipp. abscissis omni-
bus hæmorrh. periculum
esse ait adventus ¹⁸ hydro-
pisis aut phthisis, ita etiam ni-
trium ac supramodum his-
te profluëtibz omnes, aut
plurimas naturæ operatio-
nes, qui sic affecti sunt, of-
fensas habent: nonnulli
verò etiam & hydrope cor-
piuntur, ut Gal. com-
ment. 22. lib. 2. aph. ait.

*18. Quia vitiosi humo-
res retenti hepar, vel
pulmonem invadunt.*

De Inflammatione Jocinoris.

Lect. 108. Junii II.

Duplex, inquit Gal. mor-
borum genus jocino-
i accidit, unum à sola in-
temperie citra tumorem

præter naturam ; alterum quando cum intemperie humor aliquis infestat , vel inflammatio, erysipelas, aut scirrhus.

Huc verò & refertur & obstructio à crassis & viscosis humoribus , & spirituosâ aut flatulentia ejusdem distentio.

Causa.

Iocinoris autem inflammationem gignit sanguis copiosior in ipsius visceris substantiam , seu *παρέρχουσα* influens.

Signa.

1. Propter obtusum partis hujus sensum.

2. Vt & omnes inflammationes partium interiorum. illarum enim intemperies tum propter vasorum magnitudinem, tum propter vicinitatem cordi communicatur.

3. Quotiescunque enim in locum frigidiorum effunditur bilis , mutat colorem. solet autem ista bilis in ventriculo potissimum colorem illum acquirere.

Comitatur autem hanc dolor dextri hypochondrii non pungens , sed magis cum gravitatis quodam sensu : febris continua : respirationis quædam , non tamen magna difficultas : tussis sicca & exigua : nausea : cibi fastidium : sitis magna : lingua initio albidâ , postea asperior ac nigricans : vomitus syncera bilis, quandoq; etiam crassioris ac ovi luteo similis, quæ postea æruginis aliquando colorem referre conspicitur : alvus dura,

nisi

nisi adsit visceris imbecil-
itas.

Oritur autem inflamma-
tio modo in gibba jocino-
ris parte, modo in sima, ra-
tione in utraq; : si in gibba in-
flammatiō nata, tumor sen-
titur, & admota manu do-
lor etiam ejus nonnihil in-
enditur : & si abdomen
gracile ac tumor magnus,
conspicui etiam patet: tussis
etiam major, & respira-
tio etiam aliquanto diffici-
lior, & dolor ad jugulum
parte dextra extenditur
ideo ut ipsum detrahi vi-
deatur. In sima verò in-
flammatione consistēte, tu-
mor neque sentiri neque
conspici potest: tussis mi-
nus molesta⁴: respiratio li-
berior : sed sitis, nausea, &
sibi fastidium majora⁵: &
vomitus meracioris bilis
frequentior, ac copiosior.
Quum verò utraque joci-
noris pars⁶ laborat, dolor
ad nothas costas extendi-
tur, atque respiratio longè
difficilior. Quod si verò
etiam inflammatio erysipe-

4. Quia diaphragma
non afficitur hic.

5. Quod sima pars im-
mediatè ventriculū con-
tingat.

6. Neque enim fieri po-
test ut exactè circum-
scripta diu subsistat:
quod Hepatis caro sibi
continua sit.

latodes fuerit aderit febris
ardens, sitis vehementissi-
ma, lingua nigra & adme-
dum aspera, vomitus mer-
cioris bilis: atq; reliqua on-
nia symptomata majora.

Similis autem inflan-
mationi jocinoris pleur-
tis videtur, sed pleuritis a-
tiori est loco & dolor ejus
punctorius, & tussis cum
spuito cruento. inflamma-
tionis jocinoris dolor infe-
riori est loco, non puncto-
rius, sed gravativus: tussis
absque spuito, ut latius di-
ctum ubi de pleuritide.

Curatio.

Curatio à venæ sectione
incipienda: detrahendus san-
guis ex dextri brachij venæ
interna, aut saltem media
& siquidē una vice tantum
extrahi non potuerit, quan-
tum videbitur, reiteranda
sanguinis detractio. Pur-
gante verò & aliquo medi-
camento opus fuerit, nisi al-
vus fluxa sit: cōducit autem
infusum rhabarb. cui man-
na aut syr. ex infusione ro-
sar. utiliter adjicitur. Hujus
loco poterit & clyster ali-
quis

7. Quod propter insig-
nem in hujus morbo uti-
litate Iocinoris vita ab
Arabibus dictum fuit.

quibus mollis injici ut ex decocto malvæ, betæ, mercurialis, violarum; cui addendum ol. chamæmel. & rosmarini, & diacathol. ʒ 6. aut ʒ 1. & tantumdem sacchari rubri, & exiguum salis.

Necessaria verò etiam quæ alterant, & calorem contemperant, inter quæ laudatissimum cichorium,

inde dens leonis, & enlivia vulgaris, & ex istis compositi syrupe; quos cum decocto earundem her-

arum, aut aquis exhibere convenit. Cum ipsis verò herbis coquenda quædam sunt aperientia & urinam provocantia: & initio quidem temperata & non admodum calida: ut sunt rad. paragi, rusci, graminis, & feniculi: & tale decoctum sæpius exhibendum: præsertim inflammatione gibba jecinoris existens: nam ut Gal. 6. de loc. F. Gibbæ per urinam, si partes jecinoris per aliam expurgandæ. In progressu verò morbi notis

8. Quod simul obstructions, quæ cum Inflammatione partis hujus conjungi solent, aperiant.

concoctionis apparentibz
 licebit magis aperientia
 paulo calidiora addere
 vulgare hepatorium, cu
 cuta, rad. petrosel. aut ap
 & syr. de Bizant. qui, si cu
 aceto fuerit paratus, cra
 sos ac viscosos humores
 etiam incidit, & potentia
 obstrueta aperit. Ac h
 etiam utendum in sima j
 cinoris parte inflammatio
 ne consistente: interim fa
 pius exhibenda sunt per a
 vum purgantia, quamqu
 gibba pars affecta est.

Adhibentur verò &
 hoc affectu epithemata,
 olea, aut unguenta hypo
 chondrio dextro. Epith
 mata fiunt ex succis, deco
 ctis, aut aquis cichorij, en
 diviæ, oxalidis & similium
 quibus addi convenit (u
 visceris robur conservetur
 vel agrimonix, vel rosarum
 rubrarum, vel etiam ab sin
 thij succi, vel decocti par
 aliqua. sunt autem hæc epi
 themata non actu frigida
 sed tepida admovenda.

9. Ne scirrhus fiat, in-
 crassatis & impactis
 humo ribus.

Oleo verò utendum et
 rosac

rosac. vel cydon. cui miscendum aliquid olei de abinth. quo Gal. 11. meth. protinus utendum consulit, propter eam quam habet alstringendi facultatem, qua jocinoris robur conservatur, quod conservari debet. atque hinc jecur non esse relaxantibus 10 frig. curandum Gal. admonet.

Victus ratio in jocinoris inflammatione tenuis esse debet, & ad frig. ac humiditatem inclinans: veluti in febribus synochis & ardentibus. sed abstinendum est ab omnibus actu frigidis; veluti in omni partium internarū inflammatione.

Gravis autem ac difficilis morbus est jocinoris 11 inflammatio, cui singultum supervenire Hipp. malum esse ait aph. 17. lib. 7. ostendit enim & malignam admodum & maximam jocinoris inflammationē. tum enim singultus compatiente ore ventriculi fit, quando jocinoris inflammatio & pessima, & maxima fuerit

10. *Nostri ævi medici plerumq; unguēto utuntur rosaceo, quod tamen, si compositionem ejus spectes, contra mentem Gal. adhibetur.*

Prognosis.

11. *Propter Principatum, quem inter partes Naturalibus facultatibus inservientes hoc viscus obtinet.*

authore Gal. bile videlicet multa ac copiosa admodum ad ventriculi ostium perlata, atque illud irritante ac mordente.

Quod si verò inflammatio jecinoris in abscessum commutetur, febres quædem desinunt aut mitiores fiunt, sed corpus sensim extenuatur (ut Gal. in Introductorio seu Medico scribit) tandemque laborans deficit ac moritur.

Contingit verò & quandoque pus ex abscessu profluens aliud aliquod ex internis visceribus corrumpere ac inficere, & quandoque subitanæ mortem inferre.

De Erysipelate jecinoris nihil hic afferendum, de eo siquidem actum est ubi de febribus ab affectu erysipelatum. quarum quæ Typhodes dicitur, ad erysipelas jecinoris consequitur. Nulla etiam œdematis mentio hic facienda; nam hoc initium est hyposarçæ, quæ species est hydropis: de

12. Sanguificatricis viribus languentibus.

13. Nonnunquam per alvum, vel urinarios meatus conferatim effluit.

de qua postea agendum.
 Cachectica siquidem hy-
 posarcam præcedens di-
 spositio, jecur cedemate la-
 borare ostendit.

De Scirrho Ioci- noris.

Lect. II. O. Iun. 14.

Scirrhus jecinoris pro-
 priè dicitur tumor du-
 rus ac indolens, ab humore
 crasso, limoso, ac melan-
 cholico genitus. & talis
 quidem exquisitus est scir-
 rhus. Minus autem pro-
 priè reliqui tumores duri,
 licet non à melancholico
 succo, & non omnino abs-
 que dolore, scirrhii appel-
 lantur. & tali scirrho quan-
 toque obnoxium est he-
 par, & quidem frequen-
 tius quam exquisito: nec
 semper tumor appa-
 ret, sed quando ejus *παρα-
 γυα*, seu substantia ejus
 durior reddita: tunc scir-
 rho jecur laborare dicitur.

1. *Vel potius Tumores
 Schirrhosi.*

2. *Quod humores ex
 quibus verus schirrus
 producitur in splene po-
 tius, quam in hepate, se-
 de suam habere soleant.*

Origo talis scirrhii ab
 humore est crasso ac vis-
 coso, ut plurimum per re-

Causæ,

L I 2

3. *Crassi namque per se humores, qui Tertianas impuras producunt. ideoque citius à frig. & adstringentibus medicamentis indurantur.*

4. *Discussis nempe tenuioribus partibus.*

5. *Præsertim in gibba ejus parte existentis.*

Signa.

frigerantia & astringentia indurato, veluti per talium frequenter in febribus tertianis, præsertim impurorum usum: quibus hujuscemodi scirrhus frequenter succedit. Oriuntur verò & à erysipelate, aut inflammatione nimium refrigerati. Possunt verò & ex sola viceris obstructione macerata fieri. Contingit verò & crassos ac viscosos humores quandoque à calore, aut à calidis biliosis humoribus + indurari, atque in lapideam substantiam unicum jecinoris ipsius substantia converti, quod fere per regium fit morbum.

Non difficilis autem scirrhi jecinoris agnitio est. abdomine extenuato & corpore: nam quum moles ejus durior sit quam inflammationis, facilius tactu percipitur: sed prius tamen quam Ascites supervenerit: nam ubi ille (quod frequenter fit) successerit, præ tumore abdominis scirrhus deprehendi nequit.

Scir-

Scirrhus autem ex cras-

Curatio.

is & viscidis humoribus
post febrem relictis, aut
quem obstructio præcesse-
rit, attenuantibus, aperien-
tibus, & temperatè calfa-
cientibus curari debet: uti-
les sunt herbæ, rad. sem.
um & syr. ac elect. tali
prædita facultate: de qui-
bus mox ubi de jocinoris
obstructione. Topica ve-
rò admovenda quæ emol-
liendi ac digerendi vim
habent: ut est ung. ex ol. li-
norum, chamæmel. & nar-
dino compositum, præfer-
im si aliquid ammoniaci
in aceto dissoluti, aut bdel-
lij accesserit. Sic & utile
ol. rutaceum cum ol. sem.
lini paratum: quod singula-
rem emolliendi ac dige-
rendi vim habet. Condu-
cunt & ea *, quæ adversus
tamenis duritiem faciunt.

6. Quibus tum potissi-
mum uti convenit, quan-
do levioribus malū non
cesserit.

Victus ratio.

Victus ratio ex optimis
& facilis concoctionis ci-
vis esse debet: quos condi-
ti aceto, vel succo citrio-
rum, aut limonij utile est: si-
uti & simul cum ijs coqui

7. *Vbi calor magnus aut non affuit, aut jam adesse desijt.*

petroselinum, vel ejus
foeniculi rad. aliasque he-
bas: ut 7 origanum, hyssopum, thymum, valde expediens est. Vitanda omnia crassa, viscosa, ac difficilis cōcoctionis: ut sunt carnes boum, & omnes sale maceratæ, aut fumo duratæ, & carnes ferinæ, & omnium palustrium & circum aquas versantiū volucrum.

8. *Et quæ ex lupulo amarorem habet; ut illa quæ in usum nautarum parari solet.*

Vinum tenue & album aut cerevisia tenuis 8 comendatur: rubrum vinum dulce, crassum, immaturum & omphacites improbantur: sic & multus lactis aut casei usus.

Prognosis.

9. *Quatenus intemperie hæmatosin lædit.*

10. *Tum qua intemperie chymosin; tum quæ vias obstruendo chymidiadosin impedit.*

Omnis autem scirrhus jecinoris hydropem 9 minatur, aut 10 atrophiam, & præcipuè qui exquisitus, qui etiam sanitatem non admittit ut Gal. 14. meth. ait. Sic & durities scirrhusa, quæ inflammationi, aut erysipelati malè curatis, aut nimium refrigeratis successit, aut post morbum regium relicta est; incurabilis quoque existit, maxime ubi

bi hydrops ascites succedit, qui sæpiſſimè ſuccedit.

De Obſtructione

Jocinoris,

Le 2. III. Junij 15.

Obftructione jecur tūc laborare dicitur non quando ipſius ſubſtantia aliquo humore imbuitur; ſed quando tenues & exi-
les venæ, per quas alimen-
tum diſtribuitur & à ſimis
partibus ad gibbas & ad
venam cavam deferitur, an-
guſtiores factæ ſunt, vel
etiam occluſæ.

Cauſæ interdum ſunt
crassi, ac lenti pituitosi hu-
mores in ipſis anguſtis ve-
narum vijs hærentes: inter-
dum verò multa ſanguinis
copia venas ipſas implens;
veluti in plethora.

Signa obſtructionis ſunt
in dextro hypochoſondrio
gravitatis ſenſus: & urinæ
tenues: & ſiquidem lenti
ac crassi ſunt humores qui
venas obſtruunt, febris nul-
la adest, aut poſterius ſu-
pervenit, quando videlicet

1. Tumores ſic ſunt di-
verſi, pro humorum di-
verſitate, ſed obſtructio
meatum, h.e. vaſorum
affectus eſt.

2. Vel etiam dolor ex
tenſione citra tumorem
& febrem.

3. Quod ichoroſa Uri-
narum materia velu-
ti percoletur, partesq;
crassioreſ veluti in cor-
pore retineantur.

L l 4

4. Quia sanguis multus
diu conclusus esse non
potest quin incalescat,
vel etiam putrescat.

humores putrescentes
accendunt. A sanguine
verò copia si fiat obstru-
ctio, præter signa quæ p-
thoram sive plenitudine
ostendunt, adest quoq;
bris & frequentissimè
nochus. quem propter
miam sanguinis copia
fieri Gal. testatur.

Annumerant nonnu-
obstructionis causis & fl-
tus jecur distendentes, se-
hos Gal. 5. de san. tuend. a
obstructione differente
facit.

Curatio.
I. A sangui-
nis copia.

5. Quæ propter obstru-
ctionem à sanguine fa-
ctam retenta ultra soli-
tum fuere, tum biliosa,
tum melancholica: Ista
enim leni alvum cum
apertione ducente me-
dicamento ex corpore
deturbari necessum est,
ut morbos faciant.

Si itaque à copia sangui-
nis obstructio jecinori
fiat: mox sanguis ex dextr
brachij media, aut interna
detrahendus; veluti in syno-
cho & inflammatione jo-
cinoris. Post sanguinis mis-
sionem exhibendum ali-
quod erit med. s. quod ea,
quæ in primis ac proximis
venis hærent, expurget: ve-
luti infusum rhabarb. cum
manna, aut syr. ex infusio-
ne rosarum. quod infusum
si factum fuerit cum deco-
cto aliquo aperientium ac
refri-

refrigerantium, præstantius
et utilius erit: qualia sunt
rad. asparagi, rusci, cicho-
rii, dens leonis, & similia.

Victus rationem oportet tenuem esse: veluti in
jocinoris inflammatione:
sic multo plenior.

6. Multa enim humorum
copia obstructions fa-
cit, vel saltem auget
factas.

¶ Ex crassis
humoribus.

Quando autem obstru-
tio jocinoris ex crassis ac
lentis humoribus, nulla-
que accesserit febris, purgans
aliquid med. erit exhiben-
dum; quod lentos ac pitui-
osos humores educat &
acuitate aperitiva non de-

7. Exempli gratia; &
Rad. sæniculi, petroseli-
ni, ana ℥ β. cuscute,
hepatorij vulg. cichorij
ana M. β. sem. melonum
sem. anisi ana ℥ i. fol.
sænæ ℥ v. agarici ℥ i.
Zingib. ℥ β. uvarū pas-
sarum ℥ β. f. decoctio
ad haustum, cui adda-
tur syr. acetosi simpl.
aut compositi ℥ i.

stituatur: quale esse potest
ex decocto rad. herb. & se-
minum aperientium, in quo
confusa sint folia sænæ, &
garicus. Utile quoque dia-
phœnicon, vel elect. In-
firmis. Debilioribus diaca-
tylon. cum simili decocto,
vel cum decocto cicerum
exhibendum. Prius tamen
quam purgans exhibeatur,
humores nonnihil præpa-
rari cōvenit: quod fieri po-
terit exhibitione oxymeli-
tis vel syr. acetosi simplicis
vel compositi. Post pur-

gationem etiam fortiori-
bus aperientibus utendum
ut etiam syr. de Bizant. syr.
de rad. & similes. Ex sim-
plicibus hepatorium vulga-
re, cuscuta, lupuli folia, &
similia quamdiu non adef-
febris. Quòd si febris ac-
cesserit, sanguis etiam eri-
detrahendus; non præter-
missis interim reliquis quæ
dicta sunt: nisi quod ape-
rientibus quadam etiam
minus calida, sed tamen
aperientia erunt admiscen-
da: ut cichoriū, dens leonis,
endivia &c. Aperiant au-
tē & jecinoris obstructio-
nes dialacca, & diacurcur-
ma in Officinis usitatae: sed
in febribus hæc minus con-
veniunt. * Utuntur & non-
nulli unctionibus, ad quas
conducit ol. amygd. ama-
rorum & nardinum: præ-
sertim si cum nardi spica
aut junco odorato, & sem.
apij aut petroselini, & cy-
peri radice in vino albo te-
nui, & exiguo aceti adusq;
consumptionem horum li-
quorum decocta fuerint.

Victus

8. *Non possunt valde
convenire quum obstru-
ctio fiat in medio cor-
pore jecinoris, ad quod
medicamenta hæc ex-
terna vix penetrant.*

Victus rationem esse talem convenit, qualem in scirrhi curatione.

Obstructio autem jocinoris si diu constiterit, febris supervenerit: putrescentib. β . in angustis venarum meatibus ipsis humoribus: aut tandem scirrhus, si non curatio adhibeatur, accedit.

Prognosis.

De Iocinoris ex flatibus tumore.

Tumor jocinoris aut præcordiorum, qui ex flatu gignitur, à cruditate originem habet: idcirco post cibum sumptum molestior quàm alio tempore, ut quàm jejuno ventriculo.

1. Dolor vehemens hepatis non fit nisi ex apostemate calido, aut flatu. quapropter quum non est febris, & dolor est vehemens causa ejus sunt flatus.

Contra hunc auxiliantur anisi, ammos, carvi, feniculi, aut similia: aut ex his composita tragemata prox post cibum sumpta: adhibito nonnihil cinamomi, mastiche, rosis, aut semine koriadri: & sacchari quantum omnium est pondus.

2. Flatus enim tensione laciunt; quam novi chymi accessio auget.

3. Nam levis adstrictio ut tonus visceris nobilissimi servetur, requiritur.

ex quibus mox à sumptu
cibo cum modico vi
nonnihil est sumendum.
Adduntur astringentia,
concluso per hæc ventri-
culi ostiolo concoctio re-
datur melior. Si verò pe-
severans fuerit ex flatibus
distentio: hierâ picrâ ver-
tricus purgandus: & ab-
stinendum ab omnibus, quæ
flatus ingenerare queant.

Lea, 112. Iunij 18.

De Imbecillitate Jocinoris.

Imbecillitas jocinoris di-
citur, quando ipsum vis-
cus in proprijs actionibus
per solam malam intem-
periem debilitatur: nulla β.
neque inflammatione, ne-
que alio manifesto morbo
in ipso existente. Propria
autem ejus actio, sanguifi-
catio sive sanguinis est ge-
neratio: quam substantia
sive πᾶσι γένεσις ejus opera-
tur. hac actione læsa, af-
fectus dicitur hepaticus, &
hoc laborantes hepatici, si-
ve jocinorosi à Medicis
nominantur.

*1. Propter debilitatam
Retentricem, per acci-
dens; aut Concoctri-
cem, per se.*

dominantur, ut Gal. 8. *¶*

Nascitur autem imbecillitas vel ab intemperie ipsius visceris, vel ab intemperie humorū, qui in venis aut arterijs proximis continentur: per quam ipsa joci-
moris actio, quo minus munere suo proprio fungatur, impeditur.

Accidit autem ista joci-
moris imbecillitas quando-
que cum alvi cruento fluo-
re. quando videlicet ipsum
hepar chylum attrahit, &
aliquo modo permutat, sed
non retinet. atque tunc flu-
us hepaticus, aut hepatica
ysenteria affectus; nuncu-
atur. Quandoque verò &
absque alvi fluore imbecil-
tas contingit, & tunc at-
tractus chylus retinetur, sed
in bonum sanguinem non
convertitur: ut fit in Ca-
hexia.

Signum autem affectus
hepatici est, quando nullo
modo in jocinore existente ut
dictum est malo, faciei co-
lor vitiosus ac pallidior

2. Hi tamen nisi viscus
intemperatum, ideoque

Causa. debile reddi-
derint, affe-
ctus hepaticus haud-
quaquam dici poterit.

3. Et quod excernitur,
ἐξυθέρει vel *ἐξέξυθέρει*
περίπλυσσις dicitur, aut
χυλώδης; aut *αἱματώ-
δης διάχωρσις*. Fit au-

tem hoc, vel Retentrice
suo munere non fungen-
te: tumque pauciora, sed
continuo excernuntur;
Vel Expultrice quod
corruptum ac coacerva-
tum est proturbante;
tumque plura, per inter-
valla, sed confertim de-
jici solent. Atque hæc
actio hepatis, prima qui-
dem Cæliacæ; posterior
Vomitui ventriculi, pro-
portione respondet.

4. Humorū enim colo-
ri cutis, potissimum f. a-

signa. ciei ubi illorum
major conslu-
xus, fit color analogus
est. quare quum tales
sint, quales hepar pro-

ducit, humores, faciei color hepatis diathesi designat.

5. *Quòd hepar situ Cordi propinquum, & maximis venis connexum sit.*

6. *Expultricē oris ventriculi irritantium.*

7. *Humoribusvè saltem secundarijs, primò; post etiam ipsa carne.*

redditus sit : & alvi excrementa liquidiora, vel sanguinea, vel sanguini permixta fuerint : ex his enim jecur debilitate laborare, & sanguificam ejus vim debiliorem esse, constat. Et siquidem cum calida intemperie imbecillitas conjuncta fuerit, excrementa loturæ carniū recens matatarum similia sunt, sed frequenter crassiora ac nigriora : subinde etiam biliosa quædam ipsis ammiscuntur. Adest verò & febrilis calor, & sitis, & quandoque vomitus assumptorum, vel vomitus bilis aut aliorum vitiosorum. Et si diutius hæc intemperies perseveret, etiam crassa, pingua, graveolentia, & abundè colorata excrementa redduntur : celli-quescente ipsa jocinoris substantia. Si verò frigida adsit intemperies loturæ quoque carniū similia excrementa, sed liquidiora & dilutiora apparent, & quandoque cruda quædam

quædam ipsis permiscen-
tur, vel crassioris quidam
sanguinis grumi nigrican-
tes: tandem etiam varij
coloris redduntur excre-
menta: sitis adest exigua
aut nulla: appetentia inor-
dinata modo magna, mo-
do remissa.

Quando autem absq; al-
vi profluvio imbecille red-
ditum fuerit jecur, & ex
calida quoque intemperie,
color faciei ad^a flavum si-
ve luteum colorem incli-
nat: urinæ rubent: alvus
frequenter dura, ac sicca:
febris non rarò accedit: si-
tis intenditur, & lingua fit
arida: & tandem univer-
sum corpus flavo colore
suffunditur sicut in ictero;
& extenuatur, præsertim si
sicca adsit intemperies: &
quandoque etiam pruritus
accedit. Si quando imbe-
cillitas ex frig. fit intempe-
rie color faciei albicat &
pallidus est: urinæ albidæ
quandoq; tamen & ruben-
tes, sed quæ non perturban-
tur: corpus & præcipue ex-

8. *Propter adauctam
flavem bilem.*

9. *Calore chyli, ac fæ-
cum liquidiorẽ par-
tem dissipante.*

10. *Ex acrimonia hu-
morum ad habitum de-
latorum.*

11. *Quæ gradu solum,
non etiam specie differunt.*

Curatio.
Generalis.

12. *Quæ tonum quidē addant, obstructiones autem non faciant.*

13. *Qui Cinnamomum, casiam, & canellā unum idemque dicunt; rem ipsam dicere credendum est.*

tremæ partes frigent: sit adest nulla: & cibi fastidiū. quandoque pedes non nihil tument, aliquando & cachexia¹¹ deinde hypofarica subsequitur.

Curatio imbecillitatis ipsius jocinoris per ea fit, quæ composita sunt ex moderatè¹² astringentibus, intemperiem alterantibus, & qui humores cōjuncti sunt ipsorum malitiam corrigentibus. deinde etiam eijs, quæ contrariam vim habent adversum putrefactiones, quorū plurima u Gal. ait ex aromatum sylvis existunt. inter quæ cinnamomum¹³, & casia quæ vulgò cannella, à Gal. præ cæteris commendantur: quæ omnes putredinosas, ac venenosas facultates corrigere affirmantur. Intemed. verò simplicia, quæ adversus jocinoris imbecillitatem conducunt, sunt & myrobalani ab Arabibus descripti & laudati, ac præsertim citrini nūcupati; quæ astringendi facultatē cum exigua

exigua frigiditate primi, aut
secūdi ordinis conjunctam
habēt, qua jocinori & om-
nibus partibus nutritioni
dicatis profunt, easque ro-
borant: colorem etiam fa-
ciei emendantes. qua de
causa med. hepaticis opor-
tunè adhibentur, vel etiam
per se, præsertim conditi
sumuntur.

Quando igitur per cali-
dam intemperiem jocino-
ris actio debilior reddita,
alvo fluida, & excrementis
cruenta; adhibenda erunt
astringētia roborantia quæ
nonnihil simul refrigerent,
ut sunt rad. tormentillæ,
quinquefolij + rubeæ, bi-
stortæ, & similes: myroba-
lanorum citrinorum, vel
etiam aliorum aridorum
cortices. conducit & agri-
monia à Veteribus eupato-
rium dicta, & ad hepaticas
affectiones ab ipsis com-
mendatum. Quod si verò
& caloris excessus magnus
fuerit, licebit & cichorium,
aut oxalidem addere. Ex
his autem parari potest de-

Particularis.
Quæ cum fluxu
ex cal. interna
peric.

14. Quum astringere
contra Gal. jam in stir-
pium historia demon-
stratum. unde etiam in
vulnerarijs potionibus
adhiberi solet.

M m

15. Potiones ferè potius
adhibende quia agri-
ficiunt.

16. Caro cydoneorum
aut rob de ribes addi
etiam possunt; aut rob
de berberis.

coctū¹⁵ aliquod, cui etiam
incoquēdæ sunt uvæ passæ,
ad jocinoris affectus Gal.
authore utiles. tale deco-
ctum canella cinamomo
vulgari condiendum, vel
speciebus diarrhod. vel
diatrionsantalon. Postea
si libuerit, admisceri pote-
rit aliquis syr. astringens:
veluti de succo granat. aci-
dorum¹⁶, aut de succo cy-
doneorum, aut de rosis ari-
dis, vel myrtinus; prout la-
boranti placere potuerit
cujus gustui consulendum
est. talem potionem bis,
aut ter per diem offerre
expedit. Hujus verò loco
conditum etiam compo-
nere licebit ex conserva
rosarum rubrarum, rob. de
ribes cum trochiscis de
spodio dictis, aut cum spe-
ciebus diarrhodon, aut spe-
ciebus diatrionsant. addito
aliquo supradictorum sy-
rup. ex quo bis tervè in die
plus minus 3 β. crit dan-
dum.

Victus ratio refrigerans
& astringens similiter esse
debet.

debet: cremor hordei ad-
ditis amygd. dulcibus utilis
est: conducit quoque & ci-
bos cōdiri portulaca, oxa-
lide, fructibus mori, corni,
ribesij, aut berberis¹⁷.

*17. Qui etiam resiccatis
servari potest per hye-
mem.*

Potus sit ptisana cum ci-
namomo decoctum, vel
ipsius cinamomi decoctum
addito aliquo dictorum
astringentium, aut rosis ru-
bris vel earundem conser-
va, vel ligno santalorum,
aut simili aliquo.

In causa frigida omnia
calfacientia cōveniunt, tam
quæ medicamenti locum
habent, quam quæ alimen-
ta sunt. Conditum suffice-
re potest ex conser. rosar.
rubrarum & conser. flor.
rosmarini, addita galanga,
calamo aromatico vulgari,
cinamomo, aut speciebus
aromatici rosati, aut diaga-
langa, quæ miscenda sunt
cum syr. de mentha. & tali
condito utendum veluti
priori.

*Cum alvi fluore
à causa frigida.*

Cibum esse oportet ex
optimis carnibus, quas ci-
namomo, garyophyllis, pi-

Mm 2

18. *Præstaret. tum assis
uti infixis garyophyllis.
nam liquida omnia al-
bum movent.*

19. *Sine surfuribus enim
album retinet.*

Citra fluxum alvi.

A causa calida.

pere, mace, gingibere, car-
damomo condiri refert
vel cum ipsis serpillum, hyl-
sopum, salvia, rosmarinum
incoquenda. Vinum lau-
datur album, clarum, odo-
riferum. quod etiam præ-
stantius futurum si aroma-
tis condiatur, quale quod
vulgò Hippocraticum di-
citur. Panem in quavis im-
becillitate cum alvi fluore
convenit purum esse, &
benè fermentatum.

Quando autem imbe-
cillitas jocinoris absque al-
vi fluore acciderit, & qui-
dem cum intemperie cali-
da, refrigerantibus erit utē-
dum: veluti in acutis febri-
bus ac in jocinoris inflam-
matione: cichorio videli-
cet, dente leoni & simili-
bus. quibus agrimoniam
addi non parum conducit,
propter eam quam habet
altriictionem qua jocinoris
robur auget ac conservat.
Dandum verò & aliquod
med. quod bilem, & quæ in
primis venis hærent, expur-
get, ad quod nullum rha-
bar-

barbaro 20. est præstantius. 20. Nam præterquam
quod eo modo, quo in fe- *quod alvū ducit, tonum*
bribus aut in inflammatio- *etiam hepatis conservat*
nibus jecinoris, erit exhi- *& auget.*
bendum.

Victus ratio frigidior
esse debet: quæcunque ex
hordeo mundato, seu pti-
sana parantur, & cum ipsa
coquuntur, utilia sunt: sic
& lactucam, & cichorium
& similia cum cibis coqui
conducit. Vinum fugien-
dum est & quæcunque ex-
calfaciunt.

Quando autem simul
cum frig. intemperie jecur
imbecillitate laborat; ijs-
dem remedijs erit uten-
dum, eademque victus ra-
tione, quibus in jecinoris
obstructione. Rarissimè si-
quidem frig. intemperie ci-
tra obstructionem jecur
afficitur 21.

Perseverante autem diu,
fluxu hepatico tandem jo-
cinoris substantia colli-
quescit, & corpore exte-
nuato, vires vitæque defi-
ciunt 22. Jecur autem col-
liquari excrementa pingua

A causa frigida,

21. *Et aperientia ple-
raq; etiam calidam fa-
cultatem habent.*

Prognosis,

22. *Præsertim quando
fluxus alvi simul adest.*

M m 3

admodum graveolentia biliosa, aut livida, aut nigra aut viridia ostendunt: veluti dictum ubi de diarrhœa. Citra autem alvi fluorem diu permanentem jocundis imbecillitatem cachexia, aut hydrops sequitur, vel ipsum jecur corrumpitur.

Lect. II. 4. Junii 21.

De Regio Morbo.

Ab ictide, seu mustela agresti; vel ab Ictero avicula, quæ & galbulus, seu galbula dicitur; quod animalia ista lurida, seu fellei coloris sint.

Vnde & Aurigo, atque ar-

Causæ.

quatus morbus dicitur, quod bilis toto diffusa corpore, tam auri quam arcus cælestis luteum colorem, mentiatur. Vnde & Regius dici potuit, quod Reges in vestib. alijsque ornamentis auratis sæpè conspiciendos sese præbeant. nam quæ de cibis, vino, ludo, lasciviaque afferri solent, longius petita videri possunt. præsertim quum omnes propemodum lingua, non à curationis modo, sed à colore hunc morbum denominare voluerint. Et rei medicæ ignarus fuit, qui Arquatium dictum putavit, quod ita stringat corpus ut in arcum ducat.

Icteros sive regius morbus bilis flavæ per universum corpus est suffusio, cutim luteo colore inficiens, qui etiam in oculorum albo manifestissimè conspicuus est.

Tribus autem modis hunc

maximè

maximè : fieri contingit: vel vitio β folliculi flavam bilem continentis: vel propter jocinoris aliquem affectum: vel critico modo.

Vitio autem folliculi accidit, vel quando ipse præ imbecillitate bilem non attrahit, aut attractum non retinet, vel quando meatus folliculi obstructus per quem sese exonerat & bilem flavam ad intestinum jejunum demittit. hoc enim meatu obstructo bilis ad venas regurgitat & sanguini permixta universi corporis cutim luteo inficit colore. Obstruitur autem meatus à lentis, crassis & frequenter pituitosis: humoribus. obstructionem ostendunt excrementa albidia & nulla bile tincta, album oculorum ex luteo pallescens, urinæ bilio-

2. Sunt quidem & aliij modi, sed rariores, ut à veneno vel adsumpto, vel aëri permisto, aut per vulnus immisso. Sic à lepore marino adsumpto ἰοφόεις μὲν ὑπὲρ χλοῆς ἐδραμε γῆσις ἰκτέροεις &c. Et ictus à vipera moritur χροῶν χλοῶν θῆς. In Norvegia pluit à nubibus beftiola quadrupes magnitudine foricis, pilo vario, Lemner nomen habet. depascitur omnia virentia. consumpto pabulo moriens aerem inficit. unde vertigine & morbo regio corripitur incolæ. Card. & Scalligero attestante testem occulatum vidi. qui ex rupibus procella ablatos in aquâque delapsos ad terram enatare quasi turmatim referebat.

3. Vindicianus celebris & magnus medicus qui temporibus Augustini vixit, à retentis facibus bilem in totum corpus exprimi scripsit; sed bile per obstructionem pori non defluente ad Intestina facies retineri magis verum est.

4. Et crasse, similes cerevisie Gedanens. agitate spumam habent flavam.

I. Ab obstructione meatus bilis.

sæ⁴, & quæcunque ipsi intinguntur luteo colore incipientes. &, priusquam hoc colore universum corpus fuerit perfusum, non raro etiam circa ventriculi regionem gravissimi cum angustia dolores.

Ab obstructione autem morbum regium aperientibus & abstergetibus curare oportet. utiles sunt radices feniculi, petroselini, apij, chelidonij majoris. ex herbis hepatoriū vulgare, cuscutha, centaurium minus, lupuli folia: quandoq; & marabium. quibus si calor adsit, cichorium, oxalis & similia adduntur. sem. conveniūt anisi, amios, nec non cucumeris, cucurbitæ, melonum & similium. quæ licet non calida, aperiendi tamen vim habent.

Ex his decoctum parari potest, cui addendus syr. acet. comp. aut syr. de Bizant. cum aceto^s, aut de cichorio cum rhabarb. si calor adsit. In tali decocto incoquere etiam licet folia fenæ,

5. Qui syr. propter indurata habent vim aperiendi, & incidendi propter acetum.

senæ, agaricum, & nonnihil
 * rhabarb. infundere. Fieri etiam possunt potiones ex aquis destillatis hepatorij vulgaris, cuscutæ, cichorij. in quibus aliquis supradictorum syr. dissolvendus, & nodulus imponendus cum rhabarb. ʒ i. aut ʒ i. β. Infundūt etiam nonnulli in tali julepio * ramentæboris, quæ ad fellis meatum aperiendū conducunt. & talis potio utilis est debilibus & delicatis: sic & gravidis ictero correptis. Potest verò & purgans med. exhiberi ex diaphœnicon, aut diacatholicon, addito diaprunis solut. ut sit med. bilem & pituitam educens. Post usum talium remediorum si urinæ non perturbentur, quod obstructionis permanentis certissimū est signum, exhibendus pulvis lumbricorū terræ cum modico vino, vel solus, vel cum specibus dialaccæ. qui obstructiones fellis à totius suæ substantiæ proprietate solvit, meatus aperit, uri-

6. Turbith etiam convenit pro fortioribus. Rarò sine rhabarb. medemur ictero; quia valde corroborat hepar præterquam quod bilem educat.

7. Quæ non habent magnam vim, sed ob tenuitatem syr. deducunt.

8. Proprietate occulta, nisi ustum sumatur. nam nota qualitas *εὐπύρενη* est. ustura empyreumate acrimoniam, & aliquam aperiendi vim adjicere fortè posset.

9. Quia non tantum co- namque ad concoctionem
lorem exhilarant, sed perducit.

& hepar corroborant.

Post obstructionem so-

10. Præsertim quæ lutam si restat malus facie
pluſculum lupili habet, color; infuso corticum my-
nt Nautica dicta; & robalanorū, præsertim lu-
Brunſvicenſis, quam teorum ex vino emendar
Mum vocant. potest. aut usu myrobala-

11. Quia per sudores norum conditorū. quorum
humores sub cutem la- usu non modo color emen-
tētes expurgantur. Hinc datur, sed à morbo regio
illud fortè Lucilij; Nos huic expositi præſervantur.

esse Arquatos ^{Victus} ^{ratio.} ^{ratio.} ^{ratio.} ^{ratio.}
ſurgamus, ea-

mus, agamus. Ita Hip- nit qualis in ſcirrho, ac ob-
pocr. Ictérico prodeſt ſtructione jecinoris. Om-
laborare, ſudare, panem nia lenti ſucci, omnes etiam
(non mazam, quæ pro- fructus crudi, caſeus, & lac
pter cruditatē obſtruit) improbantur. Vinum con-
edere; bibere vinum al- venit album & tenue, aut
bum non multum; la- tenuiſſima ¹⁰ cereviſia. Mo-
rare caput calida, ſeu deratum exercitium cor-
potius tepida multa; pore ¹¹ jejuno non eſt inuti-
ſomno non multo uti. le, aut balnea his qui illis
Epid. l. 7. Cibos, potus affueverunt.

aperiētes lau-

dat Gal. in

Ictero qui ſine

febri cū gra-

vitatis ſenſu in dextro

hypochondrio eſt. 5. de

loc. aff. c. 7. 12. Quia tantū bilis in habitum non diffun-

ditur ut in obſtructione.

Ex debilitate .a. folliculi
fellis ſi morbus regius ac-
ciderit, alvi excremēta tin-
cta ſunt: urina ſubindē per-
quàm exiguum colorata ¹².

faciei

faciei color ex luteo pallescit, sed minus quā ex morbo regio ab obstructione: adest & nausea, cibi fastidium, corporis pigrities ac tarditas, nec non languor assiduus, citra febrem.

Adversus hunc affectum non est opus multis aperientibus, sed magis roborantibus. quæ & jocinori & fellis folliculo languido prodesse queant, ut sunt diarrhodon, diatrionfantal. & similia elect. vel aromat. rosat. quod ventriculo etiam prodesse potest. Utile verò & subinde levi¹³ aliquo med. alvum expurgare, aut simili enemate eluere.

Cibus sit facilis concoctionis: ut ex carnibus volucrum non¹⁴ palustrium: vel ex carnibus vervecinis. Abstinentum ab omnibus calidis bilem ingenerantibus: qualia ex oleribus eruca, nasturciū, cæpa, allium, & similia: piper etiam, atque hujusmodi aromata non conducunt. Ova im-

13. Nam validiora plus viscera debilitando læderent, quam vacuando prodesse.

14. Palustres enim & succi nō optimi, & difficilis concoctionis esse putantur.

15. *Licet calida minime sint.*

III. Ab inflammatione,

IV. Criticè.
16. *Et Naturam rectè agentem Medicus non impedire, sed jurare, & dirigere debet.*

V. Aveneno.

probantur : quia facile in ventriculo, quem bilis infestat, corrumpuntur¹⁵. Vinum tenue & album confert. tale enim tenues, serofos ac biliosos humores per urinam deducit, quod hoc morbo laborantibus maxime conducit.

Icterus autem ab inflammatione, aut calida nimis jocinoris intemperie, qui citra obstructionem folliculi fellis accidit, & in quo excrementa alvi non albida, sed biliosa apparent; pro affectuum ipsorum ratione curandus, ut ante dictum.

Qui autem critico modo supervenit, curatione non indiget:¹⁶ nam per hunc febres & morbi solvuntur.

Contingit verò & nonnunquam à morfu reptilium, aut à venenis assumptis luteo colore corpus infici. talis autem affectus curandus est remedijs, quæ adversus morsus ferarum, à quibus læsio facta, vel adversus venena conferunt.

Gra-

Gravis autem, diuturnus, Prognosis.

& ut plurimum exitialis regius morbus ex obstructione folliculi fellis senioribus est, qui 60. annos superant. Sic & curatu difficilis, quando corona capitis luteo colore infecta est: magnitudinem enim affectus ostendit, & bilis in habitum corporis redundantis copiam. Diuturnus etiam admodum morbus regius est ex imbecillitate folliculi fellis. Contingit autem non raro ut qui hoc laborant, calculos¹⁸ in ipso folliculo natos habeant, ut apertis mortuorum corporibus sæpe apparet.

17. Quia debilis virtus concoctioni humorum non sufficit.

18. Aut eorundem rudimenta, materia ad calculorum duritiem nondum perducta, ut in Bredanano juvene post frequentia animi deliquia ex Ictero mortuo, corpore ejus dissecto vidimus.

19. Rigor quum fiat ab acri bile partes sensiles pungente, & Expultricem irritante, futura evacuationis signum est: per vomitum, alvi dejectionem, sudorem &c.

Quibus autem in febribus morbus regius ante 7. diem supervenit, malum Hipp. 61. aph. 4. vehementem enim excessum caloris, aut magnam in jecinore inflammationem morbus regius ante 7. superveniens ostendit, atque idcirco malus, nisi cum rigore & cum manifesta aliqua evacuatione fiat. tunc enim

20. Nam Inflammationem, aut insignem hepatis obstructionem designat.

21. Nam os ventriculi, cum quo cordi maxima sympathia est, insigniter affici significat.

22. Magnis, quia magna difficulter feruntur. αφορετοῖς intolerabilibus Cornarius.

non malum, sed prodest: Hipp. lib. 1. epid. exemplum ostendit Heraclidis, cui 6 die accessit morbus regius cum larga sanguinis è naribus eruptione, alvi perturbatione, & per vesican purgatione, qui & profuit. Huc facit quoque quod 4 de diat. in acut. scribitur his verbis: In febris biliosa ante 7. diem cum rigore morbus regius accedens solvit febrem: verum si absque rigore accedat²⁰ perniciosus. rigor autem non fit absque vacuatione. Perniciosus verò ac lethalis morbus regius in febribus ardentibus habetur, quinto die cū²¹ singultu accedens. Hipp. lib. de erisib. Sed si in²² molestis febribus 7. die vel 9. vel 11. vel 14. morbus regius superveniat, bonum; nisi dextrum hypochondrium durum fuerit. alioqui minimè bonum: ut aph. 64. lib. 4. bilis siquidem per universum corpus distributa corporeque luteo colore suffusa.

uso, si adhuc aliqua in joci-
nore restet quæ tumorem,
aut scirrhum facit; conse-
quens est non solum maxi-
mam inflammationē geni-
am, sed & multam bilē in
ocinore cōputruisse, quod
natum est. citra autē duri-
em & jocinoris tumorem
liebus supradictis morbus
egius superveniens, bonus
est: sunt enim isti dies in
quibus bonæ crises fiunt, ac
morborū judicia salutaria.

Lienis affectus.

Le&. II 6. Iulij 25.

Lienis affectus sunt aut
inflammatio, aut cum ob-
structione durities, vel tu-
mor sive magnitudo ejus.

**De Lienis Inflam-
matione.**

[Inflammationem comi-
tatur febris cōtinua, quæ
amen sub noctē & à me-
die vehemētiore est quam
matutino tempore. adest
& in sinistro hypochondrio
dolor cum gravitatis sive
ponderis, & quandoq; fer-
oris alicujus sensu, & tu-
mor durus.

1. Quo tempore Melan-
cholici humores moveri
solent.

2. Duritie non vera, sed
ex tensione producta.

Curatio.

Nascitur lienis inflammatio à sanguine crasso, limoso, ac fæculento: à bilioso aut puriore sanguine vix unquam. A sibi etenim familiariori, ac quo nutritur sanguine, citius ac promptius quam ab alio afficitur.

In hujuscemodi autem inflammatione sanguis etiam detrahendus est, & quidem ex sinistri brachij vena interna, aut ex vena ejusdem manus, quæ juxta minorem est digitum. & si una vice non satis visum fuerit detractum; reiteranda erit sanguinis missio. Post sanguinis missionem exhibenda erunt, quæ per alvum purgent: initio quidem leviora, ut ex fol. senæ & epithymo composita, & quandoq; addito agerico, quæ infundi aut macerari possunt in aquis destillatis; aut, quod longe præstat, coqui simul cum rad. & herb. non vehementer calfacientibus, quæ spleni conducunt; ut sunt rad. fœniculi, polypodij, fumus terræ, cuscuta, scola-

3. *Crassior tamen sanguis commodius ex brachio educitur. quin & vena quæ in manu secatur alterius venæ ramus est, Cephalica nempe.*

4. *Quia cruda adhuc materia, minorativæ dictæ purgationes tantum conveniunt. Validiores enim movendo vim afferunt, nec tamen peccantem humorem amoveant.*

5. *Nam tam qua Purgat; pituitam nempe hic non peccantem; quam quod insignem aperienti vim habet.*

scolopendrium quod cæte-
rach Offic. appellant, ca-
pillus veneris aut ruta mu-
raria, borago, buglossum:
quibus etiam cichoriū, oxa-
lidem aut similes addere
utile erit, si febris vehemē-
tior fuerit. Levioris verò
purgationis loco & dia-
cathol. exhiberi potest per
se, vel addito pulvere fol.
senæ, vel cum tali, quale
jam dictum est, rad. ac her-
barum decocto. Processu
verò temporis posteaquam
concoctionis signa appa-
ruerint, validiora erūt med.
exhibenda: poterunt tunc
cortices rad. capp. hepa-
tor. vulg. chamædrys, su-
pradietis addi, & veratrum
nigrum quoque admisceri,
aut confect. Hamech. At-
que hujuscemodi purgatio-
nes sæpius dandæ: nam
quum lien per vias urinæ
expurgari nequeat, fre-
quentius per alvum expur-
gari debet: ut Gal. 13.
meth. scriptum reliquit.

Intermedijs autem tem-
poribus, & præsertim prius

6. *Alij dant etiam cas-
siam, quam tamen non
laudo; quod status ex-
citet.*

7. *Nam gradus pur-
gantium concoctionis
gradui proportionatis
esse debet.*

8. *Emulgentes enim d
Cava; Splenica vena d
Porta originem ducunt.*

quam validiores purgationes sint exhibendæ, offerenda sunt quæ humores præparare & inflammationis fervorē remittere queant quale est decoctum ex radicibus & herbis supradictis, in quo dissolvendus syr. aceto compos. aut oxymeli compos. aut syr. de succo fennicæ terræ, quibus addendus syr. ex cichor. si febris vehementior.

9. Quorum calor non usque adeo metuendus, quod sanguis qui in, & circa lienem reperitur feculentus, ideoque minus calidus sit.

Profunt verò & in huius visceris inflammatione fomentus, aut unctiones ex ol. chamæmelino, aut anethino, aut utrisque addito ol. rosaceo, aut si calor non obstet ol. absinthij: ut videlicet relaxantibus adsint astringentia visceris robur conservantia. neque enim lien non minus quam jecur solis relaxantibus curari debet: ut Gal. loco jam dicto. additur verò nonnihil vini albi, aut aceti ut oleorum vis ad lienem facilius deducatur. Potest verò & ol. loco cataplasma imponi ex rad. althææ decoctis & farina

ina hordei, sem. lini, ac seminis fœnugræci cum exigua quantitate flor. chamæmeli & rosar. rubrar. quæ cum aqua decoctionis rad. decoquenda addito postea ol. rosaceo, aut de absinthio, nisi calor obster.

Victus ratio ferè qualis *Victus ratio,*

in inflammatione jocinoris : non tamen usque adeo tenuis, nam morbus longior est : minus etiam frigida esse debet. minus enim calet causa inflammationis. Vinum album & tenue sedata nonnihil inflammatione, negari non debet. cappare¹⁰ cum cibis laudantur. Abstinent dum ab omnibus quæ in quartanæ curatione fugienda esse dictum est.

10. Quia obstructions tollunt, quæ cum hac inflammatione conjunguntur.

Inflammationi autem lie- *Prognosis.*

nis hæmorrhoidum fluxus

supervenienti, utilis est : ut

fatis ostendit Hipp. aph. 11.

6. lib. ubi ait, hæmorrhoides melancholicis super-

venire, bonum : expurgan-

tur siquidem per has hu-

mores crassi ac melanco-

11. Per quem sanguis crassus & fervidus evacuari solet.

lici: quales in lienis inflammatione, & in scirrhotumore non minus expurgari & evacuari conducunt quam in appellata melancholia.

1. *Coniunguntur hæc, quia venæ hic, non affecta substantia, vix tali modo affici possunt.*

Qui autem indurata Splenis affectione laborant, Splenici dicuntur. Alicubi ut in Caumo Lienosi gignuntur. Pel-la itidem multos Splenicos habuit.

2. *Iam quasi Zona liene cinctus ambulo (Lien tumibo circumligat Ilia vinclo) Geminos in ventre habere videor filios Plaut. in Curcul. Hinc τέλειοι σπληνίγῃ, nec olfacere, h. e. anhelitum ad olfaciendum profundum ducere, nec ridere, nec sternutare possunt. Horus.*

3. *Propter obstructions, quod crassum, & tingens est, discernentes.* 4. *Quartana: in qua die præcedente febrem sunt crude, sequentibus sunt colorate, crasse, turbate.*

Curatio

De Lienis & Scirrhi & Obstructione.

Quando lien durior factus est, tunc scirrhus laborare dicitur. Indurecit autem ab humore crasso, viscido & melancholico: quando videlicet a huiusmodi humore meatus ejus ac pori obstruuntur & substantia impletur. Ad hoc tunc in sinistro hypochondrio gravitatis quidam sensus, & si non obstat abdominis crassities, etiam manu durities lienis sentire potest.

Urinæ frequenter admodum tenues & diluti coloris: nisi adsit febris.

Curatio autem scirrhi
 lienis per ea fit, quæ cras-
 sos humores diffecare &
 obstructa aperire queant:
 qualia sunt ad jocinoris
 scyrrhū, & obstructionem
 utilia: quibus tamen tanto
 valētiora lieni esse debent,
 quanto crassiore utitur ali-
 mento: ut Gal. meth. 13.
 Præter ea ergo quæ adver-
 sus jocinoris obstructiones
 prosunt, ad lienis scyrrhum
 conducunt cort. rad. cap-
 parum, cortic. rad. mori ar-
 boris, cortices tamaricis,
 chamædrys, hepatorium
 vulgare, thymus, epithy-
 mum, scolopendrium, hæ-
 mionitis, phyllitis, sem. vi-
 tici seu agni casti, sem. ru-
 tæ. Ex compos. syr. de
 epithymo, aut aliquis ex su-
 pradictis componendus:
 dialacca, diacurcuma; &
 inter purgantia diasena,
 confect. hamech. pill. de
 hiera cum agarico præfer-
 rim addito ammoniaco,
 pill. de serapino, pill. ag-
 gregat. Confert verò &
 aquæ ferratæ 7 frequens

5. Medetur lienibus
 Teucrium: constat sic
 inventam: quum extra
 super eam projecta es-
 sent, adhæsisse lieni,
 eumq; exinanisse, ob id
 à quibusdam Splenium
 vocatur. Plin. l. 25. c. 5.

6. Asini splenis tumo-
 rem, Asplenon edentes,
 finiunt.

7. Seu spontè tales pro-
 rumpan & naturales
 sint, ut aquæ Spadanæ;
 seu arte parentur.

N n 3

3. *Alia enim viscera nequaquam inflāmant, quum regioni Lienis, reliquis partibus intactis, admoveri possint.*

9. *Quod magis emollit quam oleum commune.*

continusque usus. Atque hujuscemodi remedijs : & quaecunque ex ipsis confici possunt uti licebit quando febris quartana non obstat : cujus prima ac potior ratio habenda est. Externis autem remedijs, etiam perseverante quartana², ut licet : ut unctio ex ol. capp. liliorum, rutaceo, vel illo rutaceo quod ex ol. seminis lini³ paratum est, de quo in jecinoris scirrho. Vel empl. aliquod lienis regioni imponendum : veluti ex ammoniaco, vel empl. de meliloto per se, vel cum empl. de mucilag. permixto.

Victus ratio qualis in obstructione jecinoris observari debet : paulo tamen calidior : aut qualis in quartanis. Capparorum in cibo usus utilis est : Hipp. verò & raphanidis rad. crudam, & apium in aceto intincta edenda consulit : quorum loco nasturtio, aut dracone herba uti non fuerit absurdum.

De

De Magnis Lienibus.

Magni lienes ab Hippocr. dicuntur, qui præter quod multo crasso ac melancholico sanguine obstructi repletique sint, etiam tumidi & valde distenti facti sunt: ex copia videlicet affluentis crassi humoris, quo gravati tandem etiam sphacelo corripiuntur.

Manifestior autem lienis magnitudo, quam scirrhus: nam tumor etiam foris quandoque prominet, & tactu facilius quam scirrhus deprehendi potest: color faciei lividus ac, ut Hipp. aut molybdoïdes, sive plumbi colore: & quandoque idem ait, partes sub oculis attolluntur. Consequuntur autem magnos lienes vel sanguinis per vomitum eruptiones, vel oris & gingivarum graveolentia cum livoribus aut ulceribus: tibiæ, ut in lib. prorrh. Hipp. ostendit.

1. *Non duri nisi valde distendatur à nimia multitudine. Et in isto à Scirrhis lienibus differunt.*

2. *In scirrho plerumque lien non sit manifesto major, sed quandoque etiam minor.*

3. *Ut plurimum in tibijs: quandoque tamen in alijs etiam partibus.*

N n 4

4. Quia humores delati ad cutem in talibus, permixti sunt bili. Libro de affectionibus idem dicit. part. 19.

3. Idque non malè: nam vidi mortuum ex hoc morbo, cui maximus dolor in ventre aderat. R. D.

6. Vel Scorbucum, quasi ventrem lacerans, seu ut Olaus interpretatur, saucians.

7. Crassum enim succum gignūt: præsertim brassica & atriplex.

Ulcera autem. his fiunt qui biliosi sunt & temperamento ut Hipp. lib. de internis affect. ait: Quicunque, inquit, splenem habent magnum siquidem biliosi sunt, hi mali coloris sunt & malis ulceribus scament.

Quomodo autem curandi sint quibus sanguis per vomitum eruperit, dictum ubi de sanguinis vomitu.

Oris graveolentiam cum tiliarum ulceribus aut livoribus Hipp. ileam appellat hæmatitem, sive volvulum sanguineum: recentior ætas Scorbutum: & ex prava victus ratione, atque ex frumento; & maxime secali corrupto, originem hunc habere censeo. Hipp. verò & ab oleorum usu fieri: & ab aquæ potu lib. de internis affectionibus scribit. In lib. de aëre, aquis, & locis, bibentibus aquam palustrem ac stagnantem splenes ait fieri magnos.

Curatio

Curatio hujus affectus Lea. 118. Iunij 28.

usu aliquot herbarum fit: ut
 1. nasturtiū aquatile, co-
 2. chlearia, nasturtium hor-
 3. ense, & vulgo dicta beca-
 4. unga, quæ tamen reliquis
 5. est minus potens⁸. harum
 6. minus, vel plurium⁹ deco-
 7. ctum ex lacte¹⁰, vino, aut
 8. sero lactis pro tenuioribus
 9. singulis diebus bis tervè
 10. haustum, conducit. sic &
 11. succus earundem cum sero
 12. aut lacte propinatus. fiunt
 13. ex ipsis & conservæ. quæ
 14. hyberno tempore, quum vi-
 15. rentes herbæ haberi ne-
 16. queunt, propinantur. Con-
 17. ducit. quoque easdem her-
 18. bas cum absinthio coqui:
 19. & absinthium¹¹ vulgare,
 20. præsertim in ipsius initio
 21. quovis modo exhibitum, in
 22. progressu etiam alijs utili-
 23. ter admiscetur.

8. Commendatur ra-
 phanus major; succus li-
 monum, atque arantio-
 rum. Utuntur plebei Sedo
 minimo: verum ejus usus
 non admodum tutus est.

9. Quædam tamen co-
 ctione vim suam amit-
 tunt, ut raphanus ma-
 jor, cochlearia &c. Ille
 itaque liquorib. potius
 immacerandus: hujus
 succus expressus iisdem
 immiscendus. quamvis in
 delicatiorib. etiam sola
 ejusdē maceratione con-
 tenti esse possimus.

10. Ditiore pro his vino
 Gallico albo utuntur.
 Lac minus probatur
 propter cascotas partes,
 quæ obstructions, nisi
 separentur, augere pos-
 sent.

Exhibenda præter hæc
 purgantia medicamenta,
 quæ crassos faculentos &
 & corroboret. 11. Quod Romano, seu
 Pōtico dicto, idēd præ-
 stat; quod non solū ape-
 riat, & detergeat, sed
 12. Validè purgantia qui Scorbucō la-
 borant, non ferunt: quod cor affectum, vitalemq; facul-
 tatem debilem habeant.

N n 5

melancholicos humores ex
purgant: veluti compositum
ex folijs senæ, epithymæ
addito veratro nigro si ne-
cessitas postulat. quibus
conf. Hamech admisce-
re utile erit. qualia purganti-
non modo in principio, se-
& in progressu ac interme-
dijs temporibus etiam ex-
hibere expedit.

Providendū ori est col-
lutionibus. quæ cōponen-
dæ sunt partim ex ijs quæ
calfaciūt, partim quæ astrin-
gunt, & partim abstergent
ut ex rosmarino, salvia, thy-
mo, hyssopo & similibus, in
aqua decoctis: quibus ad-
dendum aliquid aluminis:
deinde addendum mel
rosaceum vel aliud repur-
gatum: adduntur gallulæ
seu nuces cupressi, vel cor-
tices malorum granato-
rum: deinde & cubebæ.

Livoribus ¹⁴ in cruribus
aut alijs corporis partibus
apparentibus, non opus est
remedia adhibere. cito
enim quotidiano usu su-
pradiet. herbarum evanes-
cunt.

13. Sunt qui & Ægy-
ptiacū immisceant. cu-
jus tamen usus nisi in
magna necessitate, pro-
bandus non est.

14. Quando scilicet li-
vores tantūmodo sunt.
testantur enim Expul-
tricis rigore crassiorem
materie partem ad ex-
tremas partes à nobi-
lioribus, propulsam.

cunt. sunt tamen qui velint
has partes foveri decocto
baccarum juniperi, absin-
thij, nasturtij aquatilis, &
flor. chamæmeli: aut inun-
gi ung. compos. ex butyro
insulso, juniperi baccis, &
vino albo decoctis. Ulcera
si quæ facta fuerint, pro
conditione curanda sunt.

15. *Advertendum ne
Gangrena succedat, ut
aliquando in majoribus
fieri solet.*

16. *Quod minus ex-
crementitiū alimentum
præbeant.*

Victus ratio sit ex opti-
mis carnibus: citius volu-
crum ¹⁶ non palustrium
quam aliorum animalium:
panis quoque ex optimo
tritico, aut alio bono, co-
cto & fermentato. Vinum
album & tenue convenit.
abstinendum ab oleribus,
præsertim atriplice & bras-
sicis: tum & à piscibus præ-
sertim stagnorū, aut litto-
ralibus, tum & ijs qui circa
fluviorum ostia versantur:
tum & omnibus impensè
dulcibus ¹⁷, caricis, uvis
passis, vino dulci crasso.

17. *Quod obstructions
facere, vel augere so-
leant.*

Exercitium validum ¹⁸ con-
venit si fieri potest: nam
ut Hippocr. ait: Curatio
hujus lienis affectus phar-
macis, edulij, & laboribus

18. *Μόλυσσις namque,
sive cruditas proxima
hujus morbi causa. exer-
citiū autem concoquen-
tem calorem exsuscitat.*

perficitur. Conveniunt l
bores & exercitia maxime
ijs, qui sunt natura pituitosa
minimè qui natura biliosa
ut in lib. de affect. scribit.

Prognosis.

19. Propter causâ pec-
cantis crassitiem & im-
mobilitatem.

20. Et sic quidem ut de-
repentè concidant men-
sæ adsidentes, aut aliud
quid agentes. quod in
Yslandia sæpius contin-
gere oculati testes, fide-
que digni narrarunt.

Diuturna est affectio
& morbus est qui multum
curatione habet opus: quod
nisi pharmacorū usu, & bona
victus ratione emer-
detur, lethalis. Quibus
dam verò & in hydropem
trāsīt: maximè post sangui-
nis vomitiones, ut etiā di-
ctum ubi de sang. vomitu

De Cachexia.

1. Est inter alia &
corporis illas designat
partes, quæ exterius cō-
spiciuntur: Habitū cor-
poris interpretari so-
lent. hujus vitiata con-
stitutio, Cachexia dici-
tur: quæ ab Anasarca
gradu magis, quam spe-
cie differt.

2. Quod crudi, serosiq;
humores os ventriculi

laxent. 3. Pulmone propter raram suam κατὰ σκελὴν,
ichorib. quasi turgente.

HYdropem & præcipue
hypofarcam præcedit
Cachexia, sive mala cor-
poris valetudo: nam dispo-
sitio est, ut ait Avicenna,
hydropem antecedens.

Apparet in hac facies
pallidior, corpus solito al-
bidius, caro mollior senti-
tur, adest frequenter cibi
fastidium, respiratio dif-

ficilior,

facilior, vires debiles: pedes
frequenter sub vesperam
intumescunt: per alvum
quandoque & cruda des-
cendunt: urinæ etiam cru-
ditatis notas habent.

4. Sero pondere suo,
dum erectū habet æger,
ad declivia vergente.

Sequitur autem cache-
xia jecinoris imbecillita-
tem; quando propter ejus
intemperiem frigidam, san-
guis probè & perfectè ge-
nerari nequit: sed frigi-
dior, serosior, ac pituitosior
in venis colligitur: qui per
universum corpus distri-
buitur, quum ad ipsius ali-
mentum sit parum idoneus,
illud mollius, laxius, ac pal-
lidius reddit. Post longio-
res morbos: veluti dysen-
terias, lienterias, diurnas
febres cachexiam sequi
contingit: sic etiam non
rarò post immodicas san-
guinis profusiones super-
venit.

5. Qui humidum radi-
cale, caloremque nati-
vum, minuunt.

Curatio per calfacientia
& resiccantia fieri debet,
veluti in imbecillitate jeci-
noris quæ à causa frigida.
Tantò autem calidiora hu-
jus remedia esse debent

Curatio.

6. *Hæc compos. ventriculi, & Intestinorum ex frig. intemperie, humidaque debilitati specialiter dicata est, ut & Diatrionpipereon.*

7. *Si hypochondrium propter obstructions, aut flatus tensum sit: nam rhabarb. tantum non habet, ut purgare ullo modo possit.*

8. *Vel agarico in vino infuso, aut Mexicana radice.*

9. *Nam fibræ viscerum etiam sine istis ab aquea pituita satis laxata sunt.*

10. *Quod siccus nutrimentum habeant.*

11. *Quod alimē tali succo minus circumfluant.*

12. *Medicorū consilium secutus, Paulam ē febris curatam monui, ut vinum biberet, ne in hydropem abiret. Hieronym. in epitaph. Paulæ ad Eustoch.*

quantò hepar magis refrigeratum est, & morbus diuturnior. ⁶Diagalanga diacalamentum, vel etiam diatrionpiper. &, si alvum ⁷durior, dialacca, utiles a cachexiam compositione sunt. Purgantibus med. citra necessitatem non est utendum: & si quādo opus fuerit non nisi leviora danda: veluti ⁸vinum infusionis fol. senæ, vel vinum infusionis rhabarb. A laxantibus abstinentiū, ut manna, cassia, syr. de infusione rosarum.

Victus rationem cal. & siccam esse convenit: à jure rulentis quantum fieri potest, abstinendum: utendum ¹⁰affis. cibi condiendi sunt aromatis; ut pipere, zinzibere & similibus, vel herbis calidis, iisque aridis potius quam virentibus ¹¹, ut origano, hyssopo, thymo, rosmarino, satureia & similibus. Vinum ¹²convenit album, tenue, sed generosum. Oportet in cibo & potu parcum esse: nam, ut Hipp. ait: Carnes ha-

ben-

bentibus humiditas famem
adhibere convenit. fames
etenim corpora siccant. qui-
bus verbis non solum cibi
parcimoniam, sed & potus
indicitur. quum enim cor-
pus per famem resiccandum,
potus maximè vitandus.
hic citius ac promptius
corpus implet ac hume-
stat quam cibus, ut testatur
lipp. Facilius est, potu im-
pleri quam cibus.

Valde conducunt labo-
res & exercitia, præser-
tim jejuno corpore facta.
Conveniunt etiam balnea,
præsertim, ut Paulus Ægi-
meta ait, aluminosa, sulphu-
rea, nitrosa. Conveniunt ea-
dem de causa & alia resic-
candi vim habentia: ut est
alveum in aqua marina cali-
da, quod à multis com-
mendatur.

Cachexia magnitudine ab
yposarca differt. quia initiū
yposarces est Cachexia.

De Hyposarca.

Cachexia si diu consi-
stat in hyposarcam ut

13. Nam serum redun-
dans sensibiliter, atque
insensibiliter, exbau-
riunt.

1. Dicitur σαρκίτης,
ὑποσαρκίτης, ὑπο-
σάρκα, Ἀνασάρκα, vel
potius, Ἀνά σάρκα, vi-
delicet ὑδρωψ. quo po-
stremo vocabulo disper-
sio aquosi feri per carnis
poros optimè videtur
exprimi.

2. Tum propter suffusum
 Φλέγμα λευκόν; tū pro-
 pter emortuū quasi ca-
 lidum nativum. Hinc il-
 lud; Aquosus albo cor-
 pore languor. Atque il-
 lud. Turgidus hic epu-
 lis, atque albo ventre la-
 ratur.

3. Quia collecti sunt hu-
 mores non, ut in ascite
 intra peritonæum, sed
 extra illud intra cutem.

4. Et ante illum autor
 libri cui titulus, Medi-
 cus, c. de humoribus.

5. Cap. 6.

plurimum transit. in hac
 cies, crura, pedes, brachia
 ac universum corpus
 met, pallidum & ac vel
 emortuum apparet. impr
 forum digitorum, vel al
 rius rei vestigia diutinè
 tinet. tumet verò & ve
 ter, sed multo quam in
 cite, minus: & ab aquo
 frigido humore per unive
 sum corpus diffuso origi-
 nem habet. unde & Hypo-
 sarca dicitur. quod videt
 cet sub carne, vel juxta ca-
 nē humor iste contineatur
 Appellatur verò & Leuco-
 phlegmatia ab ipso albid
 pituitoso humore. humo
 autem iste partim à jocinc
 re malè affecto in habitur
 corporis differtur, partim
 ex ipsa carne veluti i
 aquam resoluta emanat, u
 Paulus ait 4. Afficitur au-
 tem jecur quandoque pe
 se & primario: quandoqu
 verò per cōsensum. prima-
 rio & per se afficitur, quan-
 do intemperie frigida labo-
 rat: tunc enim ut Gal. 5. de
 loc. aff. 5 qui in corporis
 partes

partes succus distribuitur in
 sanguinem transmutari non
 potest. & refrigeratur quo-
 que corporis venæ, idq; ma-
 ximè quum nullo in joci-
 nore tumore apparente la-
 borans hydropè molestari
 videtur. Per consensum ve-
 rò quando per lienis cau-
 sam, vel ventriculi, vel in-
 testinorum, mesaraicæ ve-
 næ hæctica .i. confirmata
 intemperie frigida laborant;
 aut quando vel pulmonis,
 vel septi transversî, vel re-
 num occasione venæ quæ
 in jocinoris gibba parte
 eodem afficiuntur modo.
 Quibus verbis Gal. osten-
 dit se omnis hydropis cau-
 sam in jocinoris refrigerationem
 conjicere: quod
 quidem in hyposarca veri-
 tatem habere potest, sed
 non in ascite, aut tympani-
 te: quorum causæ aliæ sunt,
 ut suo loco dicetur.

Refrigerari verò & per
 consensum jecur Gal. sen-
 tit, quando plurimus san-
 guis per hæmorrhoides ex-
 cernitur, aut ob muliebri

6. Et merito neque enim
 αἱματωπίνης lædi po-
 test; nisi affecta illa par-
 te, quæ Sanguificationis
 officina existit: nec di-
 minute coctus sanguis,
 nisi ob refrigeratum ca-
 lorem concoquentē. Ita-
 que causa proxima om-
 nis Hydropis frigida
 est; Antecedens in As-
 cite etiam calida esse
 potest.



7. Μεγάλη διάφεσις, h.e. vehemens, & confirmata in utero præter naturam cōstitutio primò illius, mox & aliarum partium, præsertim Hepatis, cui ob magnitudinem venarum consentit, calorem naturalem aut dissipat, aut suffocat; ideoque refrigerat.

8. Intempestiva sanguinis missio in alijs periculosa; in Hydrope etiam interdum mortem inducit. Mittendus igitur ante alia præsidia, præsertim validiora, in quibus maxima obstructio, inflammatio schirrosa, cū validis viribus. Alex. Trallian.

profluvium, aut quando continentur menses, aut propter aliam ingentem uterine dispositionem. Hipp. venarum & hæmorrhoidum suppressionem hydropis causam esse posse aph. 12.6. ostendit. Et revera quidem per huiusmodi sanguinis vacuationes jecur & debilitatur redditur, & insigniter refrigeratur, succedente non raro hyposarca, si modò lien nullo affectu laboraret. Propter mensium verò retentionem, aut hæmorrhoidum suppressionem rarius hyposarca, frequentius accites succedit. Sanguis siquidem retentus ad lienem refluxitans hunc obstruit & tumorem in eo excitat.

Sanguinis missio auctoritate Gal. interdum utilis est, in hyposarca quidem quæ propter hæmorrhoides aut menstruas suppressas purgationes acciderit, si adsint redundantis sanguinis & plenitudinis signa. & mox initio ipsius mali fiat. quando videlicet non nisi cachexia

Chexiæ adhuc signa appa-
rent. tunc enim sanguinem
detrahere expedit. sed ta-
men non multum una vice,
tutius enim est sanguinis
missione reitere, & quod
gravat paulatim detrahere.
lic enim nec vires valde
dejiciuntur, nec jecur ni-
mium refrigeratur. Quan-
do verò ab aliqua occasio-
ne alia hypofarca successerit,
à sanguinis missione erit
abstinendum; non minus
quam in ascite aut in tym-
panite. quos affectus nullus
per sanguinis missione fa-
nare est ausus, ut Gal. ait.
Med. purgantia in Hypo-
farca ex quacunque occa-
sione facta fuerit, exhiben-
da sunt: non tamen admo-
dum vehementia. & quæ
simul jocinoris intempe-
riæ frig. corrigere queant,
ut el. diaphœn. elect. In-
dū, species diaturbith cum
rhabarbaro; aucta nonnun-
quam tamen ipsius rhabar-
bari quantitate.

Quod si verò & in ven-
tre humores aquosi col-

9. *Propter virtutem ex
Alimenti vitio, debili-
tatem insignem.*

10. *Species enim hydro-
pis plerumque compli-
cant; ut in puella cujus
cute & musculis dissectis
multum quidem, sed se-
ctione penetrante in ab-
domen, integræ urnæ
humoris aquosi proflue-
bant.*

002

11. *Assyrius adolescens Apollinem curationem hydropis efflagitans ab illo ad Apollonium missus est. is illi dixit; Apollo sanitatem tibi pollicetur, sed non dat: volentibus enim tantū illā tribuere solet. tu autē omnia facis quæ morbo penitus adversantur delitijs enim abundas, perpotationibus indulges; & madentibus ac penè corruptis intestinis cibum veluti lutum ingeris. Hac monitione ipsum ad sanitatem reduxit. Apollonius apud Philostratum.*

1. *Ασцитες non utrem tantū, sed & corpus hominis vel mortui, vel vivi significat; præsertim ipsum Abdomen, seu ven-*

lecti fuerint diacartharū utiliter dabitur, aut alijs a miscebitur. à fortioribus hydragogis abstinendum ex elect. conveniunt diacurcuma & dialacca, quæ vim habent aperiendi & resiccandi: quibus & facilius vini arida admisceri poterit: quæ in cachexia & hydropsarca valde utilis est. Commendatur & absinthij usus: præter enim quod calfacit & jecur & lienero roborat.

Victus rationem siccarum & calidam esse oportet, veluti in cachexia: cibi & potus maximè potus parcimoniosus valdè conducit: sudores, labores, & exercitia multum conveniunt: & quæcunque excalfacere & resiccare universum corpus queant.

De Ascite.

A Scites hydropis illius species dicitur, in qua venter utris alicujus instar totus distenditur & aquoso humore cum subjectis uteritur.

pluri-

plurimum partibus impletur, superiores verò extenuantur & contabescunt.

Colligitur autem aquosus iste humor in ventre intra peritonæum & intestina reliquaque viscera. Causa non est aliqua jocinoris intemperies, neq; tumor aut exulceratio ejusdem; nisi forte durities aliqua: in

2. Vide Gal. 2. de facul. natural. c. 8. ubi Erasistratū Sirrhum jecoris unicam Hydropis causam statuentem impræhendit.

gibba ejus parte, & tanta quidem ut impediat humores ad cavam venam deferri, sic ut regurgitantes per mesaraïcas venas in ventris cavitatem incidant: veluti contigisse videtur Bello Armato, cujus Vesalius meminit; in cujus tamen ventrem non aquosi humores, sed sanguis confluxerat, eò loci quò aquosus humor in asciticis colligi solet: ut Vesal. latius refert in lib. de Chyna. & atque idcirco solus jocinoris affectus ad ascitis generationem non videtur sufficere: nisi simul lien male quoque affectus ac tumi-

3. Vidi quorum jocinora erant sphacelo corrupta, alios quorum ulcerata, qui tamē nunquam hydropici: nullius tamen corpus ascitici apertum cujus lien non tumidus & magnus R.D.

4. Gal. sæpè liene ad-
modum schirrhoso, hy-
dropè non subsequente,
vidisse se testatur. •
Præfag. expulsib. c. 9.

5. Emulgentes enim ex
Cava, Splenicæ ex Por-
ta Vena originē ducunt.

us magnusque redditus
sit. qui etiam solus & ad a-
citis generationem & aqua
intra peritonæum colle-
ctionem sufficere potest
nam quum lien rarus, mol-
lis, ac spongiosus sit ben-
quidem & secundum natu-
ram sese habens melancho-
licos humores ad se per-
trahit. hoc enim ejus effi-
cium Gal. testatur 6.
de loc. aff. malè verò affe-
ctus etiam crassiorē san-
guinem initio attrahit: per
quem mole auctus mag-
nusque factus, non solum san-
guinem, sed & serosos hu-
mores attrahit: ut ex Hipp.
lib. de morbis muliebr. &
ex alijs ejus locis cognosci
potest. Quum autem nulla
ex liene sit via, per quam
humores isti attracti ad re-
nes pervenire, aut demitti
queant; ut etiam Gal. testa-
tur, nec in liene contineri
possint, necessario in vētris
cavitatem incidunt eum-
que utris modo distendunt,
inferioresque partes im-
plentes tumidas eas red-
dunt

dunt: crura videlicet, & scrotum in viris.

Ad curationem autem *Curatio.*

ascitis non parum refert qualis affectus ⁶ præcesserit: nam qui post acutas febres, & præsertim post regium successit morbum; aliter curari debet, quam longioribus febribus, aut diuturnis lienis morbis superveniens.

Ascites igitur qui febribus successit diutinis, veluti tertianis impuris; initio ubi jam febris desijt, una aut altera exhibitione diacarthami subinde curatur: si intermedio tempore & post purgationem dialacca, vel simile aliquod med. exhibeatur; observata bona victus ratione, ut in cachexiæ curatione, dictum. Profuit & multis hujusmodi conditum. & Confer. rosmarini, conf. major anæ ana \mathfrak{z} 1. spec. ⁷ dialaccæ \mathfrak{z} β . aut ejus loco diaturbith Mes. vel utriusque ana \mathfrak{z} 2. tartari⁸ sive facis vini albi \mathfrak{z} β . quæ si usta

6. Raro enim non præcedente alio affectu supervenit.

1. Ascites quæ post longas febres curatio.

7. Cujus loco utimur diacurcuma, si non haberi queat. extat autem compos. apud Gal. $\alpha\tau\pi$. 8. Mirabilis Pharnacis Rhizotomi ex Andromacho descripta eadem ferè ingredientia, quæ & Diacurcuma, habens.

8. Detergendo laxat alvum, obstructions tollit, atque Intestina fovit.

* Quæ initio, & quum vires adhuc constant cū utilitate dantur: Eleborū frustra quum jam cutis agra pascentes videas: Venienti occurrere morbo. Quam quidē monitionem, sed nō & Elebori probamus usum.

2. Quia valde calida, nocet jecori & visceribus interioribus.

10. Succus concretus qui ex India nuper affertur cœpit, quem Gettagemu appellant, & per excellentiam Hydragogus dici non immeritò posset, à g. x. ad xv. datus aquas meracas citra Violentiam, ducit. Exhibetur autem vel per se, addito cordiali aliquo, ut cinnamomo; aut cum alijs elect. vel pilulis.

fuerit efficaciorē reddere compositionem: cum sy de Bizant. hæc miscentur datur singulis diebus mane instar nucis, aut 3 ponderis. Aperit istud conditum obstructions lienis ac jecinoris, & aquosos humores paulatim resiccant.

Post quartanas autem, & post diuturnos lienis affectus si ascites sequatur, non modo quæ dicta sunt; sed frequenter etiam validiora requiruntur * medicam. si itaque supradicta non suffecerint, poterit ad expurgationem aquosi humoris dari succi iridis postquam resederit 3 β. aut 3 6. cum æquali quantitate feri lactis, aut cum aqua cichorij, aut simili aliqua alia; ut videlicet calida ejus vis nonnihil reprimatur, ac contēperetur. Vtiles etiam sunt 10 pill. de mezereo Mesuæ: quibus si addatur succus gratiolæ resiccatus, efficaciores reddentur.

Sunt verò & alia hydrago-

ga ut ebuli, bryoniæ radix,
 interior virēs sambuci cor-
 tex, brassica marina ʒ sol-
 lanella dicta, laureola, thy-
 melæa, chamælæa, succus
 cucumeris silvestris qui re-
 siccat elaterium dicitur.
 Omnia autē hæc valde ve-
 hementia sunt, & cum mo-
 lestia magna purgant; præ-
 sertim si nō fuerint præpa-
 rata, aut aromata, vel alia
 nō fuerint addita, quæ ipso-
 rum malignitatē reprimant,
 atq; aliquo corrigant mo-
 do. Quibus autem hujusce-
 modi validiora displicent,
 aut vires ad sumenda non
 sufficiūt, illis quod sequitur
 exhiberi potest. Sem. sam-
 buci aut ebuli in aceto ma-
 cerati, tartari vini albi, ana
 ʒ i. sem. anisi ʒ i. aut 2. ʒ f.
 pulvis ex quo singulis die-
 bus. ʒ i. aut i β. detur cum
 modico vino: paulatim
 pulvis iste purgat, & aquo-
 sos humores absque mole-
 stia deducit.

Admovenda verò & to- Topica.
 pica quædam ventri sunt:
 veluti fomenta ex milio aut

11. Decoquitur in jure
 carnis, vel succi ejus ex-
 hibetur. perturbat ta-
 men corpus. quod etiam
 Dioscorid. scripsit.

12. Elaterium apud nos
 cōfectum plerunq; inef-
 ficax. Itaque caven-
 dum ne si id minori dosi
 exhibeatur, nihil; sin
 majori, & exoticum
 rectē factum indatur
 medicamentis, nimis
 agat.

13. Potest etiam simul
 addi aliquid cinamomi;
 & sacchari, quibus id
 placet.

14. Quod etiam Aët. malto¹⁴, aut ex sem. cy
commendat . nominat ni, lauri baccis, florib. c
autem binem. mæmeli, anethi confusi

in sacculo cōsutis ; qui re
vini madefactus ventri
imponendus. Vel cataph
admovendū ex farina ho
dei, aut potius malti, cu
stercore capræ aut vacc

15. Ad imitationē He-¹⁵ vel utriusque in lixivio
racliti, qui stercore seu
fimo vaccino oblitum
abdomen solis radijs
objecit, & imbre sereni-
tatem fecit. h.e. cura-
tus est. nerum quercus decoct

16. Opobalsami loco su-
minimus ol. laurinum, aut
styrac. liquidam. addito sem. cymini, sulph
re quibus odor non est m
lestus, & oleo rutaceo, la
rino & liliorum. Potest d
empl. Aristarchi¹⁶ cujus d
scriptio apud Mesuem ef
exhiberi. nec inutile e
empl. de meliloto. Ven

17. Vel aliquid Vng. de
arthanita misceatur,
aquis enim ventrem sus-
flantes, distendentesq;
proturbat. gi etiam conducit ol. ruta
ceo, laurino, & liliorū; præ
fertim si non nihil¹⁷ colo
cynthidis cum aqua vita
ipsis fuerit incoctum.

I I. Post arden-
tem febrem vel
iæterum.

Victus ratio veluti in
Cachexia convenit.

Quando verò Ascites
post febrē aliquam arden-
tem, aut post regium sequi-
tur morbū, remanente ad-
huc in sanguine ac venis in-
tem-

emperie cal. & febrili quodam calore, ut frequentissime accidit, quæadmodum Gal. testatur fieri 6. de loc. aff. tunc nullum ex supradictis convenit, neque etiam ullum forte hydragogum est exhibendum, utendum est ijs quæ leniter & absque molestia purgant, tum & nonnihil refrigerantibus sed tamen aperientibus. Purgatio dari potest ex rhabarb. ʒ 1. β. vel ʒ 2. cū syr. acetoso & aqua aut decocto cichorij: aut ex speciebus diacarthami addito rhabarbaro. qualis purgatio subinde reiteranda est. Intermedijs tēporibus syr. de Bizant. cū aceto, aut acetosus cōpositus addito syr. de cichorio cū rhab. utiles sunt; præsertim si troch. ex rhabarb. simul dentur, aut trochisci ex berberis. qui in hoc casu multū conveniunt.

Empl. verò & ventri ad moveri potest ex farina hordei¹⁰, bolo vulgari cum succo absinthij, cichorij, aut oxalidis simul permix-

18. *Vires enim ex præcedentibus morbis debilitate, valida Cathartica non admittunt.*

19. *Ut numerus suppleat defectum gradus, & quantitatis.*

20. *Non quod proffit, sed ut ea quæ prosunt recipiat ut substantiam habeant.*

tis : addito santal. rubrum, & rosar. rubr. pulveri & ol. rosac. & exiguo aceto

Cibus sit panis cum furibus coctus, probè fermentatus : carnes ovium ac volucrum. quæ cōdicæ sunt succo, oleis, aut fructu berberis, vel succo oxalidis, vel succo limonum, vel pomorum aromaticiorum acidorum, aut aliorum similium refrigerantium & aperientium

Vinum sit album, tenue aqua cichorij vel simili dilutum : quo tamen & parcè utendum. si sitis urgeat os aceto & aqua permixtis abluendum : aut aceto cum modico vini.

Est verò & alia curandæ ratio per sectionem, videlicet quam perforationem & Græci Paracentesin nominant. quæ quomodo sit faciendâ apud Paulum lib. 6. c. 50. habetur. Et siquidem hæc tempestivè fiat priusquam interna viscera corrupta fuerint, prodesse potest : sed se-

rius

21. *Vitanda olera & herbæ, ex his enim Heraclitus hydropem sibi contraxit.*

22. *Metrodorus Ascite laborans bibebat quidē, sed mox evomebat Cels. id non omnibus convenire scribit. Itaque laudandus magis eques Rom. qui in hoc malo non bibere assuevit.*

Paracentesis.

23. *Non sanat quidem emissus humor, sed Medicina locū facit, quam intus inclusus impedit. Cels.*

ius adhibita nullam utilitatem confert.

Sic & subinde ex umbilico, propter tumoris magnitudinem & aquæ copiam foras prominente, aqua extrahitur laneo filo ipsi transmissio. Verum nec eo modo educto aquoso humore sanitas sequitur ²⁴ si corpus multum sit extenuatum, & dolor aliquis molestus, aut viscera interiora corrupta. nam ut Hipp. prorhet. 2.

Qui ab hydrope superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet, simulque facile concoquat & bene spiret: sitque sine dolore & totum corpus equaliter tepidum habeat, non circa extremas parcolliquatum.

24. Quia eruptio umbilici, nisi ad summum ubi malum pervenerit, non supervenit.

De Tympanite.

Tertia hydropis species Tympanites est, in qua venter solus vehementer distenditur & pulsatus tympani modo resonat, & quidem à flatu plurimo ac se-

1. Qui melius quam Gal.
causam cognovit, qui ad
minorē frigiditatem re-
fert parum sui memor;
quum de med. κατὰ
τὸν. etiam ad calidita-
tem referat. Vide comm.
in 11. aph. l. 4.

2. Quod cum in ipsa
praxi appareat, huic
magis quam alijs Scri-
ptoribus contrariū ad-
ferentibus credendum.
Vide Aretæ cum l. 4. c. 1.

Curatio.

perfluo in vētris cavitate
ut Aët. ait collecto. H
dropem siccum Hippoc
nominat, quod veluti in h
drope venter sit distentu
interim nullus in eo humo
contineatur.

Præcedūt hunc frequen-
ter tormina & circa umb
licum cruciatus, & lumbe-
rum dolor. qui neque à me-
dicamēto, neque aliter sol-
vitur: ut 4. aph. 11. ubi mor-
bum difficilē esse Hippocr
ostēdit. cui & accedit Aët.
qui eū ascite magis pericu-
losum, & minus remedijs
obedire affirmat. Paulus
à purgantibus, corpus col-
liquantibus, & urinam mo-
ventibus abstinendum sua-
det, & solis ijs quæ extenua-
re & flatus discutere pos-
sint utendum: & cucurbitas
leves toti ventri adhibēdas.
Et rectē quidem Paulus. ne-
que enim enemata aut alia
med. quicquam proficiunt,
nulla succedente per alvum
aut vesicam vacuatione.

Poterunt itaque ex Pauli
& Aëtij sententia fomenta

ex

ex feminibus flatus discu-
 rientibus adhiberi, veluti ex
 semine cumini, seselios,
 dauci & similibus, floribus
 chamameli, & anethi ad-
 litis. Deinde & cucurbi-
 ula absque scarificatione
 ventri admoveri. Morbus
 autem acutus est, pauco-
 rum dierum, & maximè
 ethalis.

Aëtius verò & omnem
 hydropem, periculosum
 esse ait. Recentiores si-
 ne hypofarcam sive ascie-
 m, qui 6. menses excessit,
 incurabilem censent. ne-
 que enim diu vel in habitu
 corporis, vel in ventris ca-
 pitate aquosi humores con-
 tineri possunt, quin vicinas
 partes vitient, atque cor-
 umpant. quibus corruptis
 nullam salutis spem su-
 peresse, ex Hippocr. secun-
 do prorhet. verbis satis
 manifestum. Post sangui-
 nis verò vomitionem &
 modum periculosum esse,
 hydropem, eodem lib. Hip-
 pocr. scribit: Cui, inquit
 multum sanguinis sursum

3. Neque enim humor,
 sed potissimū flatus est,
 qui morbum hunc facit.

4. Exempla vide in Ob-
 servat. medicinalibus
 R. Dodonæi cap. 38.

5. Hinc illud de Cran-
 tore qui hydrope mor-
 tuus est: Ε'πέκλυσε καὶ

σέ κ' ἐγέντωρ
 ἡ νόσων κα-
 κίστη.

6. Quod non nisi Princi-
 palibus visceribus lesis,
 fieri consueverit. Ex
 Leucophlegmatia qui-
 dem neminem nisi pro-
 pter suum, vel Medicū
 errorem mori Bertrut.
 adserit; sed id sic gene-
 raliter verum non esse,
 experientia testatur.

7. Prava harum singula-
 rum constitutio; pejor
 autem multo ipsarum
 permixtio. Aret.

8. Mulier quædam cura-
 ta fuit; sed post in san-
 guinis vomitū recidens
 periit.

9. Quando ratione hydropis auctæ, & non ex alia aliqua causa supervenit. talis enim tussis potest esse non letalis.

ac deorsum eruperit & febris insuper accesserit, eundem multa aqua repletum iri timorem. atque hic hydrops brevissimi est temporis, e quo paucissimi evadunt. Sic & omnis hydrops ex acuto morbo malus est non enim sedat febrē, sed dolorem infert & mortem ut Hipp. 2. prognost. statim initid. Non minus verò periculosus ac letalis est, quando cum regio accedit morbo. Solet enim in tali hydropi non solum lien male esse affectus, sed & jecinoris aliqua pars in lapideam duritiam conversa. Hydropi autem laborantibus, tussis etiam superveniēs, malum ut Hippocr. aph. 35. lib. 6. quod quidem maximè veritatem habet, quando non sicca tussis est. Quod si verò ea quæ expuuntur etiam corrupta, aut purulenta fiunt, pessimum, ac omnino lethale. ostendit enim sputum purulentum pulmonis substantiam ab aquoso humore vitiata

c corruptam¹⁰. Ait quo-
 que Hippocr. hydrope la-
 borantibus ulcera¹¹ in cor-
 pore facta difficulter sana-
 i. 6. aph. 8. nam copia af-
 fluentium humorum ea re-
 piccari non patitur. deinde
 verò quū & illi acres mor-
 lacesq; sint, ulcera reddūt
 deteriora. Superveniens
 autem fortis ventris fluxus
 is qui leucophlegmatia sive
 hypofarca detinētur, à mor-
 bo liberat. 7. aph. 29. siqui-
 dem initio¹² hydropis ipsius
 accidat & priusquam ali-
 quod viscus vitiatum sit. su-
 perabundantia enim hu-
 morum per ventrem ex-
 purgata, ab hydrope ægro-
 tos sanos ac liberos reddit.

10. Quod in disiectis
 corporibus quandoque
 visum.

11. Fiunt ut plurimum
 in tibijs.

12. Nam postea à de-
 bilitate virium superve-
 nit.

De Renum Affecti- bus, & de Calculo.

Lea. 124. Iulij 9,

In renum cavitate ex cras-
 sis, lentis ac viscidis hu-
 moribus calculi generan-
 tur¹, vi & potentia ipsius
 caloris ipsorum renū cras-
 sos ac viscidos humores
 in calculosam substantiam

1. Affectus hic Cæl.
 Aureliano Lithiasis, &
 Calculatio dicitur.

P p

2. *Scribon. vocat Arenam sabulosam.*
3. *Horum mictio λιθ-
γία dicitur.*
4. *Præsertim si non la-
ves, sed asperi atque in-
æquales fuerint.*
5. *Atque adeò etiam ex-
cedant. quemadmodum
in Virgine quadam, cu-
jus historiam cum for-
ma Calculi, ad me misit
Chirurgus Dordracenus
M. Boumannus.*
6. *In colico dolore non
hæret fixus, sed flu-
ctuat.*
- vertentis. Sunt autem calculi admodum minuti: veluti arenæ quâdoque: quando majores: & subinde tam grandes ut per urinas ægre & cum dolore ac molestia descendunt: quandoque verò & ad magni ut renum cavitationem totam impleant: quod tamen non nisi rarissimè accidit. Arenulæ autem ac minores calculi citius molestiam cum urina frequenter descendunt: nil lentis, viscidis, crassisque humoribus eos implicari cōtingit. quod ubi accidit plures cohærentes magni alicujus calculi notam referunt, ac cum non minori dolore ac gravitate descendunt, atque tunc non raro vomitiones accedunt, atque alvi obstructio tanta, ut non solum excrementa, sed ne flatus quidem liberum habeant exitum; veluti in dolore colico. Dolor verò & circa lumbos ac hypochondria hæret, qui quandoque & adeò vehemens

mens est ut eum febris comitetur. quod ubi fit, de renum inflammatione periculum imminet. Quando autem calculus alicujus magnitudinis in motu est, & per ureteras descendit, sanguis non raro cum urina miscetur: quæ frequenter non prius sanguinea esse desinit, quam calculus ex uretere in vesicam inciderit.

Curatio.

Quando igitur calculus molestus fuerit, dolores & vomitiones adsunt, & non raro urinæ tenues: dolori occurrendum erit & viæ latiores ac patentiores faciendæ quò calculus, & facilius, & cum minori molestia descendere queat: ad quod plurimum conducit enema, ex decocto malvæ, bismalvæ, parietariæ; violariæ, si calor adsit; floribus chamæmeli, meleloti, & nonnihil furfurum tritici. in hujusmodi decocti
 1. addendæ erunt diacathol. ʒ 6. aut ʒ 1. 2 vel

7. Tum quod facibus ex Intestinis subductis urinarij meatus minus premantur, atque angustentur: tum quod instar fomenti interius admori eosdem meatus laxent.

8. Diacath. satis magnam crassie quantitatem habet. Cassia autem humectat; ideoque & vias urinarias laxat: calorem, qui à Nephritide vix abest contemperat: leniter alvum movet.

Pp 2

tantundem cassiæ med
læ, ol. amygd. dulc. \bar{z} 2.
 \bar{z} . aut ol. amygd. & viola
præsente calore: ana \bar{z}
 β . - - -
sacchari rubri \bar{z} 1. c
unum aut duo lutea, & 1
lis exiguum. Et tale en
ma quo citius injicitur, ho
etiam plus confert: reit
rare sæpius verò licet d
lore perseverante.

Fomenta autem sæpi
adhibenda sunt parti do
lenti: ex ijsdem herbis &
floribus addito sem. lini &
fœnigræci in aqua deco
ctis.

Post fotum inungendu
erit locus ol. amygd. dulc
vel ol. sesamino, vel ol. sem
lini: addito ol. scorpionum
quando dolor nonnihil
fuerit remissior factus,
vel etiam ol. chamæmeli
no, aut anethino.

Poriones.

Propinare quædam con
venit quæ vias laxiores
reddant & mitigent: quale
decoctum quod sequitur.
& Rad. brusci, asparagi \bar{z} 7.
glycirrhizæ \bar{z} 6. uvarum
pass.

9. Prius enim si adhibe
rentur tam strenua, ne
phlegmonem Renū aut
inducant, aut maiorem
faciant, metuendum es
set.

pass. mundatur ꝯ 1. fol.
malvæ, bismalvæ M 1. fru-
ctuum alkekengi ꝯ 1. f. de-
coctio in aqua q. s. ad ꝯ 1.
ß. detur mane & vesperi
haustus. atque huic deco-
cto cicerum rubrorum ad-
dere expedit & sem. anisi
ꝯ 1. aut ꝯ 1. ß. quando do-
lores remissiores fuerint
facti: tunc enim non mo-
do vias laxiores reddet, sed
& ad calculi expulsionem,
& facilem descensum non
parum conferet. Datur ve-
rò & quandoq; ol. amyg-
dalar. dulc. recenter ex-
pressi plus minus ꝯ 1. cum
jure carnis aut caponis, aut
cum modico vini, si febris
non obstat; quod dolores
valde lenit & lubricas vias
reddit. Quod si laborans
enema sumere recuset, tūc
in decocto superiore, aut
in liquore alio, veluti in jus-
culo carnis aut caponis, aut
in aqua betonicæ, vel simili
infundi potest rhabarbari
ꝯ 1. ß. vel 2. ac deinde co-
lato addi mannæ electæ
ꝯ 1. ß. vel 2. vel si calor ad-

fit syr. ex infus. rosarum
 3 2. vel 3.

Loco supradictorum
 med. alvum lenientium da-
 ri potest medullæ casiae fi-
 stulæ recēter extractæ 3 1,
 cum rhabarb. plus minus
 3 1. & sacchari q. s. in for-
 ma boli: nam alvum laxam
 & apertam esse plurimum
 refert. intestina fæcibus
 gravata præter quod dolo-
 rem intendunt, etiam cal-
 culi descensum impediunt,
 dum vias comprimendo
 angustiores reddunt.

Quod si verò dolor non
 fiat sedatior, aut calculus
 non descendat, in balneo
 laborans collocandus
 crit, ex decocto malvæ, bis-
 malvæ, parietariæ, floribus
 chamæmeli, meliloti. in
 quo non validè calido sed
 tepido tantummodo sedē-
 dum est, & aliquandiu: non
 tamen nimis diu immo-
 randum. subinde autem re-
 petendum est balneum, sed
 tamen non nimis frequen-
 ter: nam diuturnior in bal-
 neo mora & frequentior
 ingres-

10. Quum Epicurus cal-
 culo laborans quatuor-
 decim diebus Urinarum
 retentione fatigatus es-
 set, in pelvim aquis ca-
 lētibus plenā descendit,
 petijtq; merū ad sorben-
 dum sibi dari, atque mo-
 nens amicos ut suorum
 decretorū memores es-
 sent, inter verba defecit.
 Diogen. Laert. Rectè
 sanè per balneum laxa-
 tis vijs, vino veluti veçte
 calculum emoliri cona-
 tus est. Defecit autem
 vel propter extremam
 virium debilitatem, vel
 quod nimis diu in cali-
 da moratus sit. quod ca-
 rendum monet author
 1. de Renum affectibus.

ingressus subinde vires de-
jiciunt.

Si autem simul cum cal-
culi dolore & febris ac-
cesserit, sanguis erit detra-
hendus si vires & ætas con-
senferint: & quidem ex
cubiti vena partis dolentis:
& ijs quæ adhibentur, sive
enemate sive potionibus,
refrigerantia quædam ad-
hibeantur; ut prius dictum
est.

Sedatis autem utcumque
doloribus & vijs laxiori-
bus redditis si calculus non
sponte excidat, exhibenda
erunt quæ illum expellant:
cujusmodi sunt omnia uri-
nas moventia. Prodest la-
chryma abietis: vulgo¹¹ te-
rebinthina Veneta 3 3. aut
4. pondere data: quæ cal-
culos in ureteris hærentes
expellit, & simul alvum mo-
vet. utile autem hanc aqua
cichorij vel lactucae quan-
doq; lavare, videlicet quan-
do calor adest. Conducit
verò & cicerum rubrorum
decoctum. Confert verò
ad calculi expulsionem non

11. Pro hac tamen Cy-
pria vera, quando ha-
beri potest, utendum.

parum betonica, & veronica, tum & virga aurea quæ non modo calculum expellit, sed & per lentos ac viscidos humores co hærentes, dissolvit. potest autem una harum, aut plures simul in vino decoqui si febris non obstat, aut in jussulo carniū, aut in ptisanæ decocto, si præses febris sit. aut alteri alicui decocto addi. quovis enim modo sumptæ profunt. His autem potentiores sunt rad. pimpinellæ saxifragæ: quæ & supradictis si opus fuerit addi poterunt, vel seorsum in jussulo aliquo decoqui. Ad calculum verò & arenularum expulsionem cōmendatur & elect. lithontribon: quod cum saccharo in tabellari forma formatum exhiberi potest. Si autem calor metuat, admiscebitur speciebus hujus, vel æqualis portio, aut paulo minor specierum diatragacanthi frig. aut trochiscorum de alkekengi & cum aqua betonica

onica, aut bardanæ, aut 12. Nam exemplū quod
um decocto glycyrrhizæ adamantē frangat puto
c saccharo. q. f. forma- nos decipit. Quædam
untur tabellæ sive rotulæ. usu hujus aphthæ con-
Sunt qui specierum li- tractis mortua est.
nonripticon 2. cum san- 13. Sunt nonnullæ acidæ
guinis hirci 1. & aqua mi- venæ fontium, quæ hanc
j solis aut simili, aut cum habent virtutem ut cal-
decocto cicerū exhibent. culos, qui nascuntur in
multo autem ac frequen- corporibus hominū, po-
sanguinis hirci 12, ut cun- tionibus discutiant. Fie-
ue etiam præparatus sit, ri autē naturaliter quod
su abstinere præstat. exi- acer & acidus succus
ua enim quantitas nec subest in ea terra, per
rangere, nec expellere po- quam egredientes venæ
est: magna verò etiam no- intingunt acritudinem.
et. Extant verò & aliæ & ita quum in corpus
nultæ 13 apud varios au- inierunt dissipant quæ
hores ad calculum fran- ex aquarum subsidētia,
endum, vel expellendum ac in corporib. & con-
ommandatæ compositio- crescentia offenderunt.
es ex multis ac fortibus Vitruv. l. 8. c. 3. Probat
iureticis permixtæ: item autem hoc fieri posse
& aquarum destillatarum exemplo testarum oro-
x diureticis in vino mace- rum, plumbi, margari-
atis descriptiones. Hujus- tarum, silicum: quæ ut
lenta ac saxea sint, ace-
o dissolvuntur. Horum acidorum fontium loco vitriola-
recentiorum nonnulli exhibent, cum certa pernicie cal-
culo laborantiū, ni maxima cum cautione id fiat. vesicam
nim aliasque partes per quas urina labitur, adurere; at
alculum jam factum nihilominus cōminuere non potest.

cemodi autē fortibus diureticis non temerē est utendum: nam potentiora diuretica quod tenue est in sanguine segregant, ac per urinas expellunt, crassius verò indurant, ut Gal. 5. simp. facult. testatum reliquit. quam ob causam à potenter diureticis abstinendum; nec illis utendum vel dolore ex calculo præsente, vel etiam in sanitate præservationis causa: nisi magna aliqua necessitas urgeat. Sunt verò & ex familiaribus nonnulla quæ calculi dolorem lenire, & eundem simul expellere (si non magnus est) queunt: quale est florum chamæmeli ex vino decoctum. quod calidum cum exiguo pulveris nucis moschatae propinatum dolorem sæpe lenit, ac calculos ac arenulas expellit. Sic & quando magnitudo doloris urget, & enemata ac fots nihil profunt, vires autem dejectæ ac debiles sint, nec ad balneum ferendum satis valida

validæ Philonis antidoti

2. aut 3 i. ¹⁴ cum exiguo
ini, aut alterius liquoris
exhibita multum conducit:
dolores enim mox sedat &
arenulas expellat, sed nec
emerè hoc med. utendum.

14. *Quædam jamjam
quasi moritura hujus usu
plus arenularum quam
urinæ excrevit, & sana
erexit.*

Victus rationem dolore
vigente tenuem esse oportet
& humectantem. juscum
aliquod, veluti caponis
satis esse potest. Potus
sit ptisanæ, glycirhizæ &
variarum passerarum deco-
ctum præsentente febre: illa
verò absente, vinum album,
tenuè, & dilutum. Quum
verò calculus in motu,
quod urinæ cruentæ ostendunt,
liberalior etiam potus
concedendus & imperandus
est, ut plurima videlicet reddatur
urina, quæ calculi & arenularum
est vehiculum: citra enim
vehiculum descendere ac ex-
cerni nequeunt.

Liberatus à calculi doloribus
si deinceps sanus esse voluerit;
ab omnibus abstinere debet
lentum & crassum succum ingene-

Præservatio.

15. Sic multi post febres & in quibus frequenter usi saccharo, arenulis post laborant: concrescit enim calore, veluti saccharum candi.

16. Notavit hoc bene Alexand. Trall. l. 9. in eoque sepius turpes errores committuntur.

17. Quod Erasmus alibi ex sua experientia testatur. valde enim calculosus erat.

rantibus: & à fructibus frig. & crassos humores gignentibus: à multo quoque sale & falsamentis: ita & à saccharo quibus huius usus non assuetus. astinendum verò & sanis tempore à multis fortibus diureticis, ne dum calculos speratur frangendos, vel expellendos, alij generentur¹⁶, ut supradictum est. Si juvat aliquando uti aliquo, quo renes arenulis expurgari queant cicerum decoctum sufficere poterit, vel alia levior non impesse calida, ut asparagus, rad. feniculi, petroselinii, vel etiam pastinaca cum cibus cocta: sic & holeria ex malva, urtica, charrefolio, & similibus. Vinum convenit ad renes expurgandos album: illis vero repurgatis, rubrum præferendum¹⁷: nam dum vires reddit angustiores humores crassi minus ad renes perferri possunt; quos etiam album deducit.

Prognosis,

Ad prognosticon facit 6.

aph.

ph. 6. Renum & vesicæ vi-
a in senibus difficulter sa-
antur: qui tamen non tam
e nephritico seu calculi
odore, quam de alijs re-
um ac vesicæ affectibus
enit intelligendus. Huc
erò & adduci potest 4.
ph. 75. & omnes subse-
quentes ad finem usque.

De Stranguria, & Dysuria.

Stranguria & Dysuria, Lect. 126. Iulij 42.
Symptomata sunt affe-
ctuum circa vesicam & ad
urinæ excretionē pertinen-
tium. Stranguria seu urinæ
stilitium dicitur: quando
guttatim & guttatim de-
stillat urina, & assiduam ad-
miniculum irritationem
facit. Dysuria verò appel-
latur: quando cum difficul-
tate & conatu aliquo uri-
na redditur, sic ut & vis
quædam adhibeatur.

Stranguria autem fit, aut
propter urinæ ipsius acri-
moniam, aut propter re-
tentricis vesicæ imbecilli-

1. Atque etiam dolore,
quod particula *δύς*, ut
in voce *Dysenteria*, sig-
nificat. Sufficit autem
ut *Dysuria* sit, alteru-
trum adesse.

2. Expultricem etiam si
paucissima sit, irritan-
tem.

3. Retentricis, id quod tatem: ab intemperie fr
in vesica colligitur non factam. Stranguria prop
retinente. Hac laboran- urinæ acrimoniam, ard
tes Submejulos vocant. urinæ vulgò nuncupatu

Ardor urinæ.

Incontinen-
tia urinæ.

Causa.

4. Hinc turpioris h.e.
venereæ voluptatis no-
tam in Epicuro puta-
runt Stoici, quod Dysu-
ria laboraret.

5. Aut semen corruptum
ut in Gonorrhœa vene-
rea.

6. Cap. 4.

7. In mulieribus minimè
quia uterus interponitur
inter intestinum inflam-
matum & collū vesicæ.

8. Potest & ab exhibitis
acrioribus, ut cantha-
ridib. ol. sulphuris &c.
fieri.

quæ verò propter facultatē
imbecillitatē ipsius vesicæ
ac refrigerationē accidit
urinæ nominatur incontinen-
tiā ac præter voluntate
exitus. Acris autē redditur
urina vel propter renū & v
tium, vel alterius partis qu
cum urinis humorū suorum
vitia seu cacochymiā suam
aut pus (ut quando aliqu
abscessus eruperit,) & tran
mittunt, ut ait Gal. 6. de loc
aff. 6 Sic & acris redditur
urina quādo vesica propte
vicinæ partis inflammatio
nem per consensum supra
modū incalescit: veluti pro
pter inflammationem recti
intestini in viris, & uteri in
mulieribus. quod & Hipp.
testatur 5. aph. 58. Recto
intestino, inquit, aut utero
inflammationem patiente,
urinæ accedit stillicidiū.

Urinæ autē difficultatem
sive dysuriam afferunt in-
flammatiō, abscessus, ulce-

ra,

a, intemperies, præsertim
frig. vesicæ, spiritus flatuo-
sus, potētia expultrix imbe-
illis, vel in vesica calculus.

Posteaquam igitur pro-
pter acrimoniam Strangu-
ria ac Ardor urina conti-
nerit, exhibenda erunt om-
nia humectantia, & nonni-
l refrigerantia: ut est de-
coctum ptisanæ cum juj-
bis, aut sebesten, addita gly-
rrhiza. sic & dari potest

decoctū. rad. althææ, aut
ol. ejus cum jujubis, sebe-
sten, fructibus alkekengi,
m. cydoneorū & sem. 4.
ig. majoribus, addita gly-
rrhiza & uvis passis. in quo
decocto dissolvi poterit
de violis aut de jujubis,
si alvus durior est, syr. ex
fusione rosarum. in talis
decocti portione quadam
fundi poterit rhabarba-
m, ac deinde colato ad-
manna: quando videlicet
us aut expediens fuerit
vum lubricam reddere.

non admodum tamen con-
nit alvum multum expur-
re, neque enim utile est

9. Viciū hoc, ut non
diuturnū plerūq, mo-
lestissimum tamen. Fri-
gidam mictionē nostra-
tes appellant.

Curatio. Ejus causa ut
I. Ex ardo- plurimū usus
re urinæ. cerevisiæ re-
centioris, accedente ex-
terno totius corporis,
& præsertim pedum fri-
gore.

10. In magna quantita-
te: quia pauca cito ad
vesicam non pertingunt.
Quod si æger magnam
quantitatem simul de-
tractet sumere, frequen-
tia adsumptionis id pen-
sandum: nam quod pau-
cum est magnam acri-
moniam diluere, vel ob-
tundere non potest.

11. Nam ardorem uri-
ne etiam sanis fortia in-
vehunt medicamenta.

12. *Troch. diaphysalidon* Græcis dicitur.

13. *Vt eluatur quod in Urethra, præsertim in flexu ejus circa Perinæum hæerere solet; ipseque meatus oblinatur.*

14. *Quæ duo ob tenuitatem non concreſcunt ingruiſcos.*

humores à vijs urinæ d^{er}tere. Poſſunt vero & ſy^ſ violis, de jujubis, aut d^{er} pavere cum aquis deſti^ſ propinari, ut cum aqua^ſ ctuæ, intybi, nenuph^ſ portulacæ, plantaginis^ſ ſimilium. Vtiles quoque^ſ veres ex rad. althææ,^ſ ctibus alkekengi, glycy^ſ za, ſem. 4. cōmunibus^ſ joribus & ſem. papav^ſ Sic & conferunt troch^ſ alkekengi tam illi qu^ſ Meſue, quam alij qui à P^ſ lo & Aëtio deſcribunt^ſ Confert & conditum^ſ conserva flor. malvæ,^ſ conserva flor. nenuph^ſ addito ſem. malvæ, pu^ſ jubarum aut ſebeſten,^ſ ciebus diatragacanthi fr^ſ cum ſyr. de violis, aut de^ſ jubis, aut utroq; permix^ſ Per virgam, ſi dolor vel^ſ mētius urgeat, infundi p^ſ terit 13 muccago ſem. c^ſ don. pſyllij, aut malvæ cu^ſ decocto ptifanæ fact^ſ itē & hydromeli dilutum^ſ atque poſt ejus egreſſum^ſ lac aſinæ, aut mulieris. P^ſ

ter

erit & perinæum & pubes
 ngi ul. nenupharino ac
 iolaceo. Cibus sit ptisana,
 el cum ea¹⁵ decocta. Co-
 mietiam cum cibis lactu-
 as, intybum, & malvas
 onducit. Melones, pepo-
 es, cucurbitæ, poma, &
 ujsmodi fructus frig. ac
 umidi permittuntur. Potus
 it ptisanæ decoctum, vel
 enuissima cervisia¹⁶ aut
 tiam vinum album dilu-
 um. Larga autem & co-
 iosa potatio etiam albi
 e tenuis vini¹⁷ conducit;
 quando videlicet tantum
 ibitur ut priusquam cōco-
 qui queat ad vesicam, des-
 endat & excernatur: quod
 & Hippocr. lib. de affect.
 iatis probare videtur. Con-
 ducit, inquit, (in stillicidio
 videlicet urinæ) intrinsecus
 corpus humectare; Alvum
 quoque per cibos à quibus
 fluida fiat; vesicam verò
 per potus à quibus urinæ
 plurimum fundatur.

Stranguria autem quæ
 uteri aut recti intestini in-
 flammationem comitatur

15. *Veluti jus pulli cum
 ptisana decocti, quod
 lentore, & pinguedine
 quadam sua, omnes uri-
 nae meatus velut incru-
 stando munire potest.*

16. *Recentior: nam mox
 acrimoniam ob tenuita-
 tem suam contrahit.*

17. *Quale Rhenanum
 est. cujus calfacti usu so-
 lo, præsertim si nux my-
 ristica immaceretur, fla-
 tuosa Dysuria curari so-
 let.*

II. *Strangu-
 ria ex inflam-
 matione.*

Qq

non aliam requirit curationem quam ipsæ postulant inflammationes quibus sanatis stranguria cessat.

III. Stranguria ex frigida intemperie.

Stillicidium verò urinæ quod citra dolorem contingit & urinæ quoddam est involuntarium profluvium, quale senioribus accidit partim ex debilitate, partim ex refrigeratione resolutis cervicis vesicæ musculis contrariam omnino curationem requirit: calida ac sicca omnia conveniunt. Convenit & vini potio: quam & Hipp. aph. 48. lib. 7. stranguriam solvere ait: à causa nempe ut Gal. interpretatur frig. ortam. quamquam & aliam si largius bibatur curare queat ut jam ante dictum est. Pubem & perinæum in hoc affectu ungi utile est ol. vulpino, costino, laurino, vel etiam de euphorbio, & si quæ sunt alia quæ vesicam calfacere & resolutis partibus conducere queant. Differt autem affectus iste non parum à
Dia.

18. Meracioris, & potentioris. id enim vox Σώφρονος apud Hipp. significat.

19. His enim subjacet Sphincter cujus actio, Urinam nempe continendi, læsa est.

Diabete: nam in hoc stillicidio urina paulatim, guttatim nec multa simul excernitur, neque ulla sitis laborantem premit. In diabete autem multa, copiosa & frequenter urina redditur: aliquando & in somno ignorantibus profluit: & sitis magnaque bibendi cupiditas assidue affunt.

Dysuria sive difficultas urinæ curari debet pro efficientium causarum conditione. Si inflammatio vesicæ^æ hujus causa fuerit, vena erit secanda & quidem interior dextri cubiti. Inflammationem autem ostendit circa pubem ac perinæum simul cum febris continua dolor vehemens, & urinæ difficultas. De hujuscemodi dysuria scribit Hipp. 7. aph. 48. ubi ait: Urinæ stillicidium, & difficultatem venæ sectio solvit. nec enim ad ullum vesicæ affectum venæ sectio conducit quam ad inflammationem. Vena secta uti-

Leq. 127. lul. 13.

De Dysuria.

I. Ab inflammatione.

20. Cum plenitudine seu plethora, & virium robore.

Q9 2

le erit enema quale in dolore ex calculo, additis refrigerantibus; veluti quando febris cum calculi adest dolore. Danda etiam quando in ardore urinæ conveniunt. Cum syringa quoque in vesicam injicienda sunt ibidem dicta. Oleum etiam ijsdem utendum, aut illorum loco cataplasma imponendum ex rad. bifidæ malvæ decoctis & malvæ ac lactucæ folijs, cum oleis amygdal. dulc. & violarum: Observata victus ratione ut in Ardore urinæ. Post inflammationem abscessus & vesicæ ulcera à Gal. inter dysuriæ causas numerantur cōment. aph. 48. lib. 7. Horum autem signa sunt sanguinis, puris & squamularum mictus cum urinæ graveolentia, ut hipp. aph. 4. aph. 81. Si sanguinē, inquit, aut pus minxerit aut squamulas, & gravis adsit odor, vesicæ exulcerationem significat. & præsertim quidem si dolor circa anum ventrem pectinem

21. *Non diu consistit. statim enim rumpitur & fit ulcus.*

22. *Quâ plus quod à vesica, ab illo quod ex renibus, distinguuntur.*

nem ac fœmur incidat, ut
mox præcedens habet aph.

Existente igitur in vesica
ulcere sive ex abscessu ru-
pto, sive alia de causa facto,
abstergentibus erit uten-
dum & ijs quæ urinas ali-

II. Ex ulcere,

quo modo, sed leviter

movent. Hydromeli utile

est, & aqua decoctionis

ptisanæ cum melle rosato.

Prodesse poterit decoctum

ex rad. rusci, asparagi, gra-

minis, glycyrrhizæ, fru-

ctuum alkekengi, quibus

& addi poterit virga aurea:

quæ præter quod abster-

gendo clementer urinas

movet, etiam consolidandi

ulcera potentiam obtinet.

Per syringam utiliter in ve-

sicam injicitur hydromeli

vel aqua decoctionis hor-

dei cum melle rosato. In-

unctionibus, aut cataplas-

matis si modo non magnus

adsit dolor, nihil opus. Vi-

ctus ratio non refrigerans

sed temperata esse debet,

ac ex optimis bonique ali-

mēti cibis. ab omnibus quæ

urinæ acrimoniam inten-

23. Nam validiora pro
caloris majoris modo
etiam magis acria sunt,
atque acriorem urinam
faciunt; ideoque malum
augent, non minuunt.

24. Quæ omnia aut nul-
lum, aut exiguum ca-
lorem habent.

25. Quia dolor quum
non assit ejus ratione
non conveniunt: & sor-
didiora reddunt ulcera.

Q 9 3

dere possunt, abstinendum: ut sunt multa aromata & herbæ quædam acres, ut eruca, sinapi, nasturtium, radicula, allium, cape, & similes.

III. Ab intemperie frigida.

Quando frigida intemperies & ut Gal. ait, flatus urinæ difficultatem fecerit, præsertim aliquo humore frig. vias obstruente, utendū cal. ac diureticis urinas moventibus. Ex frig. autem dysuriam fieri apparet, quando nulla inflammationis, nulla abscessus, aut ulceris, aut calculi vesicæ signa assunt; neque calor juxta vesicæ regionem sentiatur; & potissimum si ab externo frigore vesicam lædi contigerit.

Curatio.

In hoc casu conveniunt diuretica etiam fortiora: ut sunt petroselin. apij vulgaris, petroselini Macedonici dicti, & pimpinellæ saxifragæ tum rad. tum semina. item & ²⁶ betonica herba ac ejus rad. sem. præterea seselios, dauci, amios, milij solis & similia. ex quibus decocta

26. Quæ solacium vino bibita calculum nonnunquam expellit. & valde diuretica est, licet ad caput tuum valere putatur.

Decocta cum aqua aut cum vino, si opus fuerit, parari possunt; aut pulveres qui cum vino exhiberi queunt.

Huc facit etiā elect. lithon-thripticon potenter urinas provocās; cujus specierum 3 i. cum decocto, aut alio liquore dari potest. Fetus verò ex parietaria, malva, anetho, arthemisia, floribus chamæmeli ac meliloti utiles sunt. Sic & cataplasma ex parietaria cum ol. liliorum pubi impositum.

Unctiones similiter conducunt ex ol. liliorum, chamæmelino, scorpionū addita axungia 27 cuniculi. Victus ratio calidior esse potest. Rad. petrosel. fœniculi, ac pimpinellæ saxifragæ cum cibis utiliter decoquuntur. Potus vinum album, tenue aut cerevisia tenuis, nec turbida nec acida, aut hydromeli.

Propter calculum autem urinæ difficultas, sanari non potest nisi illo sublato.

Difficiles autem & ægrè, aut non curabiles affectus

27. *Que in provocanda urina etiam ab intermedicæ ætatis medicis, commendatur.*

A calculo.

Prognosis.

Qq 4

28. De qua tamen intelligi ex mento hippocr. non posse aph. liquet ex sequentibus. Nisi febre superveniente urina copiose fluxerit, quod & Gal. in comment. satis ostendit.

stranguria ac dysuria in senioribus sunt: ut 6. aph. 6. de quo prius dictum. Quibus verò ex urinæ stillicidio ileos supervenit in 7. diebus pereunt, ut Hipp. aph. 44. lib. 6. Quod de stillicidio ac difficultate urinæ veritatem habere potest propter magnam aliquam vesicæ inflammationem: nam si adeo magna hæc fuerit, ut etiam intestina hinc dolore afficiantur, lethalis habenda.

De Ischuria.

1. Fit læsa Naturali, non Animalis Vesicæ facultate.

Causæ.

Ischuria sive urinæ retentione ab iisdem causis fieri potest à quibus difficultas: & à talibus facta similibus quoque rem. curari debet. Possunt verò hujus & aliæ esse causæ: veluti obstructio vel renum, vel meatus vesicæ: quandoque verò & duræ feces in intestino recto hærentes, quæ cervicem vesicæ comprimantes urinæ exitum prohibent. Renum obstru-

obstructionē testatur pon-
 deris circa lumbos sensus
 & quæ præcesserunt urinæ
 enues: circa vesicam nul-
 lus tumor aut alterius mor-
 bi signa. Obstruuntur au-
 tem renes vel à calculo,
 vel à crassis viscidisque hu-
 moribus. In utroque casu
 utile enemata, aut leve ali-
 quod purgans med. adhi-
 bere: ac deinde balneum,
 ut in dolore à calculo. Ve-
 sicæ autem obstructionem
 non raro & dolor & tumor
 supra pubem ostendit. Ob-
 structio etiam vel à calcu-
 lo, vel à crassis fit humori-
 bus 4. Occurrendum au-
 tem huic immisione ca-
 theteris. si enim calculus
 obstructionem fecerit, ca-
 thetere repulsus liberum
 relinquet urinæ exitum.
 Prodest verò & in hoc ca-
 su hominem supine cuban-
 tem crura habere valde
 elevata, & corpus ejus
 nonnihil concuti. sic enim
 calculus è meatu excidit.
 Quod si verò non calculus,
 sed crassi humores meatus

2. Vel à maxima copia
 arenularum, ut in am-
 plissimo viro cujus Rem
 sinister, Urina propter
 ingentem arenularum co-
 pia retenta, multum su-
 pra distensus erat.

3. Et quidem acerrimus
 quod se ditiosi illi qui in
 obsidione Hierosolymo-
 rum posirema, ervis in
 Oream immisis, ac
 Urine exitu sic interce-
 pto cibos ob famem ab
 alijs occultatos, extor-
 quebant.

4. Vel à Caruncula, seu
 Verruca in Oethra ex
 Gonorrhæa venerea, sub-
 nata.

5. Fortiora, quia quæ abstergent leviter hic nihil proficiunt.

6. Quæ in superiori parte, aut latere Penis facienda; quod inferius facta sectione vulnus in fistulam plerunque desinat.

7. Expressione, suctione, aut tractione quæ fit ad vacuum. Vide Prosperum Alpinum de medicina Ægyptiorum.

obstruant, & catheter immisus parum profuerit; fontibus & balneis utendum; postea etiam diuretica si opus fuerit, & propidanda, qualia in dysuria à causa frigida.

Si autem calculus in meatu virgæ hæreat aut sectione, & aut alio modo eximendus erit.

Si autem duræ fæces in intestino recto hærentes urinæ exitum remorentur, cujus suspicionem facere potest alvus prius dura & astricta quam fuerit urina suppressa. In hoc casu enemata injicienda sunt; quæ sæpe sola expurgatis facibus prosunt: atque idcirco in omni urinæ suppressione & utiliter adhibentur, & ab ipsis curatio incipitur.

FINIS.

Auctores cum sacri tum pro-
fani in hoc Opere citati.

A Drrianus Iunius.	Cedrenus.
Aegineta.	Clemens Alexandrinus.
Aelianus Spartanus.	Columella.
Aetius.	Commentator Thycididis.
Agrippa.	Commentator in Horatium.
Alecinous.	Cornelius Celsus.
Alexander Trallianus.	Cornarius.
Amatus Lusitanus.	Crato.
Ammianus.	Curtius.
Andernacus.	Diodorus Siculus.
Antoninus.	Diogenes Laertius.
Anthonius ab althomari.	Dion Cassius.
Anthologia Epigrammat.	Dionysius Aegaeus.
Apuleius.	Dioscorides.
Aretaeus.	Ecclesiasticus.
Arnobius.	Epictetus.
Aristoteles.	Erasmus.
Arrianus.	Eusebius.
Athenaeus.	Eustathius.
Averrhoës.	Eutropius.
Avicenna.	Fernelius.
Basilus Magnus.	Festus.
Bertrutius.	Fracaistorius.
Botallus.	Fuchsius.
Capovaccius.	Galenus.
Cardanus.	Gaza.
Cælius Aurelianus.	

Gel-

Gellius.
Georgius Logotheta.
Gordonius.
Gulielmus de Saliceto.

Heraclides Ponticus.
Henricus Stephanus.
Herapollo.
Herodiamus.
Herodotus.
Hesiodus.
Hieronimus Mercurialis.
D. Hieronymus.
Hippocrates.
Hollerius.
Homerus.
Horatius.
Horus.

Iacobus de partibus.
Ioannes Heurnius.
Ioannes Leo.
Jonas.
Iornandes.
Ioubertus.
Isidorus.
Iulius Firacus.
Iulius Pollux.
Iuvenalis.

Langius.
Lemnius.
Leoniceus.

Livius Patav.
Lucianus.
Lucilius.
Macer.
Marcellus.
Martialis.
Massaria.
Mezues.
Michael Saronarola.
Montanus.
Moyfes.

Nepos.
Nicander Scholiast.
Nicephorus Calist.
Nicephorus Gregorius.
Nicolaus Alexandrinus.
Niger Medicus Patavinus

Oddus de Oddis.
Olaus Magnus.
Olympiodorus.

Paulus Diaconus.
Paracelsus.
Palladius Sophista.
Pausanias.
Philo.
Philostratus.
Phocion.
Plato.
Plautus.
Plinius Secundus.

Plutarchus.
Polybius.
Proco.
Prosper Alpinus.
Radzevil.
Rhazes.
Regum lib.
Renod.
Rondeletius.
S. Aurelius Victor.
Salius.
Samoniacus.
Scaliger.
Scribonius Largus.
Seneca.
Simocatus.
Solinus Polyhistor.
Soranus.
Stephanus Atheniensis.
Stobaeus.
Suetonius.
Snydas.

Tertullianus.
Theocryptus.
Theodorus Priscianus.
Theophrastus de histor.
plant.
Theophilactus.
Tyro Maximus.
Trotula.
Thucydides.
Valerius Maximus.
Valescus de Taranta.
Varro.
Vegetius.
Vesalius.
Vindicianus.
Vitruvius.
Volaterranus.
Wierus.
Xenophon.
Xiphilinus.

In

In Praxin
D. REMBERTI DODONÆI
recens in lucem editam.

Magni Praxin habes en DODONÆI,
Votum quæ tenuit peritiorum,
Certè degenerem nihil Parenti,
Quamvis posthuma: nam manum sagacis
Experta est medicam SEBASTIANI,
Phæbeâ AMSTELIIS qui primus arte.
Tandem hic non benè scrineis latentem,
Fecit promeritam videre lucem.
Quin si quid minus obvium, minusve
Dictum, quod cupidas moretur aures,
Notis eliquidat probis, politis.
Non hîc cura viri stetit, sed omne
Artis quod latet abditum recessu,
Cordatâ dedit eruditione.
Auctori Scholion quam DODONÆO
Pulchrè consonat, & ille huic vicißim!
Fulta his stabit Ἰατρικὴ columnis,
Et florem cito pristinum resumet.
Quin, Coius quoque quod Senex stupeſcat,
Vitam quod faciat longam videbis,
Artem quod faciat brevem videbis.

G. Rijchius Med.

Præcipua menda sic emendanda: Prior numerus paginam, posterior lineam, a textum, b parergon denotat.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. 5. b quem | 114.4. b fere solet in feminis |
| 1. 13. b ephemera 19. re- | 16. a copiosa |
| pertum | autem vacationi |
| 2. 7. b peripheriam | 116. 11. a gravent, |
| 6. 17. b Quod ad feb. | 117. 3. b turbare 6. Ti- |
| 8. 29. a lupulum, | mao. |
| 4. 23. a sem. | 118.4. b angustiam 9. a |
| 13. pr. b quas | possumus |
| 15. 10. a oxalidis: syr. | 122. antep. b adversatur |
| 16. 8. a assueverunt | 7. a debet |
| 9. 19. b Romulus | 123. 8. b minerale |
| 8. penult. a omnes in- | 126. 9. a alopecia, antep. |
| spiramus, qui si | ophiasis |
| 9. antep. b at medicus | 127. 21. a ratione 20. b |
| 3. 18. b reddat. 21. fa- | sole, 27. magna. |
| ctum Xiphilinus | 135. 2. a venerea (stum |
| 6. 4. b guaiaci | 137. 6. b reperire: mole- |
| 8. ult. b cava | 138. 3. b meatu habebat, |
| 9. 27. a ficuum | 140. 5. b fere |
| 4. 5. b tamen non | 146. 17. a exiguus |
| 5. 9. a excepto tamen | 150. 11. a faeces educat, |
| 7. ult. a Si | 152. 2. a ardentis |
| 00. 17. a somnus pe- | 153. 5. b nimium |
| nult. proficientibus | 158. 9. b Tardar. |
| 03. 12. a omnino | 159. 14. b recepto cura- |
| 05. 12. b magna | bat, hoc. 17. humores |
| 06. ult. b intelligendum | 168. 22. b præternaturali |
| 07. 25. a tamen odore | 171. 23. a somnus |
| cito molestæ. | 174. ult. b attractum. pr. |
| 09. 12. a prohibendos | a ab aëre |
| 28. induitur. b ult. | 179. 10. b Tardar. |
| confectum. | 181. 22. a Cum affluxu |
| 11. 22. a sed ijs, quæ | 183. 21. b succus |
| 4. b non habetur | 186. 4. a vacatione |
| 13. 18. b allatum | 188. 22. b tamen hoc |

190. penul. b Antholo-
 196.4. b alijs (gico
 202. ult. a regis Saporis,
 208.19. a & contr.
 209.11. a antæna. penult.
 b excreuisse
 210.12. b immittatur
 212.28. b reddant
 15. a est: in his
 213. antep. b hellenic.
 216.4. b quem (xum.
 218.14. b ascendunt ple-
 221.27. a utcunque
 226. pen. a apomelite
 228. pen. a vulneratio
 229.22. a offensam,
 11. b sanguis
 230. ult. b illi
 239. 15. b mentiebantur:
 Leviozem
 243.4. a inanitione
 250. antep. b palpitatio-
 ne ult a apoplexiæ
 252.12. b cydarim
 16. platearum
 258.3. b spuma. 15. ce-
 rusæ c. a immittenda
 259.5. b philosophiam
 non tanquam
 263.10. b ignorantia id,
 266.29. a vesicatorium
 270.6. a lithmum
 274. penult. materiam
 283.19. a oculos epi-
 phora 28. orthopnœa
 284.4. a provenire,
 285. ult. a capiti
 288.10. a fuerit; aut
 291.9. b tussim

298.2. b $\omega\epsilon\iota$ 22. jecori
 11. a febri fieri (pocr
 303.8. a crasso 28. Hip.
 308.7. b devestiri. 18. cau.
 sum cœpisse à thuri
 313.16. a menses (suffitu
 337.28. a si qua
 338.14. a ubi ad
 444.11. a diacodion
 362.20. a copioso
 381.17. b fœtent
 405.4. a vinculis
 411.6. a premuntur
 421.4. b $\pi\lambda\acute{\alpha}\delta\omicron\nu$
 425. ult. a calida
 426.27. b eum ex pe-
 nult. Asclepiades
 427. ult. a cruditis quo-
 438.10. b spasmum (que
 445.10. a citrinorum
 454.23. a lævitas
 466.4. a lienterix
 492.7. b lædere
 500.5. b similitudinem
 5. a certa sunt;
 524.9. a flatulenta
 538.4. a & similibus.
 19. diacurcuma
 539.6. a supervenit:
 7. angustis
 541.10. b $\chi\omicron\lambda\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$; an-
 tep. confluxus fit,
 551.8. b $\gamma\upsilon\sigma\iota\varsigma$ $\iota\kappa\pi\epsilon\delta\epsilon\iota\varsigma$
 592.4. a timor est.
 600.11. a præsens
 601.21. a commendata
 In hexasticho Coryphæis
 Τέλα.

*Appendix mendorum emendatorum præ nimia
festinatione antea omifforum.*

fine Præfationis, oc-	per. 6. a ex qua
cupationum agmina,	128.14.b educant.
non nimis	133.18.b per consen.
.lin.20.puncticularis.	141.26. a oleo rosaceo,
3.a vires ferāt, 12. len-	154. pr. b cucurbitulis
os 21. b Asclepiades	155.25. a elect. Indum,
14. sua sponte	174.15. b Vidi interf.
antep. b Oddum	190. pr. b phœnigmus,
7. b Vnde diffic.	321. ult. a phthisis
7. a progressio antep.	335.9. b irritantur.
liu perseverant,	359.25. a difficili
7. b adustione	364.16. b invenisse
22. a paroxysmū sub-	366.17. a annumerari
sequente, pen. b quar-	396.8. b <i>κνίσσα</i>
anam sperantib.	424.18. a <i>Βεγιδυμψία</i>
6. a additis & medi-	431.7. b crassiusculè
camentis convenienti-	445.6. b sistat.
23. a vere si (bus,	465.11. b narcotica
pr. a mittendus,	478.11. b Cedren.
4 b Eustath.	502. pen. b vermem
6. b Razis loq.	504.5. a certa sunt;
ult. a paulo lib.	509.5. b cruditate hu-
20. b <i>Αγρόμ</i> ,	morum
ult. a lethargici	543.2. b flavam
6. b Clemens Alex.	560.24. a agarico
8. b inguinaria	561. pen. b venæ
22. b veneno mixtū,	564. ult. b turbata.
9. a meliorem	567.2. b distendantur
antep. a condiri	581.13. b reprehendit
29. a æger aliquo	584.5. b poscentes
2. b tamen lev.	607.7. a ardor urinæ
4. a collectus vom.	611.2. b dysuria
2.11. a tamē compos.	614. pen. b caput tantum
4.8. b habent	617.3. b ren
7. pr. b tamen hum.	Cetera verò correctu fa-
2. antep. b enim in su-	cilima sunt.

